



27, 376 / B

Commission Administrative  
DES HOSPICES CIVILS DE NANTES.

---

Ecole Secondaire de Médecine  
ÉTABLIE A L'HÔTEL-DIEU.

---

Concours des Elèves  
Pour l'année 1829

---

CLASSE, ÉLÈVES Internes.

---

Ce Prix a été mérité par  
M. Chassignas Procureur du Cours d'Anatomie  
né à Nantes Département  
de la Loire inférieure. au jugement  
de M. M. les Professeurs.


Nantes, le 1<sup>er</sup> juil<sup>et</sup>  
LE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE,

1829  
LE SECRÉTAIRE,

COURT  
A. M. P.

Gilbert  
Duché









Digitized by the Internet Archive  
in 2018 with funding from  
Wellcome Library

[https://archive.org/details/b30529141\\_0001](https://archive.org/details/b30529141_0001)




# ALBERTI HALLERI

*Domini in Goumoëns le Jux & Eclagnens.  
Præsid. Societ. Reg. Gætting. Præsid. Societ. Oeconom. Ber-  
nensis; Sodal. Acad. Reg. Scient. Paris. Acad. Imp. Nat.  
Cur. Boruss. Suec. Bonon. Arcad. Acad. Reg.  
Chirurg. Paris.  
Soc. Reg. Brit. Bot. Flor. Bavar. Helvet. Carniolic. Hafniens.  
Coll. Med. Edimburg. In Supremo Senatu Reip. Bernensis  
ducentum Viri.*

## DE PARTIUM CORPORIS HUMANI

*P R Æ C I P U A R U M*  
FABRICA ET FUNCTIONIBUS  
OPUS QUINQUAGINTA ANNORUM.

*T O M. I.*  
FIBRA. VASA. CIRCUITUS SANGUINIS.



BERNÆ & LAUSANNÆ,  
EX PRELIS SOCIETATUM TYPOGRAPHICARUM.

---

M. DCC. LXX. VIII.







V I R O I L L U S T R I

MARCO ANTONIO LEOPOLDO

CALDANO

MED. ET ANAT. PROF. PRIM.

IN ACAD. PATAVINA.

SOC. REG. BRIT. ET GÖTTINGENSIS

SODALI

AMICO VETERI

OB SUA IN REM MEDICAM

ET IN SE MERITA

D. D. D.

A U C T O R.

**I**MMENSUM opus noviter ut elaborem, ea ætate, ea infirma valetudine, cura quidem studiumque veri me movit. Placebant mihi in spe, multa me plenius, aliqua etiam rectius dicturum, ut hoc quasi compendium physiologiæ nostro ævo cognitæ purius minusque aut maculosum aut hiulcum ad posteros perveniret. Levius est, meo amicitiaæ aperto animo tamen non illatabile, quod hoc ipso in opere monumenta liceat ponere meæ in amicos gratitudini, paulo prius quam & ipsis & rebus mortalium æternum valedicam. Singula volumina singulis amicis, iisdemque publice utilibus viris inscribere mihi vere volupe est, ut exstet testimonium mei de eorum meritis sinceri judi-



cii, & meæ gratitudinis pro amicitia, qua  
vitæ meæ fastidia sublevarunt.

Nunc cui prius debeatur quam Tibi,  
*ILLUSTRIS CALDANE* ea dedicatio? Anti-  
quos meos amicos, REAUMURIUM, GMELINUM,  
ROSENIUM, MORGAGNUM, MEKELIUM, F.  
DE SAUVAGES, S. KÆNIG, P. G. WERL-  
HOF, eos etiam viros, qui post aliquas  
offensas reconciliati animi signa ediderunt.  
ANTONIUM de HAEN, PETRUM SENACUM,  
mors mihi eripuit. Vigésimus quartus  
annus & quod excedit, effluxit, postquam  
experimenta mea de partibus irritabilibus  
& sensu carentibus edidi; iis innumeros mihi  
adversarios concivi, quos rei novitas per-  
cellebat, quos suæ sectæ tutela non sinebat  
meis experimentis æquas aures præbere. Tu  
Vir Clarissime, ex primis, Tu per numero-  
sissima experimenta subvenisti laboranti vero,  
causamque meam, quæ & naturæ causa  
erat, iis tuitus es armis, quibus solis de-


fendi potest. Ab eo tempore perpetua inter nos amicitia fuit. Exstet hoc ejus amoris testimonium. Id Tu Vir Illustris, a moriente amico benignus accipe, & porro in dignissima, cui praes, cathedra pergerem medicam universam inventis illustrare, purgare erroribus.

BERN. d. 19. Mart. 1777.





## PRÆFATIO AUCTORIS.

 RE publica esse, subinde cujusque artis compendium scribi, sagax monuit VERULAMIUS. Conducit progressui scientiarum ut, quantum profecerint, singulis fere seculis notetur, eaque in aliqua tabula pars veri conservetur, quæ eo tempore innotuit. Ab hoc quasi termino proferre humanæ scientiæ limites, posteris facilius & decorum redditur, cum sponte dispalescat, quid quisque ultra priora noviter invenerit. Spes enim est, non porro pari segnitie intra eundem circulum, molam quasi agitatuos homines, si adeo prompta res fuerit eos convincere, quam certo olim nota fuerint, quæ nuperi pro novis proferent. Demum cum pauci mortales ea sint industria, aut ea fruantur op-

portunitate, ut ipsi verum possint invenire, & cum interim corporis humani functiones a nemine Medicorum absque summo artis detrimento ignorentur, e re erit medicinæ, promptuarium aliquod constituisse, in quo tirones elementa nobilissimæ artis facile hauriant. Ejusmodi ego opus scribere suscepi.

Quando ad hunc librum scribendum accessi, dudum in physiologicis laboribus majorem vitæ meæ partem posueram. Neque ergo ignarus adveni magni, quod mihi imponebam oneris, felix, si perinde gerendo suffecero.

Qui physiologiam scribit, corporis animalis internos motus, viscerumque munera, & humorum mutationes, & vires exponendas sumit; quibus vita sustentatur; quibus rerum species, per sensus acceptæ, animæ repræsentantur; per quas vicissim lacerti valent, qui mentis imperio reguntur; quibus alimenta in succos nostros, adeo varios,

convertuntur; quibus demum ex iis succis, & nostra corpora conservantur, & humani generis jactura novis partibus reparatur. Amplissimum certe pensum, & unius hominis ingenio fere majus.

Et primum, cognoscenda est fabrica corporis humani, cujus pene infinitæ partes sunt. Qui physiologiam ab anatome avellere studuerunt, ii certe mihi videntur cum mathematicis posse comparari, qui machinæ alicujus vires & functiones calculo exprimere suscipiunt, cujus neque rotas cognitæ habent, neque tympana, neque mensuras, neque materiem. Mihi vero ab istis æsopis per aerem architectis adeo aliena mens est, ut vix quidquam nos in physiologicis scire persuadeat, nisi quæ per anatomicen didicimus. Facile, quam vera moneam, persuadebitur, quicumque eam corporis humani œconomiam, quæ nunc vulgo innotuit, cum FERNELII, aut *Caspari* HOFMANNI physiologia comparare voluerit. Ingenium in iis viris erat, & laborum assi-



duitas, & aliqua anatome, aut ex Græcis hausta, aut ex aliquibus, sed nimis raris, corporum humanorum incisionibus. Et his tamen viris neque sanguinis verus motus innotuit, neque modus, quo lumen per oculos refractum visionem perficit, neque aut via, aut artificium, quo chylus ex alimentis expressus ad sanguinem venit, denique, si licet sincerum esse, de tota physiologia, tantis viris, vix quidquam innotuit.

Sed longa est anatome, multarumque partium; muscoli, ossa, viscerum exterior circumscriptio, & situs, & aliarum partium ad alias ratio: deinde arteriarum & venarum his nostris demum temporibus nata descriptio, nervorum nondum evolutus labyrinthus, subtilior demum minorum partium incisio, quibus viscera, & glandulæ, & aliæ conspicuæ corporis animalis partes componuntur.

Adeo immensus est iste labor, ut magni viri lauden sint consecuti, qui aliquam ejus

particulam, etiam minutam, etiam facilem, hæcenus plene tradiderunt. Circuitus sanguinis HARVEI famam immortalem fecit; unicum vasculum WIRSUNGII aut WHARTONI nomen dedicavit. Ire vero per omnia, & plene omnes regiones corporis humani perspectas habere, id quidem & æque difficile, & æque rarum est, quam plena omnium immensæ regionis pagorum, rivorum, valliumque & collium historia. Brevis vita est, brevior vita anatomici, quam fere mors abrumpit, aut aliud vitæ genus interpellat, aut certe alia civilis vitæ officia turbant. Ostendi potest, etiam calculis positus, fieri non posse, ut intra viginti annos partes corporis animalis omnes plene peragrentur: si præterea in calculos eam varietatem receperis, quæ in fabrica partium est, & quam oportet repetitis experimentis exhaurire, nisi velis in parte veri subsistere, inque perpetuo periculo ejus adeo familiaris erroris morari, in quem unica, unius exempli, observatio nos præcipitat. Id enim sæpe, ex eo vitio, pro vero recipimus,



quod rarissime verum sit, & cujus opposita fabrica potest frequentior esse, perque viciū numerum obtinere, ut pro naturæ instituto haberi debeat. Si quis nolit nobis, nostras difficultates fatentibus, auscultare, nervorum is scribat historiam, decimoque anno pergat fidem nostræ confessioni negare, si pergere poterit. Ejus enim studii, post centum annorum, in adeo numerosis theatris, conjunctos labores, vix quidquam digne & plene innotuit, præter quinti & septimi parisi historiam, quam Ill. MEKELIUS dedit, oculique nervos ZINNIANOS, & nuperrima aliqua de nervo primo parisi CASCHE & SABBATIER.

Verum ab humana anatome physiologia minime plena repetetur. Quotidie experior, de plerarumque partium corporis animati functione non posse sincerum judicium ferri, nisi ejusdem partis fabrica & in homine, & in variis quadrupedibus, & in avibus, & in piscibus, sæpe etiam in insectis innotuerit. In exemplo, de hepatis bile, deque

bile quæritur, in vesicula fellea nata. Dubitatur, an in hepate omnis paretur, an omnis in vesicula, an in illo viscere aliqua, & in receptaculo, quod dixi, iterum alia pars bilis nascatur. Difficillimum foret, de hac lite ex solo hominis cadavere definire: sed animalia subveniunt. Et primo ostendunt, multas grandesque bestias in hepate solo, absque ulla vesicula, bilem bonam parare. Deinde nullum animal vesiculam habere absque hepate: nullum vesiculam ab hepate ita separatam, quin vel innascatur huic visceri, vel cum ejus excretorio canale communicet. Vides adeo, bilem hepate egere, in quo paretur, vesicula non egere, non ergo in vesicula nasci, ex hepate vero in vesiculam transire. Alias, nimis forte hoc loco subtiles, similis argumenti, comparatæ anatomes utilitates per totum opus meum dispersa sunt.

Dissecanda ergo animalia. Verum minime sufficeret cadavera dissecuisse, viva incidisse necesse est. A cadavere motus abest,



omnem ergo motum in vivo animale speculari oportet. Sed in motu animati corporis interno & externo tota physiologia versatur. Ergo ad sanguinis circuitum, ad ejus subtiliores motus perspiciendos, ad respirationem, ad incrementa corporis & ossium, ad intestinorum reptatum, & chyli iter intelligendum, absque vivorum animalium strage nihil omnino profici potest. Unicum sæpe experimentum integrorum annorum laboriosa figmenta refutavit. Hæc crudelitas ad veram physiologiam plus contulit, quam omnes fere aliæ artes, quarum conspirante opera nostra scientia convaluit.

Sed & morbosorum cadaverum incisionum plurima commoda sunt. Sit functio cuicumque corporis parti vulgo adscripta, velisque rescire, num vere id ejus partis officium sit, quod creditur: non certius defines, quam incisis corporibus, in quibus ea pars vitiata fuerit. Si ea functio superfuit, cum id organum vitio laboraret, non est ejus, quæ dicebatur, utilitas, visceris, ne-

que ab eo viscere ea functio pendet. Si sublata fuit in eo corpore functio, cujus particula, de qua quæritur, vitiata fuit, valde erit vero proximum, hanc fuisse ejus partis functionem, quæ sublata fuit.

Iterum cum minutiae sint, & elementa corporis, in quibus ii motus peraguntur, quibus physiologia tota constat, & cum oculi nostri, ad vitæ munera nati, adque prospicienda eminus, quæ corpori nostro aut salutem adferre possunt, aut perniciem, superest, ut microscopio oculos armemus, quibus in eas minutias penetremus. Absque convexis vitris neque sanguineorum globulorum figuram, neque animatos hospites feminis masculi, neque miram illam pulchritudinem oculi humani, neque incrementa ossium, neque plurimas alias vitæ animalis primarias functiones unquam intelliges.

Omitto artificia incisionum auxiliaria, injectionem, exsiccationem, & quæ sunt hujus generis, quæ possis pro parte aliqua



incisionis habere, etsi certe etiam hæc artificia adeo & multa sunt, & difficilia, ut & otii magnam sibi partem sumant, & vel sola celebritatem suis cultoribus impertierint.

Est in his omnibus ars quædam inveniendi, quæ breviter dici non potest, & quam paucis mortalibus natura concessit. — Oportet absque præjudicatis, quas tu pro veris didiceris opinionibus, ad opus accedere, non eo animo ut videas, quæ classicus aliquis auctor descripsit; sed ea cum voluntate, ut ea videas, quæ natura fecit. Oportet eandem particulam, viscus in exemplo aliquod, primum in situ suisque cum vinculis contemplari. Professoribus prioris seculi id in universum fraudi fuit, quod eam contemplationem neglexerint. Oportet omnes ejus visceris partes, arteriolas, venulas, nervulos, omnes limites, & circumscriptiones perspicere, & patienter describere: & tum demum integrum viscus de cellulosis vinculis solvere, deque vicinia lente separare, ut paulatim mundetur. Sed memorem Te esse oportet.

tet quid sit, quod mundando rejecisti. Solum denique liberumque id viscus per omnes facies, per omnes figuras, exterius & intus contemplari necesse est. Sæpe juverit — cellulosam telam undique solvere: ita vesiculæ feminales, eo textu remoto, in unicum, sed ramosum, intestinum resolvuntur: ita cisterna chyli non in loculos, sed in canales lymphaticos discedit: ita in unicum vasculum dissoluta epididymis extenditur. Sed incorruptas etiam particulas, angulosque nondum mutatos, vasorumque diametrum metiri, sæpe utilitatem habebit.

Maceratio similia facit, & membranas in sua elementa restituit. Inflatio cellulosas telas immensum auget, & adesse ostendit, qua parte nullæ sperabantur. Sed hæc infinita sunt.

Est in his omnibus experimentis lex, —  
cujus neglectæ poenas maximi aliquando viri  
luerunt. Nullum unquam experimentum, —  
administratio nulla, semel debet institui; ne-



que verum innotescit, nisi ex constante repetitorum periculorum in eventu consensu. Plurima sunt aliena, quæ se in experimenta inmiscunt: discedunt ea in repetendo, ideo quia aliena sunt, & pura supersunt, quæ ideo perpetuo similiter eveniunt, quod ex ipsa rei natura fluant. Sed & natura variabilis est, & sola repetitione ejus quasi sensus & voluntas dispalescit. Hæc lex, prioribus temporibus parum perspecta, MORGAGNO inprimis auctore, in anatomen illata est.

Chemia species quædam est anatomes. Uti enim vulgatiores illa partes corporis animati solidas suas in particulas resolvit, ita putredo, & ignis, & admisti notæ efficaciæ liquores, humores in suos sales, sua olea, suam aquam discedere cogunt. Naturam ergo sanguinis, lactis, urinæ, bilis, pinguem, mitem, lixiviosam, aut aliam quamcumque sola chemia revelat. Non oportet autem immemorem esse, quanta sit ignis, aut putredinis, in mutanda corpora

potestas, neque continuo debet recipi, eos in nostris humoribus sales fuisse, quos ignis exinde formavit.

Verum, cum tota physiologia sit motuum enarratio, quibus animata machina agitatur, cumque omnium motuum suæ sint leges, intelligitur, quare sub finem prioris seculi mechanica, & hydrostatica, atque hydraulica præcepta in physiologiam translata fuerint. Non caret equidem harum artium utilitas suis difficultatibus; & si omnia computaveris, quæ bona malave ab earum cultoribus in physiologiam introducta sunt, erunt forte, qui feliciter nos iis bonis carituros aiant, si una malis liberaremur. Multa enim sunt in animali machina, quæ a communibus legibus mechanicis valde aliena sunt: motus magni a parvis causis excitati: celeritates humorum per eas causas parum diminutæ, a quibus per receptas leges hydrostaticas eas vehementer frangi oportuerat: motus a causis penitus incognitis irrepentes: motus vehementes, a debilibus fibris pro-



ducti: decurtationes fibrarum omni calculo majores, & quæ alia. Non ideo repudiandas leges crediderim, quibus extra corpus animale vires motrices reguntur: id volo, nunquam transferendas ad nostras animati corporis machinas, nisi experimentum consenserit. Facile enim, vel in unico exemplo, intelligitur, aquæ fluentis conditiones alias esse debere in canalibus, qui suarum aquarum motui nihil addunt: alias vero, si per canales fluxerint animatos, qui varie & novam celeritatem suis humoribus tribuunt, & e diverso, eorum progressum contrariis viribus enatis inhibent.

Iterum, ne metu aliquo tirones absterreantur, quando calculos longos, & perplexos, sibi imperari credent, intelligent rebus melius perspectis, faciliores solutiones ex calculis & analysi sperari; veras vero, & naturam rerum illustrantes, constructiones a sola fere geometria vulgari, per triangula & quadrata repeti. Nihil ultra reperias in BORELLI opere, plenissimo eorum, quæ

a iatromathematicis profecta sunt : & his fere facilia sunt , quæ *Stephanus* HALEs proposuit, qui quidem Cl. vir in experimentis potius, quam in calculis, laboraverit, neque eo minus communis fere fontis loco est, ex quo nuperi, de ea secta viri, hauriunt, quam diximus.

Vastissimi studii primas quasi lineas circumscripsi. Sed reclamabis, cuicumque tanta officia imponentur, non unius hominis laborem esse, quem a physiologo postulamus. Non potest unus omnem humanæ anatomies ambitum pro dignitate complecti : etiam minus omnia poterit animalia dissecare, aut chemiam cum dissectionibus conjungere, aut infinitam vim experimentorum solus suscipere, quæ ad omnem motuum animalium varietatem declarandam, requiruntur.

Non ideo desperandum est. Etsi enim nemo anatomicorum satis multa corpora incidit, etsi nulla pars otii utilius collocatur, quam in natura contemplanda, sunt



tamen auxiliares copiae, quæ debilitati humanæ, & breviori vitæ, & non perpetuis opportunitatibus subveniant. Navigatio in nostras boreales terras Indorum aromata convehit, & utriusque tropici delicias, & alterius orbis medicamenta. Ita lectio librorum, bonas rerum descriptiones, utilia experimenta, morboforum corporum aptas nostris finibus incisiones, nobis, neque caro vendit, quas non licuerit propriis exhaurire laboribus. Totius antiquitatis thesauri nobis se offerunt, sed imprimis, centum & viginti annorum inventa, qui novissime elapsi sunt, & quibus plus omnino ad cognoscendum verum profectum est, quam quinquaginta, quæ præcesserunt, seculis. Magna academiæ diaria varietatem reconditorum, neque privato semper homini imitandorum, experimentorum, & partium corporis animati historias peculiæ nobis offerunt, quæ paucis paginis multorum annorum labores continent. Ita alias & alias corporis partes proprias sibi passim fecerunt viri, ad inquirendum nati, & pertinaci in unica provincia solertia; eas exhaustæ

runt. Vides spem nasci, etiam in iis corporis humani provinciis Te non penitus peregrinum fore, quas nunquam nisi cursim Tibi invisere licuerit, diligenter descriptas ex libris addiscere facile est.

Audio reclamantes librorum contemptores, qui nihil legunt, nisi noviter inventum, qui *auctores* nunquam nominant, quin una refutent. Vulgo ita sentitur in gente ingeniosa, & acri, quam a legendis libris sæpe linguarum ignorantia absterret, quam ad naturam audiendam opportunitas incidendorum cadaverum invitat, quam denique ardor enitendi, præmiorumque, & academicorum titulorum cupido sollicitat.

Recte hæcenus, si eos monitos volunt, qui legunt, hominum se scripta legere, falli eos, adeoque fallere, naturam idem esse cum vero. Recte si quotidie inculcant, plus luminis, plus veri in rebus inspectis esse, quam etiam in vera earum rerum historia. Recte si repetunt, lectos libros nihil novi



cognitioni humanæ addere, thesauros esse, qui numerando non augentur: solam naturam nunquam confuli, quin nos doceat, inexhaustam nobilis metalli fodinam esse, ex qua & priora secula verum hauserunt, & posteritas minime diminutum hauriet. Sola nova est, sola fida, nunquam fatis colitur, nunquam frustra.

Verum nimis acres ii viri erunt, si ideo nolent, nos vere per libros proficere, & ea forte ratio est, quæ intercessit, quominus passim & in anatome & in physiologia longius progrederentur. Coram video exemplum, virum qui experimenta facit, & nonnunquam repetit, ingenio vero etiam in ea gente excellit, quæ ingenio eminet. Verum non legit, ignorat rationes dudum in utrumque sensum propositas, non percipit, quantis, quam dudum enarratis, difficultatibus ea hypothesis prematur, quam confidenter proponit. Idem librorum lectio facit, quod peregrinationes. Dum varios gentium mores, & diversas religiones, &

alia de rebus humanis judicia audimus, eximus utique de exiguo circulo, quo nos educatio nostra & præceptorum veneratio circumscripsit, & discimus, non auctoritate, sed rationibus, assensum nostrum dare. Sed infinita etiam semina veri per libros dispersa latent, quæ nulla industria de proprio fundo demetiat. Quis possit mortalium tot ægrorum corporum incisionibus etiam in longissima vita defungi? Quis tot animalium, rarorum, peregrinorum, viscera rimari potuerit? & quæ solertia suffecerit imitandis difficillimarum regionum animati corporis historiis, quales felicibus Naturæ cultoribus debemus, quorum nomina continuo exprimentur. Velisne carere SWAMMERDAMIANIS, etiam LYONNETIANIS supra humanam patientiam subtilibus, experimentis, sperasne Te eundem & insecta incisurum, ut SWAMMERDAMIUS, & nervos ut MEKELIUS, & musculos ut ALBINUS?

Id equidem video, laboriosam rem esse libros legere, volumina exstare pene innu-



mera, scripta diversis linguis, multa inutilia, multa repetita plerisque operibus contineri, neque fidem semper & industriam auctorum eam esse, super quam firmum corollarium struas. Oportebit pertinaci labore, sed judicio una uti accurato & difficili, ut veros rerum eventus ab erroribus separe, quos præjudicata opinio, & scholæ auctoritas, & ornandæ hypotheseos amor adeo frequenter per optima scripta disseminavit. Neque tamen supra vires humanas erit aut legendi labor, aut spes discernendi veri, quam propria experimenta plurimum adjuvabunt. Disces enim eum fidum auctorem esse, cum quo Naturam sæpius consentire videbis.

Ostendi hætenus, quam mihi speciem animo conceperim ejus operis, quod edendum adgredior. Licet, ni fallor, plus fiduciæ in eo homine ponere, qui suorum officiorum gnarus fuerit, neque temeraria confidentia leve crediderit onus, suis humeris majus sensurus, si ejus difficultatem can-

didus ponderasset. Non ideo vero parem me crediderim operi: quid tamen fecerim enarrabo, quo minus penitus impar forem.

Ab anno 1729 cepi in BOERHAAVII Physiologiam commentari, libros omnis generis legere, & decerpere undique, quæ mihi ad eos commentarios utilia viderentur. In alienissimis sæpe scriptis, in itinerariis, in civili historia reperi, quod suo loco non incommode repeterem. Subinde etiam experimenta faciebam, corpora incidebam, & hominum, & animalium. Theatro denique anatomico, a Republica impetrato, ad meos fines uti non neglexi.

Anno 1736 Gottingam vocatus, septemdecim in ea Academia annis vixi, non alibi moriturus, nisi infirma valetudo me in eum metum coniecisset, & vitam meam paucos post annos publice inutilem futuram, & certam ante diem mortem impendere. Eo ergo in theatro & legendo, & dissecando plurimum profeci. Cadavera humana incidi fere trecenta



& quinquaginta, viva animalia numerosiora, quam absque gloriæ suspicione enumerare fas sit. Quæ vidi, ea in adversaria sincerus retuli. Cum præcipiti equidem, hinc merito imperfecto, studio in BOERHAVII Prælectiones commentarer, eam certe utilitatem ex eo opere retuli, ut discerem, quæ partes anatomes, quæve experimenta mihi perficienda superessent. Ea dubia in tabulas referebam, & proximis occasionibus utebar, ut quaestionibus mihi propositis, natura consulta satisfaceret.

Deinde cum ab anno fere 1746 Academia convaluisset, & plurimi, de variis gentibus selecti, juvenes passim Gottingam confluerent, occasione feliciter usus sum. Quoties honores medicos petitori, inauguralem disputationem parabant, persuadebam facile, ut difficilem aliquam partem anatomes sibisumerent, in quam duarum fere hiemum labores impenderent. Id consilium & candidatis gloriosum eveniebat, & mihi propriarum incisionum faciebat compen-

dium *a*. Non alia arte certe posset ad perfectionem anatomes propius accedi, si in Academia opportunitatibus divite hoc consilium per annos, & per secula urgeretur, & praeterea, ut Gottingae quidem, ardor aliquis & aemulatio, & publicum praemium accederet.

Bernam redux, recuperata in patria valetudine, occasionibus vero cadaverum incidendorum exclusus, ad experimenta me converti, quae sola in mea potestate supererant. Ergo vivis in animalibus cordis motum & respirationem; sed imprimis annis 1754. 1755. 1756 & 1757. sanguinis per pellucida animalium frigidorum vasa iter, & pulli salientis phaenomena, & osfium in nascente ave formationem, plurimis experimentis persecutus, aliud tempus

---

*a* Ita natæ sunt disputationes Cl. virorum MEKELII, ZINNI, SPROEGELII, AURIVILLII, TRENDELENBURGII, NORRENII, FELICIS, ASCHII, J. H. v. BRUNN, ZIMMERMANNI, WALSTORFII, KUHLEMAN-

NI, RHADESII, SCHOBINGERI, VOSSII, DETLEFII, REMI, CASTELLI, ALBRECHTI, EVERSII, RUNGII demum & DUNTZII, & nulli inferior disputatio ANDERSCHII, nisi hanc infelix fatum suppressisset.



destino repetendis periculis, ad generationis historiam, & primordia nascentis animalis pertinentibus. Ea experimenta Rupe meliori usus otio, per sex annos iteravi, dilatavi, perfeci *b.*

Copias meas enarravi, sed eas non sufficere facile fateor. Intellego enim, varias esse corporis humani particulas, quas non satis repetito, aut satis curiose, rimatus sum, aut quibus administrationes necessarias & difficiles impendere non licuit, per quas solas tamen innotescunt. Experimentis etiam nonnullis destituor, quae apparatus aliquem instrumentorum desiderant, supra meas fortunas positum: ejusmodi sunt, quæ ad lucem pertinent & ad colores. Neque fabricam animalium satis frequenter, satisque studiose, scrutari licuit, etsi huic qui-

---

*b* De partibus sensilibus & irritabilibus Laufann. gallice 1756. De motu sanguinis & venæ sectione, ibid. eod. anno. De evolutione cordis; de ossium formatione, deque respiratione Laufannæ 1757. 2.

Tom. De quadrupedum conceptione de monstris. Alia sparsa, ad digestionem ciborum, ad vocem, adque alia vitæ animatæ munia, ex adversariis meis in physiologiam transtuli.

dem vitio, quotidie, quantum licet, me-  
deor. Erunt etiam, qui in discipulo *Jo-*  
*hannis* BERNOULLII reconditae analyseos  
majorem peritiam desiderabunt. Quare in  
propriarum facultatum brevitate, necesse fuit  
aes alienum contrahere, Quae in nonnul-  
lis particulis corporis humani non satis sub-  
tiliter rimatus sum, ea ex ALBINO, ex aliis  
fidis fontibus recepi, haecenus harum rerum  
peritus, ut minus facile sit mihi imponere.  
Phyfica experimenta ex J. *Theophilo* DE-  
SAGULIERS, ex SMITHIO, ex MUSCHEN-  
BROECKIO recepi. Ubi omnia me destitue-  
runt, pene subplevi hiatum, dum destitue-  
re ingenue fassus sum.

Supereſt, ut de ſtudio meo & conſilio  
operis aliqua praefatus ostendam, qua ra-  
tione mea materie ſim uſus. Descriptiones  
in univerſum ex adverſariis meis recepi,  
ad naturam factas: & in unam, ut potui,  
multas meas historias contraxi, quoties mul-  
tae fuerunt, fuerunt autem fere ubique.  
Adjeci aliquando, quae alii praeter mea vi-



derunt. Citavi plurimos auctorum locos, plerumque ut suus cuique constaret honor. Putidum enim mihi dudum visum est, neque dignum bono viro, vel tacendo inventoris nomen, mihi tribuere, quae priores alii proprio labore invenissent. Saepissime eos auctores citavi, qui mecum consentirent, aliquando & eos, qui contraria meorum scripserunt, difficilis ad refutandum, & cupidus evitandarum animadversionum. Neque adeo locos auctorum, quos cito, pro fontibus mearum descriptionum haberi velim, sponte moniturus, quoties omnino pro fontibus fuerunt.

In historicas nonnunquam de invento-ribus disquisitiones non invitus me demisi, ut aliqua leviori disputatione animum lectoris laxarem, quem minutae rerum delineationes fatigassent.

In describendis partibus corporis animalis minus aliquanto longus fui, quam quidem nonnulli recentiorum solent. Solet

enim inevitabile taedium profusas illas minutiarum enumerationes sequi, quarum praeterea utilitas plerumque vix ulla est. Aliis videbor in eodem studio nimius fuisse. Veram mensuram quis definiverit?

Humanum corpus omnino descripsi, in quo secando tot annos trivi, ut ejus fabricam non unice videre licuerit, sed repetito videre, tanta cum ubertate incisionum, ut etiam, quid perpetuum, quid frequens, quid rarum sit, plerumque definire licuerit. Addidi vicium rationes, dedi brutorum animalium analogias, & nonnunquam etiam ad minutio-rem fabricam iisdem sum usus, ut mone-rem tamen, hominemque describerem, an bestiam. Magis enim & magis disco, elementa corporis, & quidquid est subtilius, in diversis quadrupedibus omnino ejusdem esse fabricae; majores vero & crassiores partes pro muneribus variare, quae cuique generi animalium CREATOR praescripserit.

In exscribendis aliorum auctorum expe-



rimentis, utilibusque fragmentis, facile intelligo, ex ubertate rerum, temporisque penuria, & importunis interpellationibus, potuisse subinde erroneas paginas, rarius omnino erronea rerum testimonia in opus meum transire. Hanc culpam, aegre ab humana conditione separabilem, omnino deprecor; veniam, & ab indulgentia lectoris speraturus, & a levitate vitiorum. Quotquot enim majoris momenti erant testimonia, quibus constitutis aliquod theorema niteretur, quibus everfis caderet, ea, dum opus meum emendo, cum libris ipsis contuli, & confirmavi. Brevia vero quasi indicia plerumque morborum, aut experimentorum, in haec elementa transtuli, non quod ignorem, longiores historias laetam quamdam varietatem habere: sed cavendum erat, ne opus meum & in inmensum cresceret, & vita mea longius fieret.

Laudare bene meritos, neminem laedere studui. Verum unice secutus, nunquam a voluntate, saepe procul dubio ab imbecillitate & hominibus communi, & mihi

propria, in aliena sum abreptus. Hypothesin nullam, quam ornarem, admisi. Ut simpliciter, aliquanto tamen, quam in aliis meis scriptis, fufius res meas proponerem, vehementer ftudui.

Bis haec elementa, interjectis aliquot annis, manu mea & fcripsi, & mundius, atque cum aliquo limae usu recognita, de novo chartae commisi. Poterit tamen absentia Typographi effecisse, ut vitia subrepfisse jam video: sed ea necessaria est calamitas, quoties alia in civitate prelum est, in alia auctor operis degit.

Haec a. 1757. 28 April. fcripseram. Ab eo tempore annorum pene viginti intervallum aliqua me haud dubie docuit. Nam & ipse interim sex annorum rusticatione Rupensi in dessecandis vivis animalibus, in rimandis pulli incubati phænomenis, in oculorum minutioribus particulis contemplandis, in comparanda cerebri avium pisciumque fabrica, in primordiis novi animalis per quadrupeda speculandis, in ossium incrementis versatus sum. Multa etiam & inter ea bo-



na & singularia opera prodierunt. De facultate sentiendi & movendi experimenta in utramque partem capta sunt, pene innumerable. Haec omnia decerpfi, cum meis contuli, si quid inde emendari liceret meorum, si addere nonnihil liceret, ea emendavi aut adjeci.

Senium ipsum, & frequens experimentum, quo convincimur, quam facile sit, receptis opinionibus nimium dare, aut amatis praeceptoribus, multa me docuit dediscere, multa quae putabam me perspicere, nunc video omnino sola conjectura me adtigisse.

Dedi ergo innocentissimo rectiora dicendi desiderio, ut novis curis magnum opus retractarem. Reperi passim, ab ipsa olim necessitate temporum me adductum fuisse, ut eadem repeterem, quae alio loco jam tractassem. Quando enim de corde scribebam, nondum de cerebro dixeram, nondum experimenta produxeram, quae non sinunt admittere, cerebellum inter & cordis motum necessarium quoddam vinculum intercedere; oportuit ergo aliqua eorum experimentorum in eo libro tradere, quo

quo de corde scripsi, ut ostenderem, quare de causis moti cordis vitalem cerebelli potentiam removeam.

Has nunc incommodas repetitiones, & sunt plusculae, licet omnino expungere, & brevibus verbis, dum de corde ago, ad libri X. sectionem IV. remittere, qua agitur de cerebelli functione.

Porro, cum de arteriarum vi contractili agere oporteret, visus sum non nemini, me modo admisisse aliquam, modo dissimilem mei eam vim repudiasse, ut aliis aliisque hujus operis libris de ea potestate agebam. Hae nunc objectiones corruent. Apparebit enim, quoties de invisibili arteriarum constrictione agitur, ex solis suis causis probabili, in magnis certe arteriis, fibris muscularibus munitis, eam vim me admittere. Quoties vero de ejusmodi vi contractili agitur, quae oculis se offerat, quam liceat experimentis conspicuam reddere, toties ejusmodi manifestam potestatem arteriarum rejeci; & non rejicere non potui, cum tot



quum tot in experimentis nunquam arteriam vidissem contrahi.

Praefationes adversariorum asperis iudiciis oppositas non potui totas omittere, cum essent ALBINI, FRANCISCI LAMURE aliorumque mihi oppositi libri, & aequum videatur tamdiu me tueri, quamdiu accusor. Multa tamen in brevitatem contraxi, & eadem ut erant mitia, etiam mitiora ut essent, vehementer studui. Additamenta suos in locos reposui.

Denique alia insuperabilis ratio me impulit, ut opus meum, quantum ejus fieri posset, in brevitatem contraherem, nunquam speraturus me tanto opere defuncturum, si longum, si priori longius foret. Et placebam tamen mihi in ea spe, minus imperfectum & verius meum opus me daturum, quam dederam hactenus.

Ordinem servavi eundem, & libros perinde triginta, sed multa contraxi, alia aptiori loco disposui, vere utilis omisi nihil.

BERNÆ d. 19 Martii 1777.

*CATALOGUS nonnullorum inventorum  
Auctoris.*

**H**UNC catalogum olim a. 1764. edidi, cum ab injustis hominibus, & quod ægrius me habebat, a *Francisco Lamure* viro Cl. insimularer, alienis me thesauris divitem esse. Putavi tantam post provocationem licere mihi, quod absque ulla ejusmodi causa *Albinus* fecerat & *Douglassius*, eorum edere catalogum, quæ ipse prior aut rectius vidissem.

*PROPRIA AUCTORIS.*

**F**ABRICA pene totius corporis animalis ex cellulosa tela, per experimenta evicta *a*.

Pericardii vera historia & adhæSIONES *b*.

Constitutus anulus venosus valvularum cordis continuus *c*, & minutæ earum valvularum adfectiones.

*a Elem. I. p. 19. 22. Non ita ALBINUS; sed cuique parti suam substantiam esse præter vasa Adnot. L. III. p. 15. Mea esse fatetur,*

*non ille æquus mihi, Murherr Comment. I p. 127.*

*b I. p. 269. seq.*

*c Ann. 1737. in disp. de mot. sang.*

Cordis evolutio *d*. Ventriculus sinister primigenius est; post eum sensim dexter subnascitur: auris communis primum extra cor est, tunc in cor retrahitur, & in duas aures discedit.

De cordis motu: non pallere idem *e*, & de aliis ejus affectionibus.

Cordis maxima irritabilitas *f*, & innatus motus perpetuus, per vim stimuli continuatus.

Experimentum, quo ostenditur, ablato sanguine venoso dextro, sinistras cordis partes supervivere ultimas *g*.

Sanguinis motus non multum tardatur in minimis *h* vasis: per experimenta.

Ponderis vis in sanguinem venosum *i*,

Vasa minima non sunt contractilia *k*,

Vis derivationis & revulsionis *l*.

Motus sanguinis a morte superstes ab adtractione *m* natus.

*d* Ibid. *form. du poulet* T. II. Sect. VI.

*e* Oper. min. p. 171.

*f* Oper. min. T. I. p. 169. in *experim.* & in *Comm. Gott.* T. II.

*g* *Comm. Gott.* T. I.

*h* L. VI. p. 195.

*i* Oper. min. T. I. p. 129.

*k* L. VI. p. 210. Oper. min. I. p. 88.

*l* L. VI. p. 214. post aliqua experimenta ANT. de HEIDE.

*m* Oper. min. I. p. 128. seq.



Aneurysma verum & varix, artificio parari possunt *n*.

Major crassities tunicarum arteriosarum a debili sanguinis motu: minor crassities a plethora *o*.

Pulsus venosus ab inspirationis viribus *p* natus, qui sanguinem in pulmones invitat.

Pulsus venæ pulmonalis *q*.

Musculos intercostales omnes costas levare, demum per experimenta evictum *r*.

Costarum rotatio *s*, & reliqua respirationis phænomena exculta.

Mammariarum arteriarum rami magni ad diaphragma *t* dati.

Arteriarum intercostalium & mammariarum pulcherrimi anuli, & anastomoses cum vasis thoracis externis *v*.

Trunci quatuor arteriosi thoracici constituti *x*.

Aerem nullum esse in thorace *y* per experimenta ita evici, ut neminis nunc meminim, qui contrariam opinionem tueatur.

*n* Oper. min. p. 85. 99.

*o* Oper. min. p. 88.

*p* Conf. L. VI. p. 332.

Oper. min. I. p. 131. seq.

*q* Oper. min. I. p. 144.

*r* Oper. min. T. I. p. 283. seqq.

*s* Ibid. p. 288. seqq.

*t* Fascic. VI. In venis aliquid simile FALLOPIUS habet.

*v* Ibid.

*x* Ibid.

*y* Oper. min. I. p. 301.

Tendines sunt insensiles *z*.

Et ligamenta *a*.

Et dura cerebri membrana *b*.

Cerebri piscium fabrica *c*.

Arteriæ cerebelli & cerebri pleræque constitutæ *d*.

Et arteriæ medullæ spinalis *d*.

Emissaria pluscula *e*.

Constitutus per experimenta motus cerebri, qui respirationi obedit *f*.

Cerebelli nulla major dignitas *f*<sup>\*</sup>, nec callosi corporis *ft*.

Nervi molles ab intercostali *g* ganglio primo nati, post aliquas LANCISII voces.

Thyreoidea arteria inferior pene tota *g*<sup>\*</sup>.

Vis insita musculorum, per suos limites constituta *h*.

Vis nervosa non eget continuitate cum cerebro *h*<sup>\*</sup>.

Classis musculorum vitalium magis irritabilis, animalium minus *h*<sup>\*\*</sup>.

*z* Oper. min. I. p. 332.  
seq. Comm. Gott. T. II. p.  
113.

*a* p. 341.

*b* p. 345.

*c* Elem. physiol. IV. fin.  
Oper. min. T. III.

*d* Fascic. VII.

*d*<sup>\*</sup> Ibid.

*e* Fascic. I. & Elem. T.  
IV. p. 166. 167.

*f* Comm. Gott. T. II. &

Elem. T. IV. p. 171. &c.

*f*<sup>\*</sup> Element. T. IV. p. 353.

*ft* Etiam eo loco.

*g* Art. maxill. tab. ad fin.

Orig. nerv. intercast. n. 17.

Elem. T. IV. p. 256.

*g*<sup>\*</sup> Fascic. III.

*h* Comm. Gott. T. II. Elem.  
IV. p. 449. seq.

*h*<sup>\*</sup> Elem. IV. p. 364.

*h*<sup>\*\*</sup> Elem. IV. L. XI. sect.  
III.

Vasa vitrei corporis in piscibus *i*.

Et campanula lentis crystallinæ *k*.

Zona ciliaris avium *l*.

Arteria ophthalmica pene tota *m*.

Iris non est irritabilis *n*.

Arteriæ dentales pleræque *o*.

Ductus ad STENONIANUM Accessorius *p*.

Sublinguales ductus, longi & breves *q*.

Arteriæ œsophageæ pleræque *r*.

tum palatinæ *s*.

pharyngeæ *s*<sup>\*</sup>.

Ventriculi humani fabrica musculosa, &  
stratum fibrarum intimum *s*<sup>\*\*</sup>.

Ventriculi cellulosae telæ post paucas vo-  
ces priorum *t*.

Omentum colicum *v*.

*i* Elem. physiol. V. p. 391.  
392.

*k* p. 391.

*l* Form. du poulet. T. II.

*m* Fascic. VII.

*n* Oper. min. p. 372.

*o* Tab. art. maxill. & Fasc.  
VIII. & Elem. T. V. p. 30.

*p* Fascic. III. tab. art. lab.

*q* Elem. phys. VI. p. 48.

*r* Fascic. III.

*s* Fascic. II. tab. art. maxill.  
Fascic. III. tab. art. pharyng.

*s*<sup>\*</sup> Comm. BOERHAAV. T.  
II. & Fascic. III.

*s*<sup>\*\*</sup> Cl. de FOUCHY hist. de  
l'Acad. 1761, p. 32. Cl. BER-  
TINO tribuit, qui anno

1746. cum de equi ventricu-  
lo agerët, ejus inventi men-  
tionem fecerit, cum ego an-  
no demum 1751. eadem de-  
scripserim. Non recte. De-  
scripsi anno 1747. Voces e-  
nim ejus editionis *prim. lin.*  
*n.* 524. eadem sunt cum vo-  
cibus editionis anni 1751.  
Deinde tomus Commentario-  
rum anni 1746. anno demum  
1751. aliquot adeo post meas  
primas lineas annis prodiit:  
Quæ ita dicta volo: nihil ut  
inde decedat Cl. BERTINI  
laudibus.

*t* Elem. T. VI. p. 132.

*v* Progr. anni 1742.



Omenti lamina posterior veterum, verum est mesocolon *x*.

Arteriæ pancreaticæ pleræque *y*.

Vena umbilicalis in fetu *z* ramos dat in hepar, qui in homine adulto fiunt rami venæ portarum.

Intestinorum tela cellulosa tertia *a*, post paucas voces priorum.

Mechanismus quo cæci intestinifacies sensim mutatur *b*.

Valvularum coli mensuræ, & varietates *c*.

Arteriarum capsularium tres classes *d*.

Uretericæ *e*.

Hæmorrhoea media *f*.

Perforantes magnæ femoris, utræque præter aliqua priorum *g* vestigia.

Articulares genu, præter aliqua verba priorum *h*.

Anastomoses ramorum superiorum cum inferioribus sub genu, præter priorum paucas voces *i*.

Sic arteria tarsea *k*.

Perforantes tarfi &c. *l*.

Arteriarum superiorum cubiti cum in-

---

*x* Ibid.  
*y* Fascic. II. & Elem. T. VII. p. 431. seq.  
*z* De fetu bicipite anno 1739. tum in prim. lin. n. 833.  
*a* Prim. lin. n. 705.  
*b* Prim. lin. n. 730.  
*c* Progr. anni 1742.

---

*d* Fascic. III.  
*e* Ibid.  
*f* Fascic. IV.  
*g* Fascic. V.  
*h* p. 23.  
*i* Ibid.  
*k* Ibid.  
*l* Ibid.

ferioribus pleraeque anastomoses *m*.

Arcus dorsalis cubiti *n*.

Arcus carpeus *o*.

Perforantes carpi *p*.

Interosseae dorsales *q*.

Interosseae mediae *r*.

Herniae congenitae: vagina pro teste in fetu praeparata *s*.

Testis in peritonaei cavea est, dum homo in utero geritur *s*<sup>\*</sup>.

Vascula efferentia testis; & rete testis *t* cellulosum vasculosumque.

Vesicula feminalis est intestinum ramosum *v*.

Corpus luteum oritur ex conceptione *x*, neque prius paratum adest.

Urachus est ductus ad vesicam usque apertus, quem replere facile fit *y*.

Foraminis ovalis & ductus arteriosi proportionem, & causa commutationis *z*.

Fetus fero adparet, ejusque in quadrupedibus prima phaenomena *z*<sup>\*</sup>. inque avibus *z*<sup>\*\*</sup>.

*m* Fascic. VI.

*n* Ibid.

*o* Ibid.

*p* Ibid.

*q* Ibid.

*r* Ibid.

*s* Progr. anni 1749 Elem. physiol. T. VI. p. 373. T. VII. & opusc. pathol. p. 53.

*s*<sup>\*</sup> Ibid.

*t* Progr. anno 1745. edit.

& in Phil. transf. Tum in Elem. physiol. T. VII.

*v* Ibid.

*x* Praef. ad T. II. operis BUFFONIANI versionem Germanicam.

*y* Prim. lin. n. 837.

*z* Progr. de valv. EUSTACH. in Fascic. IV. tum Elem. T. VIII

*z*<sup>\*</sup> Oper. min. T III.

*z*<sup>\*\*</sup> T. II.

Fabrica vitelli *a*.

Incrementa ossium *b*.

Mutatio ex gelu, rimae, opacitas  
&c. *c*.

Vasa ossis longa *d*.

Circuli vasculosi *e*.

Hemisphaerium vasculosum *f*.

Vascula cartilaginum *g* intima.

Formatio partis alveolaris *h* ossis.

Et nuclei ossei *i*.

Haec omnia fufius exponuntur in *Iconibus anatomicis*, quorum ab a. 1741, ad 1756 octo fasciculi Gottingae prodierunt, tum in operibus *anatomicis minoribus* Lauffannae 4. a. 1762, 1767 & 1768 editis, multo plenioribus, quam in gallicis editionibus. Hos libros rogo, ut lector hoc nostro cum opere conferre velit.

*Commentarii* in Boerhaavii praelectiones ab a. 1739 ad 1744. editi pertinent ad tempora definienda diverfarum a PRÆCEPTORE opinionum, fenfim a me receptarum, fi contuleris cum primis lineis phyfiologiae anno 1747 & 1765 Gottingae excufis.

*a* Ibid. Sect. XI.

*b* *Traité de l'accroissement*  
des os.

*c* Ibid.

*d* Sect. VI.

*e* Ibid.

*f* Ibid.

*g* p. 201. &c.

*h* Sect. V.

*i* Ibid.





DE PRÆCIPUIS  
CORPOR. HUMANI PART.  
FUNCTIONIBUS.

LIBER PRIMUS.

---

CORPORIS HUMANI ELEMENTA.



NON contemno quidem ordinem, qui auctori magni laboris compendium faciat, quoties ea omnia una literis tradit, quæ ad idem argumentum pertinent. Ea enim mutuo se fulciunt & declarant, scribenti vero facilitatem præstant disponendi sermonis, dum iis omnibus experimentis & rationibus suum locum adsignant, quæcumque collegerit.

Neque tamen adeo superstitiosus fuerim, ut a scriptore physiologico ordinem mathematici similem requiram, aut postulem, ut nihil quidquam ponat, quod prius non sit explicatum.

Tom. I.

A. 1776

tum, aut demonstratum. Nemini physiologorum id studium successit, ut eum ordinem purum servare potuerit. Hujus enim disciplinæ auctorem plurima ex physicis, chemicis, anatomicis, aliisque artibus repetere necesse est: neque ipsi circa simplicia corpora, quorum facillimæ definitiones sunt, unice versari licet, ut utroque modo a Geometra differat, qui suæ artis principia ab ipsa arte sumat, & lineas punctaque, aliaque miræ simplicitatis elementa, tractanda nactus sit. Contra nos longæ organorum per varias & diversi generis partes picturæ morantur, neque fere ullo modo evitari potest, quin aliquid interim pro vero adsumendum sit, quod paulo post demum definiatur aut demonstretur. Quare neque valde succenseo iis, qui meliorem meo ordinem docuerint, neque de venia despero, quam ob ea vitia peto, quæ omnino subterfugere nequiverim, multa contra conatus.

Interim is, quem secutus sum, ordo visus est mihi perpetua cohærere catena, neque ea separare, quæ natura conjunxit, neque aliena conjungere. Sufficiat de methodo mathematica id retinuisse privilegium, ut omnino nihil quidquam pro vero mihi sumam, quod debilitè verum, quod conjectura sola fultum sit: Neque pro vitio habeo, si ad aliam operis partem lectorem remisero, quoties ad explicandam aliquam functionem alieni visceris, aut alterius organi dotes requirentur, quas, ob boni ordinis necessitatem alio, & posteriori loco exposui. Ita securus in cordis historiam



carneæ fibræ vires recipio, & ex muscutorum descriptione ea mutuor, quæ cordi cum musculis communia sunt.

---

## SECTION I. F I B R A.

**A** FIBRA adeo sermonis principium capio; elemento, quod amicus etiam noster, Vir. Cel. *Job. Frid. SCHREIBER* *a* in majoris operis ea parte pro fundamento posuit, quæ sola prodiit. Fibra enim physiologo id est, quod linea geometræ, ex qua nempe figuræ omnes oriuntur. *Bernardo CONNOR* *b*, quantum nunc video, ea laus debetur, quod omnia *solida* humani corporis fibras, aut propiores sibi aut remotiores, esse utiliter docuerit. Eadem fere vegetabilium corporum natura est, neque aut fila, fibrarum nostrarum similia, aut laminæ a metallorum compositione absunt *c*. Solidas partes vero interim voco, quas firmas alii, alii consistentes *d* dicere maluerunt.

*Fibra*, quo communi nomine multiplex genus elementorum comprehendimus, & cujus discrimina continuo exponemus, communis pene toti

---

*a* *Element. Medicin. Physico-mathem.* cipes, p. 8.

*d* Cl. MALOUIN & Jos.

*b* *Histor. of Poland*, T. I. de JUSSIEU in thes. ad hæc p. 308. &c. de off. coalit. verba. Ergo in reactionis & actionis æqualitate æcon. animalis &c. Paris. 1733.

*c* Du CLOS *sur les Principes* &c. Paris. 1733.



humano corpori materies est, forte etiam, ut alibi ostendemus, cerebro & medullæ spinali. Fragilis aut mollis, elastica, aut penitus pultacea, longa absque fere latitudine, vel lata, ut longitudini par fere latitudo sit, ossa, cartilagines, membranas, vasa, ligamenta, tendines, musculos, nervos, cellulosum textum, viscerum parenchymata, & ungues constituit. Multum in ea declaranda debemus *Hermanno BOERHAAVE e*, tum Ill. ejus discipulis J. F. SCHREIBERO, H. D. GAUBIO *f*, *Johanni DE GORTER g*, & *Abrahamo Kaauw BOERHAAVE h*. Hoc est *stamen* primum, ex quo epidermis, epithelium, ungues, pili, demum totum corpus formatur *i*, Aliter visum fuerat *Ill. Albino*, qui cuique corporis parti suam propriam naturam esse docuit *k*. Mihi quidem de cerebro dubium superest, & de universa medulla nervosa, de reliquo corpore nullum videtur dubium esse, nisi forte fibræ musculari alia natura est.

Elementa fibræ, qualia quidem hætenus innotuerunt, alia solida sunt, fluida alia, verum quæ cum solidis istis tanta vi cohærent, ut solo igne aut longa putredine discedant. So-

*e* In *Instit. rei med. cap. Chirurg. p. 267. n. 289. &c.*  
*de nutrit. & in principio b Perspirat. Hipp. c. 37.*  
*aphor. de cognoscend. & curatione morborum. & in Elem. 264.*

*chem. T. H. p. 360, 361.*

*f* In disp. inaug. de solidis corporis humani partibus. Leid. 1725.

*g* In *Compend. medic. & in*

*i Gorter Chir. n. 289.*

*k Nat. hom. p. 36.*

*l Cl. SCHINZ Diff. de calce p. 29.*

lidum elementum terra est, de calcario genere *l*, aliquantum tamen diversa, quod in calcem vivam non abeat, quod cum acore in nulum falem medium combinetur, quod cum spiritu falis in gelatinam coeat, quod cum acore vitriolico non ferveat, quod ab aceto nihil patiatur, quod a nitroso acore lente solvatur, quod difficulter vitrescat, & demum in lacteum opacum vitrum convertatur *m*. Ea terra a fluidis suis vinculis soluta, friabilis in particulas discedit, quæ se mutuo non tenent, neque in aqua porro dissolvuntur. Sola autem adparet, quando vehemens ignis reliqua elementa dissipavit, melius tamen, quoties longa vis aevi eam nudavit. Ossa certe ante bis mille annos, & quod excedit, in mumiis conservata, suum gluten retinuerunt. Quando vero ea ossa aëri, humori, que arenam perlamenti, per multa secula exponuntur, adeo tunc sensim oleo suo & aqua exsuuntur, ut sola absque alia materie terra supersit. Ita a. 1751. Cl. *Heinze*, noster olim auditor, os frontis humanum, suis cum sinibus superciliaribus, ad me misit, quod ex arenoso Thuringiæ colle erutum fuerat. Id adeo in terram redierat, ut aquam siticulosum biberet, & brevi maceratione diffunderet; & dissolveretur, cum lavare vellem. Similia ossa Rhinocerotis, aquæ bibula, Herzbergæ eruta, nunc coram erant, dum scribebam, & alia Elephanti, a *Bruk-*

---

*m Henkel Flor. Saturniz. p. edit. p. 1221.  
272. Neumann & Zimmerm.*



*manno*, Cl. olim viro, ad Cel. *Holmannum* missa, aque eo descripta *n*. Eadem terra ea favilla est, quam solam de *Alexandro* Macedone superstitem *Augustus* Alexandriae vidit: cohærere ea videbatur, & figuram herois retinebat, sed eadem sub tangente digito cedebat, glutine destituta, quod terreis glebulis vim præbet, qua cohærent. Similes omnino ossium in terram indolem reversiones passim apud idoneos auctores reperi. In eadem Alexandria *Thevenotius* ossa solida specie, & recentium similia vidit, quæ tamen, ut putridum lignum fragilia, sub impellente digito rumperentur o. In pollinem delapsa in romanis catacombis videntur Cl. viri *Greaves* *p* & *Blainville* *q*. Simile testimonium dant de plena ossium arca Cl. *Martyn* *r*; de mumiis *Ammannus* *s* Helvetus homo; de Episcopi cadavere, ante duo secula sepulto, & præsentibus spectatoribus in cineres delapso Cl. *Enhörning* *t*; de Episcopi corpore quinque seculis, ut videbatur superstite, auctor vitæ Ludovici IX. delphini; deque corpo-

*n* *Epist. Centur. II. p. p. 543.* Iste quidem ossa in 306. Paulo melius naturam pulstem albam, ob loci um-  
animalem ossa ejus elephan- brosam humiditatem dilapsa,  
ti conservarunt, quem prope describit.

Tonnam effossum *Tenzelius* *r* *Descr. of the western Is-*  
descripsit. Destillata enim lands *p. 60.*

salem volatilem dederunt. *s* *In itineribus germanice*  
*o Itiner. Tom. II. L. I. Tiguri 1678. 8. editis.*

Cap. 2. *t* *Anfangsgründe der mecha-*  
*p Travels and observations nischen Arzneygelahrtheit, p.*  
*p. 488.* 24.

*q* *Voyage d'Italie Tom. II.*



ribus balsamo conditis *Franciscus Bacon* de *Verulam.* v. Similia alia corporum humanorum in pollinem dilabentium exempla reperiuntur in *Philosophicis Transactionibus* x, apud *Johannem Schulze* y, in *Vratislaviensium Medicorum* collectionibus z, apud *Isbrandum van Diemberoeck* a, *Gassendum* b, *Kaauwium* c aliosque. Eadem in ligno phænomena observantur d. Huc pertinet nuperum elegans experimentum. De capillo annulus suspenditur; igne absque aëris motu capillus in cinerem redigitur; sustinetur de cinere hætenus annulus, tamen ut cadat, si minimus motus accesserit. Apparet absque vinculo glutinis levissimum esse nexum elementorum terreorum.

Cum ea terra aliqua ferri portio mista est, aut certe ejus terræ, quæ cum inflammabili fomite in ferrum conflare potest, & quam magnæ adtrahit e. Etsi enim ferrum in testis animalium, cornu & ebore, negavit reperiri *Cl. Nicolaus Lemery* f, confirmavit tamen nuperimus & locupletior auctor *Vincentius Menghi-*

v *Histor. vit. & mort.* p. 67.

x N. 475.

y *Merkwürdige Haarkrankheit*, p. 229.

z *Ann.* 1723. p. 177.

a *Anatom.* p. 336.

b In fetus *Mussipontani* secundin. p. 103.

c *Perspirat. Hipp.* n. 946. seqq.

d *Des Serres, Mais. rustique*, p. 170.

e Id enim omne aut perfectum ferrum aut imperfectum esse *Petrus w. Musschenbroeck* recte monet *Essais de Physique*, p. 29.

f *Memoir. de l'Acad. des Scienc.* 1707. p. 40. *Histoir. de l'Acad.* 1709.

*nus g*, & in carnibus animalium, & in ossibus ferri elementum reperiri, in ossibus equidem parcius *h*. Quod eo promptius admittas, cum in ligni cineribus ubique reperiatur. Facile intelligitur, hujus metalli accessione firmitatem fibræ animali addi.

Altera pars fibræ humanæ *gluten* est, fluida nempe, verum quæ cum terra cohæserit, absque qua, si terræ elementa fuerint, friabilia se respuunt, neque cohærent, non ignorante *Stablio i*. Hujus glutinis præsentiam ergo declarat solutio dilabentis in sua elementa fibræ, quæ vinculum suarum glebularum per ignem aut putredinem amisit; deinde ejusdem fibræ recuperata firmitas, quæ tota diffilabilis, aquam aut oleum nacta, avida sorbet *k*, cumque utrovis elemento solidam constantiam recuperat, experimento sæpe facto, & inprimis a *Boerhaavio l*, & nuper a *Cl. Buta m* in cornu cervi usto cum oleo cocto, soliditatem recuperante; mechanicæ etiam cylindrorum cohæSIONES docent, quæ obtinentur aqua interfusa, & etiam magis oleo. Eo glutine per ignem deleta ossa, carbones, charta scriptoria *n*, pili, figuram quidem fi-

*g* *Comment. Acad. Bonon.*  
Tom. II. Part. II. p. 251,  
252. in cane, equo & homi-  
ne. *Galeacius* *ibid.* p. 29.  
In calculo humano ferrum  
reperit *Listerus*.

*h* In homine ex ossium li-  
bris duabus partem grani  
omnino quintam *Menghinus*  
*l. c.*

*i* *Zymotechn. fundam.* p. 49.

*k* *Kaauw. Baerhaave perspir.*  
*Hipp.* n. 957, 961.

*l* *Elem. Chem.* Tom. II.  
p. 360.

*m* *Disp. de ossium natur.* n.  
6.

*n* *Bonanni obs. microscop.*  
p. 130.



brarum retinent, constantiam vero & robur amittunt. Ambusta hæc corpora fumi specie suum gluten ablegant.

In ossibus evidentius gluten est o, & facilius ostenditur, quorum magnam portionem ipsum efficit: idemque inprimis per *Dionysii Papini* p experimenta innotuit, qui magni olim viri *Boylei* ad chemica experimenta adjutor fuit & minister, & per *Hubini* q similia fere pericula. Lebetes cylindricos adhibuit ille quidem duos, qui accurate sibi congruentes & compositi, ut nullum omnino vaporibus effugium superesset, igni cum aqua & ossibus contentis imponebantur. Vapores ergo aquæ ab ebullitione nati, & summe elastici, omnia ossium intervalla penetrabant, elementa disjiciebant, gluten extrahebant, terræque sua vincula subtrahebant. Ita cartilago pene tota in gelatinam abibat r, de osse autem gelatina secedebat, cujus tanta visciditas est, ut aquæ portionem sedecuplam inspisset, si ex cornu cervi nata fuerit s, & quindecuplam t, quæ ex ebore paratur. In fetu duas tertias partes ossis gluten efficit v, & duæ tertiæ par-

o Stahl l. c.  
p Nouveau digesteur ou  
l'art d'amollir les os, & continuation du nouveau digesteur.

q In Zodiac. Med. Gall. ann. 3. p. 80. Memoir. de l'Acad. des Scienc. avant 1699. p. 321. Journal des Savans 1681. n. 15. Nollet

Cours de Physic. experiment. Tom. IV. p. 40.

r Nouv. digesteur, p. 52.

s Pag. 34, 59, 60.

t Contin. du digest. p. 19,

21.

v Nempe dissolubiles sunt duæ tertiæ partes ossium fetus Nesbit osteogen. p. 31.



tes ossis diffiantur ( in adulto homine, ex *Keilii* calculo, dimidia  $x$ , in senio minorem ). Sed omnino tenerorum fetuum ossa merum sunt gluten, fluidius primo, inde collæ simile, quale in pullis incubatis sæpe vidi, & descripsit Cl. vir *Josephus Exuperius Bertin*  $y$ . Incredibile est in primis initiis gelatinosi ossis, quam parva squamula de integro femore in experimentis nostris superfuerit. Tener agnellus leni calore coctus, totus cum ossibus in meram mucilaginem dissolutus est  $z$ . Quando hoc gluten extractum est, os, aut cornu, aut ebur aëri redditum friabile nunc est, & digito cedit  $a$ , etsi laminæ situm suum conservant. Ejusmodi ossa apta sunt testis docimasticis parandis, quæ magnam vim ignis absque rimis sustinent  $b$ .

Alio modo idem ex ossibus gluten educi potest, coctione nempe rasi ossis: perinde enim decocta aqua in gelatinam abit, gummi similem tremulamque, satis adfinem scriniariorum glutini, quod & ipsum ex resegminibus pellium animalium, & tendinibus, & cartilaginibus excoquitur  $c$ : eæ enim corporis animalis partes & tenacissimæ sunt, & glutine ditissimæ.

$x$  *De velocitat. sang.* p. 32.

$y$  *Osteolog.* Tom. I. p. 267.  
Tom. II. p. 488, 439.

$z$  *Schrader de pane.*

$a$  *Nollet* l. c. *Malouin*  
*Chym. Medic.* Tom. I. p.  
169.

$b$  *Hellot ad Schluteri Opus*  
*metallurgicum*, Tom. I. p.  
110. Testæ enim fiunt ex  
bovm ossibus, de quibus glu-  
ten extractum est.

$c$  *Le Clerc Malad. des os*,  
cap. IV.

simæ. Ita sensim omne gluten extrahi potest, ut sola cretacea terra supersit *d*.

Sed etiam gluten ex ossibus obtinetur, acore superfuso, deinde lixivio, ut terra fundum petat. Proprietas, qua hoc gluten terrea & sicca ossium elementa unit, ex Cl. etiam archiatri *Petrì Shaw* experimento adparet *e*, qui gelatinam debubulis ossibus extractam, fragilibus his ossibus, in digestore exhaustis, reddidit, atque durtatem nativam, & totam ossis similitudinem restituit.

Sed etiam frequens est membranarum in gelatinam conversio, & vicissim gelatinæ in membranas. Ipsa sponte gelatina fila trahit: ex albuminosa parte sanguinis agitando fila parantur & membranæ, quod alibi repetemus, & frequentissime ex gelatinosa aquula pericardii cavique pectoris verissimæ membranæ nascuntur, quæ pulmonem ad pleuram revinciunt. Morbus stridulus, quem Scoti Croup vocant, a muco solo in aspera arteria in membranam spuriam coacto provenit.

Vicissim in gelatinam membranæ resolvuntur. Ipsa vis morbi ventriculi & intestinorum tenuiorum aliasque membranas in gelatinam resolvit. Ichthyocolla, quæ ipsa est interior tunica vesicæ natatoriae, cum aqua & cum debili frumenti spiritu in gluten abit. Ab eodem

---

*d Freke Essay on the art of Chymical lectures, p. 176. healing, p. 242.*



glutine elaterem fibræ *f*, & forte irritabilem naturam pendere alibi demonstrabitur.

Hujus autem glutinis natura non difficulter invenitur. Putrefacta de ossibus gelatina sponte putrescit, & volatilis exhalat *g*. Gelu de ossibus aut ebore natum, ad ignem reddit aquam, salem volatilem, & salis marini atque fixi aliquantum *h*: idipsum etiam gluten chemica analysis de omnibus animalium partibus, pilis, unguibus, carnibus, ossibus expellit, semper sibi simile, salibus ex vi ignis natis, cum aqua, & oleo compositum. Et tamen, nisi ignis accesserit, ut albumen solet, ita gelatina animalis insipida est & inodora, ut facile credamus Cl. viro *Turberville Needham*, tum demum succos glutinosos probe alere, quando maximam partem salium suorum deposuerunt. Pars plurima aqua est, aliqua oleum, hujus enim ad glutinationem maxima vis est *i*, & ipsam ex oleo argillæ tenacitatem nuper Cl. *Eller k*, deduxit.

Sed etiam aëris in hoc glutine magna portio est, quam inauditam priscis hujus elementi proprietatem *Stephanus Hales*, vir sæpe a no-

*f* *Paulowfski de fibra debili.* ostendit, ut cohæiones au-  
*g* *Teichmeyer Anthropotog.* geantur interfusa aqua, sed  
 p. 67. magis ab interfuso oleo.  
*h* *Geafroi, Mem. de l'Acad. des* *k* *Mem. de l'Acad. des*  
*cad. Roy. des Scienc. 1732.* *Scienc. de Berlin, 1749.* *Urbanus Hiärne* sulfur habebat pro  
 a principio. præcipuo corporum vinculo  
*i* *P. van Musschenbroeck instit. physic. 19.* Idem vir *Act. laborat. p. 90.*  
*clar. de cohæs. corpor. p. 435.*

bis laudandus, primus, ut nunc quidem memini, nobis aperuit, deinde ego, inde nuperi Angli in physiologiam receperunt. Nempe non in fluidis corporis humani partibus solis aer est, qui elaterem & naturam compressilem deposuit, ab igne vero, aliisque causis, alibi enumerandis, in naturam atmosphaerici aeris similem restituitur: sed plurimus omnino, ejusdem indolis, aer firmis corporis animalis partibus inest, exque iis aut ignis vi, aut solventis liquoris expellitur. Inest autem fere pro eadem portione, qua quæque corporis animalis particula firmior est, & in ossibus quidem ad ducentuplam molem ossis ipsius *l*. Ex cornu cervi natus aer etiam 234plam molem ipsius cornu replet, & dum in osse fuit, ejus totius fecit partem septimam *m*. Videtur aer vinculum elementorum primarium constituere, cum non prius ea elementa a se invicem discedant, quam aer expulsus fuerit, qui in omni solutione sub bullarum specie adpareat, in ipso etiam humano calculo, inque silice *n*, aut alio quocunque duro corpore. Qua vero ratione is aer vires suas repellentes deponat, & mutet in vires adtrahentes, atque cohæSIONEM glebularum corporis solidi augeat, id equi-

---

*l* Analysis of the air in Cl. of experim. Philos. Vol. II. viri Vegetable statiks C. VI. p. 403. & Browne Langrish Experim. 119. p. 296. &c. of muscul motion in Phil. *m* Ibid. Exp. 151. Confer. Transf. suppl. 1747. p. 7. J. Theoph. Desaguliers in *n* Bened. Stæbelin in Epist. Philos. Transact. n. 454. p. ad Dav. Hartley. 178. & in ejusdem Course



dem ut ab experimento demonstratur; ita ad mechanicas aliquas leges referri nequit o.

Nuper video in hac mea theoria & glutinis aquosi atque oleosi vim elementa terrea colligante Cl. viris displicere, & aërem. Nihil horum meum est. Aërem apud Cl. *Stephanum Hales* inveneram; eo utique usus, dum ab aliis physiologiæ scriptoribus negligebatur, gluten ipsius est *Boerhaavii*.

Sed neque causam invenio, cur a sententia recedam. Esse in fibra aquam & oleum certum est: ex his elementis gluten fieri certum est; eo præfente elementa terrea conjungi, eo ut-  
— cunque destructo discedere, perinde certum est.  
— Particulæ terreæ non videntur se trahere sibi relictæ, nam & in gypso, & in calce, moleculæ durissimorum lapidum in pollinem non cohærentem abeunt, idemque gypsum in lapidem continuo redit, quando aqua amissa ei reddita est.

De aëre ne verbum addo: frequentissima nostro ævo in aere fixo experimenta fiunt, neque ullum est ex millenis, quin confirmet, nullum corpus in elementa dilabi, nisi is aër per ignem per putredinem aut aliam aliquam violentiam abactus fuerit. Neque ullum corpus putrescit, quin aër prius secedat o\*. In ossibus parciolem esse o\*\* novi. Non ignoro claros

o Si tentamen hujus interpretationis legisse lubet, dedit id *Michael Lomonossow* in *Nov. Comment. Acad.*

*Scient. Petropolit. Vol. I.*

o\* *Bertholet de l'air.*

o\*\* *Wiegleb von der Gährungs- rung p. 130.*

viros esse, qui hanc aeris efficaciam rejiciunt  
o\*\*\*. Neque tamen video cur rejiciant.

Ex his nunc elementis, terra, aqua, oleo, ferro & aëre conjunctis *fibra* nascitur, elementum corporis animalis, invisibile ubi simplex, multo minus, quam quod microscopiorum vi augente adhibita oculis nostris subjici queat, cum minima animalia, quæ ipsa vehementissima lentium & sphaerarum vitrearum vi aucta demum oculis nostris conspicua fiunt, tamen ipsa perinde fibris consent, multo certe mole totius animalis minoribus.

Invisibilis ea fibra, quam sola mentis acie adtingimus, ex solis elementis terreis & glutine, non ex minoribus fibris, composita *p*, cum sui similibus abit in duo conspicua elementa solida corporis animalis. Eorum primum lineæ fere simile, cum exigua latitudine longum est, & vulgo *fibra* dicitur. Id enim, quod videmus, filum ex aliis minoribus componi ipsa communis naturæ lex suadet, quæ nusquam elementa pura oculis subjecit. Deinde microscopia fibram osseam, & muscularem in filamina decomponunt; inque ossea fibra fasciculos fibrillarum ostendunt, ex Cl. du Hamel *q* experimento: fibræ vero musculares studio Antonii v. Leeuwenhoeck *r* & Guilielmi Wieri Muys

o\*\*\* Bertholet Smeth de aere fixo.

*q* Memoir. de l'Acad. Roy. des Scienc. 1743. p. 128.

*p* Conf. Cl. Ludwigi Phisolog. n. 130,

*r* Hæc. fufius dicentur, quando sermo erit de fibrâ musculari.



in fila minora ita discedunt, ut nulla vis vitri convexi divisionis finem inveniat. Quæ de ossæa fibra ostenduntur, ea procul dubio de membranea valent, membranea enim olim sæpe fuit, quæ nunc ossæa est. Plurima autem fila, secundum longitudinem sibi applicata, & parallela, & cum aliis pariter ad fines extremos sibi conjunctis composita, in unam fibram conspicuam consentiunt, ut neque longitudo simplex sit, neque latitudo. Quæ vero primum conspicuæ fibræ sunt, & nudo oculo simplices videntur, eæ longæ & evidentes in ossibus infantum adparent, ut in latis illis sincipitis, frontis, & occipitis ossibus, & parallelæ sibi, rimaque longe distinctæ, juga interposita efficiunt. In balænarum barbis pariter insignes, & manifesto ex fasciculis sui similium compositæ, cernuntur. In tendinibus eadem, & ligamentis, & dura membrana cerebri, & alibi manifesta sunt mole. In cellulosa tela, quam continuo dicemus, cum laminis miscentur. In cartilaginibus breves, denseque stipatæ s ostendi possunt. Omnium communis, quam nunc dicam, natura est.

Elastica est, & flexa resilit fibra, suamque brevitatem recuperat. Etiam in ossibus hæc natura fuit, & fere superest, si subtilia fila separaveris. Pleræque in longitudinem, si lenta  
vis

vis fuerit, se extendi patiuntur, non ideo cessaturæ se restituere, si dimiseris. Contra fibra non est irritabilis, si a musculosa discedas *t*. Nempe quocunque modo tacta & irritata, dum integra est, brevior minimè redditur. Neque enim stygiarum aquarum vim pro declaranda fibræ natura admittimus, ignisve; ea enim immanis violentia utique fibras animales omnes, etiam dudum exanimes, crispat & contrahit *v*. Non ideo nulla fibræ vis contractilis est: inest, & in vivo animali & in mortuo, etiam in sicca cute, in animalium intestinis, certe in elasticas chordas contortis. Dum humecta est, fibra se contrahit, minus rapide quam muscularis fibra, ut minori ad longitudinem suam ratione decurtetur: sed dudum sicca membrana discissa se retrahit, chorda vero etiam validissime se convolvit. Id volo, ferrum enim non sentire fibram, telam cellulosam, membranam, neque perinde adeo, ut muscularis fibra, conspicua pollere irritabilitate. Insensibilis spongia *x*, a sola nervorum accessione sensum admittit. Eadem ex natura sua exsanguis & solida *y*, nullo artificio aut repleri potest, aut in ea cavea aliqua ostendi. Pondus, quam aquæ, paulo majus est, ut omnes partes solidæ corporis animalis, nisi dum computrescunt, spongia sub aquam descendant. Putre-

---

*t* Diff. sur l'Irritabilité, p. 53. Premier Mem. *x* De Gorter l. c. p. 267. Diff. sur les part. sensibl. p. 42.  
*v* Ibid. Section 19. Second Mem.

*y* De Gorter l. c.



do aëri fixo naturam elasticam & levitatem reddit, qua corpus reddit natatile, in quo] evolvitur. Albus color in fibra dominatur.

Secunda fibræ species, *lamina* est, quæ cum modica longitudine satis conspicuam latitudinem habet. Eo autem nomine non ossium amplissimas laminas volo, sed cellulosæ membranæ folia, simplicia ea, aut certe in minores laminas non resolubilia, tum septula corporis vitrei in oculo, squamas cartilaginum & alia id genus. Omnia præter latitudinem, cum fibra communia habet.

## SECTIO II. TELA CELLULOSA.

**E**x utroque nunc genere, aut solo altero aut conjuncto utroque, fibrarum & laminarum, componitur amplissima illa corporis humani portio, quæ *cellulosa tela* nuperis scriptoribus dicitur. Alicubi fibræ dominantur, ut in ossium longorum cellulositate fibrosa, inque macilentis vaginis arteriarum, qualis, insigniter longa fila nacta, carotidem sub cranio illigat.

Laminæ in epiphysibus ossium, in humore vitreo, in muscutorum intervallis, quæ lacertos distinguunt, in pulmone, in intestinorum cellulosis, quas vocant, tunicis, inque omni ea sede, quæ adipem recipit, copiosissimæ reperiuntur, ut plerumque videatur tenerior cellulosa tela filis fieri, crassior magis laminis.

Sive laminis fiat, sive fibris, rete est, quod *cellulosa tela* vocatur, varie inter se connexis elementis factum; ut areolas intercipient, graciles & longas, si fila longa fuerint, ut in vaginis arteriarum venarumve; latas, ubicunque plurimam pinguedinem congeri necesse est, quales areolæ pollicem latæ circa renes visæ sunt; minimas demum & ægrè conspicuas, ubicunque tela ista in membranam stipata est.

Ipsa rei simplicitas forte fecit, ut serius præcipua hæc animalis corporis pars innotuerit. Veteres ejus aliquas regiones aliis cum nominibus cognitatas habuerunt, & tunicam muscutorum communem dixerunt, membranam adiposam, vaginalem; darton. Paulo propius *Carolus* olim *Stephanus* vincula exigua, quibus vasa cohærent, omnino dixit z. Hic est contextus fibrosus, cujus stamina per pinguedinem deducta sunt *Adriani Spigellii* a, *Johannis Veslingii* b, & *Antonii de Marchettis* c. Hæ sunt *albæ fibræ minimis filamentis colligatæ*, quæ de adipe cordis consumto supersunt, *Raimundi Vieussens* d. Primus nos meliora docuit *Marcellus Malpighius* e. Inde *Fridericus Ruysch* flatu impulsio areolas hujus telæ aëre reple-

z *Dissect. corp. hum. p. in diff. de pinguedine. Altdorf 1674. n. 10.*

a In operis anatomici L. VIII. c. 3. d *Du cœur* p. 33.

b *Syntagm. anat. ed. Patav. ann. 1647. p. 5.* e *De omento, pinguedine & adiposis ductibus* p. 40. & alibi.

c Apud *Maur. Hofmannum*



vit, repletas sub nomine propriæ tunicæ in intestinis, inde in scroto descripsit *f*. Iterum propius ad verum accessit *Jacobus Douglas g*, & Ill. Senex *Jacob. Benignus Winslow h*, quorum ille cellulofam lanuginem peritonæo circumjectam, iste vaginas cellulofas vasorum & pleuræ circumdatam telam descripsit. Neque negligi velim, quæ *Præceptor noster Ill. Boerhaave* ad historiam hujus telæ adjecit *i*, & in eximio suo opere Ill. *Kaauw Boerhaave k*, & alter Ill. noster præceptor *Bernardus Siegfried Albinus l*, & vir gen. *Carolus Augustus a Bergen m*, & noster olim auditor, *David Christophorus Schobinger*, medicus nunc Sangallensis, qui nostra inventa multis etiam suis experimentis confirmavit *n*, & *Franciscus de Thierry*, qui post nostra experimenta, cellulofam telam pro materie plerarumque corporis humani partium adgnovit *o*. Nuperiora sunt de hac membrana *Theophili de Bordeu*, ejusque adseclarum merita, qui textum fere mucosum dixerunt. Mireris autem omnino, cum tanto nuperior sit

*f* In *Catal. mus. rarior.* p. 146. f. i. ann. 1691. edito academicarum.

& alibi. *m* De membrana cellulosa Francos. ad Viadr. ann. 1732.

*g* De periton. n. 8.

*h* *Expos. anatom. III. des tegumens* & alibi. *III.* & in collectionis nostræ Tom.

*i* In præfat. ad *Aphrodisiacum.* *n* De telæ cellulosæ in fabrica corporis humani dignitate Gotting. 1748.

*k* De perspir. n. 771. &c.

*l* In diss. Ill. fratris de intestinorum tenuium fabrica, & nuper in T. II. annot. *o* In disp. Ergo in celluloso textu frequentius morbi & morborum curationes. Paris. 1749. 4.

## SECT. II. TELA CELLULOSA. 21

aut me aut Schobingero, ei viro adeo magno consensu Gallos tribuisse, quæ nos non solum vidimus priores, sed diximus: mea enim experimenta prius, ut æquum, est facta, anno 1747. in *primis physiologia lineis* descripta sunt.

Quas sedes hæc tela teneat, sequitur ut indicemus. Et primo quidem undique sub corporis humani tegmine, id inter & musculos, cellulosa fabrica plurima est, quam inter involucra corporis universi vetustas numeravit, & adeps pene ubique, paucissimis locis exceptis, plurimus replet. Deinde exterior ambit magnas illas membranas, quæ corporis humani viscera suis quasi faccis continent. Efflorescit adeo ex pleuræ externa facie *p*, undique, tum qua ea musculis intercostalibus, & septo tranverso, & vertebris, & costis fulcitur, tum qua duo pleuræ facci sibi obversi mediastinum efficiunt. Eadem peritonæum *q* undique ambit exterior, tum qua notissimum musculis abdominis, & diaphragmati conjungitur, tum qua vesicæ, & utero, & recto intestino, renibusque & vertebris is faccus insidet, denique, qua subtiliori modo peritonæum duplex in propriam caveam redit, duoque ea sibi obversa folia mesenterium, mesocolon, aliave viscerum abdominis & uteri latiora ligamenta efficiunt. Ubique enim inter-

---

*p* Fulse dicetur in lib. IV. *q* Descriptum dedit Doude corde. conf. de his vagi- glassius & Henslingius, in lib. nis Borden tiffu muqueux *p*. de peritonæo.



vallum earum duarum laminarum cellulositas exterior replet. Eadem simili modo inter peritonæi faciem, quæ interna fuit, & nunc membrana extima dicitur intestinorum, & ventriculi, & vesiculæ felleæ, eam membranam efficit, quam cellulossæ primæ nomine adpellant. Denique cellulosa tela, subtilior eadem, arachnoideam inter & piam membranam cerebri & cerebelli exterior piam amplectitur. Sed etiam aliæ membranæ propriæ viscerum, cordis, pulmonis, renis, cellulosis filis suis cum subjecto parenchymate revinciuntur.

Porro eadem cellulosa tela musculorum *r* & fibras, & fibrillas, & lacertos, & totos ventres, undique amplectitur nectitque, ut & integrum circa muscolum saccum faciat, & circa singulos lacertos, fibrasque circa singulas, & circa fibrillas demum, ad minima usque fila vaginas det, eo teneriores & magis fibrosas, quo subtilior carnea fibrilla fuerit, latis vero laminis conspicuas, quoties ingentes musculos cingit. Neque ullum exemplum, aut in homine, aut alio in animale est, fibram carneam ullam, liberam arteriam ullam *r*<sup>\*</sup>, absque cellulosis filis repertam fuisse. Eadem crassior musculorum discrimina designat, & in-

*r* Describetur eadem minutius in lib. IX. de motu musculorum.

*r*<sup>\*</sup> Gorter l.c. In panno libera, neque connexa fuisse cum

albugine a Schulze & Schafner mechan. cur. vuln. Sed ego manifesto cellulossam telam eamque pinguem circumjectam vidi.

ter omnes toros corporis humani plurima colligitur s.

Deinde omnia in corpore humano vasa t, arteriæ, venæ, nervique, vagina cellulosa ambeuntur, sæpe, ut in artubus plerumque, pingui, alias, & in visceribus inprimis, macilentata. Innumera enim fila cellulosa & arteriam seorsim, & venam, & nervum ambeunt, & undique ad sodalia vasa revinciunt: majorque iterum & magis conspicua tela totum vasorum nervorumque fasciculum ad musculos, aut ossa vicina adligat. Pariter hic, ut in musculis, quo majores trunci fuerint, ita magis lamellata, & adiposa, & laxa tela est. Minimos vasorum nervorumque furculos tenerrima, semper tamen conspicua ambit, & ad membranam aliquam vas suum nervulumve firmat, ut nullus ramulus liber incedat, & tum demum elevari possit correptus, quando manu anatomica vincula cellulosa resecta fuerunt. Maxime notæ vaginæ sunt, ea quæ genitalia vasa amplissimis laminis ambit, tum quæ fibrosa hepatis truncos capsulæ titulo colligat, aut sæpe a *Lancisio*. *Hebenstreitio*, aliisque descriptæ vaginæ pulmonalium vasorum, & carotidis arteriæ.

Iterum, ubicunque unum cavum tubum

---

s Hanc crediderim esse scripti *Beschreibung von Is-*  
riem ramosam sinuum, qui-*land* p. 210. seqq.  
bus sperma ceti verius in ba-*t Cl. Rosen anat. beskrifn.*  
læna continetur, & qui ii-*p. 128. seqq. Grashuys de*  
dem per totum corpus se-*suppur. p. 69. Walther de*  
millenis vasis (aut striis) *obes. & vorac. p. 11. &c.*  
didunt, ab *Andersonio* de-



plures sibi impositæ tunicæ efficiunt, has inter tunicas totidem cellulosa retia sunt, quæ & duas sibi circumnatas membranas distinguunt, & easdem inter se uniunt: exempla in arteriis, venis, intestinis, ventriculo, vesica urinaria & fellea, oculi bulbo & uvea membrana, & alibi præsto sunt.

Sed etiam glandulosos acinos, quousque armatus oculus penetrat, cellulosa tela inter se invicem conjungit, & solidior eadem toti glandulæ est pro involucrio: glandulas vero conglobatas suo quamque loco firmat, & cum mobilitate suspendit.

Aliud etiam genus est, & aliud officium cellulosæ telæ, ut caveas varias corporis animalis repleat, quas undique firmum aliquod involucrium continet. Huc possis cellulositatem eam referre, quæ osse coercita, medullæ nomine adipem recipit *v*: huc evidentius pertinet spongiosa illa laminarum textura, quæ corporis cavernosis penis, aut clitoridis, cavea continetur, & sanguine inebriatur. Ita porro similis fabrica, equidem tenerior, in pulmone aërem, in funiculo umbilicali mucum, in humoris vitrei cellulis alium limpidissimum laticem continet. Simillima omnino cellulosa spongia caules immaturos plurimarum herbarum replet, eademque, in jam adulta planta, aut in membranam abit, aut in lignum *x*. Sed etiam vasa plantarum

---

*v* *Kaum de perspirat.* n. 929.

*x* Conf. Cl. *Ludwig inst. regn. veget.* n. 318.

teneriorum certe & juniorum cellulosa tela replentur. In cristis & plearibus avium similis, sed sanguinem receptura subest cellulositas. Demum in ossibus planis manifesto ostendimus cellulosum rete, quod ossi pro fundamento est, quod idem lymphæ in areolas deposita abit in gelatinosam cartilaginem, terra vero in eadem spatiosa effusa in os  $x^*$ . In ossibus longis eandem fabricam Cl. *Herissant* ostendit, & demum in testis  $x^{**}$ .

Adeo late cum pateat cellulosa tela, cum suis cavernulis, undique tamen ex qualibet ejus sede in quamlibet regionem patula via est, ut aer, aut liquor quicumque, qui in quamcunque sedem animalis corporis effusus fuerit, in omnem aliam partem, etiam remotissimam, per cellulas istas fluere & moveri possit. Si quando vero solidum corpus casu in aliquam cellulosæ telæ regionem inciderit, id ad omnem aliam sensim poterit promoveri. Cum hæc a *Boerhaavio* detecta & cellulosæ telæ natura magni momenti sit, eam per plusscula & diversi generis experimenta demonstrabimus, deinde anatomica administratione confirmabimus.

Et primum aer sub cutem missus, sive consilio id factum fuerit, sive infelici casu, totam superficiem corporis animalis idem celeriter

$x^*$  *Mem. sur la struct. des os. Cruvel osteogenes.* qui flatum de cellula in cellulam transisse vidit. ■

$x^{**}$  In *Mem. de l'Acad. des Scienc. &c.*  
 y *Prælect. ad ventriculi actionem.* n. [82.]



perambulabit, totamque undique a musculis cutem divellet & distendet *y*\*. Neque ibi moram faciet aër, sed musculotum intervalla subibit, & fraudulente torosam animalis speciem præsentabit, quæ, aëre a vaporibus continuo sub cutem exhalantibus inquinato, & elastica ejus vi destructa, post aliquot dies subsidebit. Illud quidem prius rude experimentum a lanionibus frequentissime exercetur, quo pellis, soluta suis nexibus, purius de carnibus secedat *z*. Legas ipsum ursum hujus arcani artificii non ignarum esse, & cadavera inflare *z*\* ut cutis decedat. Alterum, aliquanto subtilius artificium in equis *a* in patria mea minus insolens est, quam quidem bona fides ferret, deinde in vitulis in Anglia *b* & in Germania administratur, & in ipsis vastissimis per orientem camelis *c*. Sunt equidem, qui veram hac inflatione obesitatem obtineri scripserunt *d*, an vero satis certa fide, ignoro, etsi hic quidem eventus nihil ad nos facit. Demum nuper scriptum est, Nigritas

*y*\* Cl. *Abadie* nuper experimenta fecit, aerem adigit in cellulosam telam; ita emphysema natum est quod abdomen, faciem, palpebras, femora, pulmones, pericardium, lienem, universum corpus occupavit.

*z* *Vesal. de corp. hum. fabric. pag. 281. Riolanus in Bartholinum p. 762. anat. pneumat. p. 167. Enchirid. pathol. p. 439.*

*z*\* *Kalm resa II. p. 246.*

*a* Conf. *Gibson in anat. equi p. 57.*

*b* *Lister de humorib. c. 19. Comper ad Bidloo T. IV. ad f. 615. In bobus vide Casaubonum Lib. V. comment. in Athenæum.*

*c* *Tavernier Voyage de Perse Liv. II. c. 9.*

*d* *Plinius Lib. VIII. c. 45. Mauchartus senior in eph. nat. cur. cent. 1-2 obs. 12. Aristoteles in hist. anim. L. VIII. c. 7.*

oræ Dentariæ ut rheumatismo medeantur, cutem bono eventu sufflare, idque auxilium etiam Belgas bono eventu imitatos esse. *d\**. Eodem artificio, sed innocentiori, *Ruyfchius* fetus siccatos, ne monstrosa facie displicerent, impulso sub cutem aëre, in teretem speciem restituere solebat *e*. Neque defuit impurus homo, qui propriis filiis corpus ad utris similitudinem inflaret *f*, aut hydrocephalum arte imitaretur *g*; aut infelix alter, cui corpus latronum crudelitate inflatum ita intumuit, ut collum sibi ipsi aperuerit, quo suffocanti aëri viam pareret *h*. Taxos se ipsos inflare posse, ut toti rotundi fiant, *Plinius* auctor est *i*.

Eadem omnino ratione, si per vulnus asperæ arteriæ, aut pulmonis, aër in cellulosa spatia inter costas musculosque, aut in cellulas, quæ vertebris circumponuntur, exierit, aut alio quocunque modo per incisam cutem aër cavernulis subcutaneis receptus, collapsio vero vulnere exitus ipsi negatus fuerit, poterit is aër per totum corpus hominis ambulare, atque a calore naturali dilatatus mirum illum, undique continuum tumorem excitare, qui emphysema dicitur. Ex innumerabilibus exemplis pauca adduco. A castratione, aër receptus fecit emphysema totius corporis, ut etiam mesenterium, & venæ, & cor ipsum denique aë-

*d\** Galandat Mem. de l'Acad. de Berlin 1772.

*g* Hildan. cent. 3. obs. 18.

*h* Imbert des tumeurs p.

*e* Advers. anat. III. n. 10. 241.

*f* P. Borellus histor. 30. cent.

*i* Lib. VIII. c. 38.

*3.* Ill. Rosen anat. p. 129.



re plenum fuerit *k*. Post vulnus penetrans laryngis frequentia emphysemata, etiam manuum pedumque, apud *Eliam Col de Villars l*. Ex dissecta aspera arteria, & ex fracta costa, emphysema universale apud *Guilielmum Cheselden m*. Ex fracta costa emphysema totius corporis, planta pedis volaque manus exceptis: aer exierat per vulnus laceratæ membranæ pulmonalis *Alexius Littre n*. A vulnere pectoris emphysema totius corporis, etiam palpebrarum *J. Godofridus Berger o*. A fracta costa emphysema per totum corpus, quatuor digitorum crassitie *p*. Cellulosa tela subcutanea, in pectore ad quinque, in ventre ad sex uncias inflata, ipsi oculi distenti, & in humore aqueo aer *Alexius Littre q*. In aliis exemplis, absque vulnere, aer internus undique se per cellulosas telas diffudit. Emphysema universi corporis, etiam penis *Binninger r*. Emphysema spontaneum ex perspiratione suppressa, ut etiam mammæ fororiarent *J. H. Schulze s*. Inflatio universi corporis, etiam penis, in puero, ex suppressa febre *Cl. Mann t*. Ex vulnere frontis emphysema ad abdomen continuatum *t\**.

*k* *Monro Sen. Essays of a Society at Edinburgh* T. V.

*l* *Cours de Chirurg.* T. II. p. 170.

*m* *Anat of hum. bod.* Ed. 6. p. 130.

*n* *Memoir. de l'Acad. Roy. des scienc.* 1713. p. 12.

*o* *De tympanite* p. 26.

*p* *Le Dran* obs. 29.

*q* *Memoir.* l. c. p. II.

*r* *Obs.* 100. cent. 4.

*s* *Disp. de emphysemate.*

*t* *Tripes Haitersbacensis* I. Tubing. 1755. 4.

*t\** *Gwoch Wounds* p. 292.

Æque late aqua se diffundit, quando ea in hydropo anasarca stagnat. Univerforum musculorum intervalla aqua plena *Guilielmus de la Motte v.* Aquæ hydropicæ in omnia cellulosa spatiola diffusæ, ut etiam cavernosa penis corpora ichore turgent, & sub musculorum membrana, inque musculis & eorum intervallis, gelatina reperiretur *Cl. Beggi x.* Aqua in abdomen animalis impulsæ ipsam inter duram matrem piamque apparet. *x\*.*

Abcessuum eadem natura est, ut pus ex fomite suo, quem in suppurato viscere nactum est, late per universum corpus se diffundat. Pus in pectore, & communicatio ejus abcessus inter musculos ad clunes ipsos pedemque *Corn. de Velse y.* Ulcus renis continuatum ad femur usque, ut pus totum utriusque membri intervallum replet *z.* A parotide suppurata & clausa, pus ad cubiti flexum descendit, & ligamenta cubiti corrumpit, ut ancylosis sequeretur *Ger. v. Smieten z\*.* In gibbo phthisico retro pleuram faccus albo pure plenus, & simile pus in pancreate, mesenterio, hepate, axillis, collo, inguine, infra duram piamque matrem, & demum in articulis, ut etiam cubitus exciderit, *J. Nicolaus Weifs a.*

*v* Chirurgie complete obs.  
126.

*x* Apud A. Pacchionum in  
oper. omn. p. 219. & Meibom.  
de pede tumid. p. 14.

*x\** Abadie.

*y* De ingressu intest. p. 34.

*z* Christ. Jeremias Rollin in  
den Braunschweigischen An-  
zeigen a 1751,

*z\** Comm. in Boerh. aphor.  
T. I. p. 705.

*a* Progr. 5.



Ostendimus, quam late cellulosa cavernula in se pateant invicem. Quare materies, quæ in ea spatia effusa est, si motus accesserit, poterit ex omni sede in omnem progredi. De fluido adipe struthiocamelorum mirum exemplum est, quem arabes, concussa ave, ita norunt colligere, ut ex unico vulnere de universo corpore effluat *b*.

Eodem modo pus, quod ostendemus liquefactum esse adipem, per aliena loca expediri potest. Ita empyema, quod pleuritidi successerat, per ulcus brachii judicatum legitur *c*. Feminae, quæ pus exspuebat, fetaceo exhibito, symptomata hæctica remiserunt: eademque ablato fetaceo recruduerunt *Ægidius Watts d*. Ut eo facilius veterum illas metastases credas, quas per cellulosa intervalla inprimis progredi ostendit *Gerard v. Swieten e*.

Frequentiora exempla sunt, & idem ostendunt, in quibus aquæ hydropicæ, late diffusæ, per unicum, & sæpe in remota parte inflictum, vulnus effluxerunt. Qui toto corpore tumebat, is norat eum humorem totum in majorem oculi angulum compellere. *e\**. Hydropico, cui ipsæ palpebræ tuebant, incisus cruribus, omnis de vulnere aqua effluxit *Geofroi f*. Sponte apertis pedibus hydropicus sanatus *Fehr &*

lectione III. *Senaci p. 443.*

*b Thevenot Itin. Lib. II.*

*C. XXV.*

*c Eph. nat. cur. dec. I. ann. 6. 7. obs. 147.*

*d Of revulsion and derivation p. 43.*

*e l. c. T. III. p. 669.*

*e\* Robert trait. de med. I. p. 15.*

*f Traité de la peste in col.*

alii *g*; qui equidem eventus adeo frequens est, ut fere quotidiana exempla oculis meis se offerant, & efficacia hujus effluxus etiam feminis nota sit. In hydrope pectoris ex scarificatis pedibus eductæ octo libræ aquæ, & morbus sanatus *Rainssant h*. Inciso a desperata femina talo, & adhibito chalybe cum amaris medicamentis, sanata femina *Rich. Mead i*. Sed integræ gentes non alio præsidio ad aquam inter cutem usæ sunt *k*, & similes curationes felix casus perfecit *l*, ut exusto pede, corpus univ-  
sum aquis liberaretur. Verum etiam sponte per cellulosa spatia hæ aquæ moventur, ut ex pectoris hydrope scrotum primo, deinde ultra descendente latice pedes intumescant *m*.

Denique per cellulosa spatia fiunt miræ illæ migrationes telorum, aliorumque corporum, quæ per vulnera in corporis humani partem aliquam introducta, per alienissimam aliam exeunt, aut certe se excidenda præbent. Ita spinæ hystricis canadensis, quando per cutem penetraverunt, repunt per intervalla musculo-  
rum, donec compuncto aliquo viscere occidant *Sarrazin n*. Ita devorata spica graminis per

*g* De absinth. p. 119. Spind-  
ler obs. 52. Vir. Doctiss. Do-  
nald Monroo, olim auditor  
noster, of dropsy p. 84.

*h* Journ. des Savans, 685. n.  
28.

*i* Monit. medic. p. 132.

*k* Ægyptii apud Prosperum  
Alpinum de medicin. ægypt.  
Lib. III. C. XIII. p. 102.

*l* Boerhaave l. c. p. 296.  
Schulze apud Schenkium in  
obs. med. p. 438. Kundman  
Seltenheiten der Natur und  
Kunst p. 931. Breslauer Sam-  
lungen 1723. M. Jun.

*m* Medici Uratislavienses de  
hydrope pectoris p. 7.

*n* Memoir. de l'Acad. Roy.  
des Scienc. 1727. p. 392. 393.



latus exiit apud *Pareum* o. Acus deglutita ex vena digiti excisa est p, & hordei spica devorata ex ulcere lumborum prodiit apud *Marcelum Donatum* q, quales alias historias hic per suos auctor/s indicavi r. Porro acus brachio infixā post aliquot annos ex mamma dextra emerfit s, & alia, prope ligamentum armillare manus infixā, per summum brachium sexto anno se extrahi passa est *Ravaton* t. Globuli plumbei per thoracem impulsī, ejeḱti per abscessum natium *Bagliv.* v. Ferrum, quod sub scapula subierat, nono anno ex abscessu prope nates eductum *Andr.* a *Cruce* x. Acus natī infixā per inguen exiit *Pareus* y.

In homine porro, videas per eandem cellulosaṃ telam aquam moveri, quæ circa tatum effusa, oedema fecerit. Ea quotidie, per stationem, ambulationem, & calorem adscendit, ad furam peneque ad genu surgit, non ultra

o *Des monstres* p. 488.  
p *Zodiac Med. Gall.* ann. 2. p. 88. 89. *Act. litt.* Suec. ann. 1724. p. 602.

q *Histor. med.* p. 746. 747. Simile exemplum extat in *Nov. lit. Mar. Balib.* 1707. m. mart. & apud *Cl. Doige* in diff. prop.

r Devoratus fufus exiit de hepatis regione *Valisner* oper. T. I. p. 360. Acus deglutitæ ex digitis extractæ Id. ibid. Acicula deglutita in pedem descendit *Memoir. de l'Acad. de Chir.* vol. 1. edit. 12.

part. 3. p. 91. & similia exempla ibid. tum apud *H. van Moenichen* obs. 21. 22. & in *Eph. nat. cur.* dec. 2. ann. 3. obs. 59. Acies scalpelli de vena secta elapsi post aures exempta *Alex. Beniven* de abditis rer. caus. p. 31. b

s *Phil. Transf.* n. 461.

t *Traité des armes à feu* p. 22.

v *Prax. Med. Lib. I.* p. 143.

x *Chirurg. magn. Lib. II.* p. 104.

y *Des monstres* p. 442.

ultra nisi cum periculo. Eadem nocturnam per quietem latius diffusa evanescit. Neque rarum est, in pectore collectum humorem per pediluvia, sponteve sua ad pedes præcipitatum, levamen facere respirationis, per nocturnum decubitus stationem circa pectus repetere, & suffocationem minari. Hæ sunt viæ arcanæ, per quas abscessus moventur, absque vasculis per quæ humor fluat, etsi jam eo ævo aliqui ea vascula vidisse voluerunt, *Caelio* dicti *y*\*.

Per cellulofam telam in plantis vasa omnia moventur, non ideo in homine, uti nuper paradoxo viri *Harveiano* per vasa circuitui iter per cellulofam telam substituere conati sunt.

Sequitur, ut ostendamus, quomodo diversæ cellulosæ telæ regiones inter se consentiant. Initium faciam a capite. Omnes membranæ extus cellulosæ sunt *z*\*. Ergo cellulosa spatia subcutanea cum colli similibus intervallis, inde secundum vertebrae cum pectoris cellulosa tela, cum mediastini posterioris duplicatura, ut vocant, cum ambitu pericardii, cum lanugine pleuræ circumposita & musculis intercostalibus subjecta, manifesto communicant. Libera inde cum aorta pone diaphragma via est, ad similem laminarum cellulosarum vertebrae lumborum impositarum seriem, ad omnem anteriorem peritonæi ambitum, ad spatia interjecta foliis mesenterii, & mesocoli, ad renum

*y*\* *Chron.* V. p. 10. 587. cavi. Similia legas apud *Ill.*  
*z* Per singulas corporis humani *Winslowum Tr. des tegum.*  
partes cellulosæ fabricæ series n. 68. &c.  
descripsit *Clarus* noster *Scho-* *z*\* *Bonn Contin. membr.*  
*lingerus* in disp. quam indi-



adipem, ad cellulositatem subjectam membran-  
nis externis viscerum abdominis, aque cellu-  
losa prima cum ipsis vasis ad cellulosam alte-  
ram ventriculi, & intestinorum. Ab eadem  
lumborum sede cum vasis iliatis ad femur &  
universum pedem anteriorem, præcipua stria  
cellulosa descendit, & vasorum fasciculos se-  
quitur: alia cum spermaticis vasis ad testes it,  
alia ambit uterum, ambit vesicam & partem  
recti intestini utramque, semper exterius peri-  
tonæo circumposita, & a lumborum vertebri-  
nata. Alia propago per foramen ovale pubis  
ad femur cum vasis obturantibus continuatur:  
alia per incisuram ischiadico-sacram ad nates,  
ani ambitum, femurque posterius migrat. Pas-  
sim vero hæc profundior & vasorum comes  
spongiosa fabrica per intervalla musculorum  
cum subcutanea cellulositate communicat, at-  
que adeo & cum vasis, & cum musculis, ad  
extremum pedem abit. Artus superior cellu-  
losam naturam arteriæ subclaviæ circumposi-  
tam accipit, & subcutaneam alteram, & exte-  
riorem thoracis, superstratam infra-scapulari-  
musculo. Ita nulla obscuritas est, quo modo  
ab orbita fronteve ad pectus, mammæque sub-  
cutaneam regionem, & in utrumque artum,  
& in mesenterii sedem pleuræve ambitum aer  
venire possit, aut aqua. Ad penis cavernosa  
spatia cum vasis sanguineis penetrare utrumve  
fluidum probabile est, & ad humoris vitrei  
cellulas. Omnia enim vasa suam habent cel-  
lulosam vaginam, uti diximus, circumpositam.

Prima causa motus adipis per cellulo-

nam telam est vis mortua cellulosa telæ, cujus quodque filum, quævis lamina, in contractionem nititur, spatiosa fibræ laminisque interposita arctat, ita humorem eo premit, ubi minor est resistentia.

Accedit huic vi compressio muscutorum, dum in contractione turgent, & spatia cellulosa sibi interposita comprimunt. Cutis ipsa lenta vi mortua contrahitur, & adipi distendenti resistit, eumque reprimat. Arteriæ, quibus cellulosa tela undique percurritur, & quæ in quoque pulsu vaginas suas & circumjectam cellulosa telam comprimunt, adipem & ipsæ urgent. Denique pondus humorum eos regit, ut vel tumor vespertinus pedum demonstrat, & matutina detumescencia in oedematibus, & levamen insigni 2\*.

Ab humorum motu per cellulosa telam impedito obstructions & abscessus fieri nuperi 2\*\* docuerunt. Lentissima vero ea mala esse ex lento motu adparet, cui sufflaminato debentur.

Quæ hæcenus diximus, ea quidem anatomico cultro fere demonstrantur, & vulgo nota sunt. Tam late vero cum cellulosa tela per corpus humanum dominetur, necesse est, insignem utilitatem esse, quam corpori toti præstet. Ergo ut recedamus ab adipe & a vapore, cui spatia cellulasque parat, princeps officium hujus telæ est, omnibus partibus corpo-



ris animalis suam, ad sapientissimos fines definitam firmitatem impertire. Ea enim tela remota, nervi, muscoli, vasa, membranæ, vacillant undique, & neque suis liquoribus perinde resistunt, neque debito cum robore a vi musculari reguntur, neque sedem suam porro tenent. Sola cellulosa tela, quæ arteriis venisque exterior circumponitur, remota, aneurysmata & varices nascuntur, & arte parari, per nostra experimenta, possunt *a*. Et hæcenus omnino ad temperamentorum causas, firmique aut debilis itaminis discrimen cellulosa tela spectat. Induratur eadem, & inter causas est præcipuas non rugarum solum, quæ senii sunt indices, sed senii ipsius, quod suo ostenditur loco. Adeo duram fuisse vidi, ut sola femora in curvitatem contraheret, artumque fecerit obstipum, cum nulla alia mali causa conspicua adesset.

Quare *tonum*, quem *Stahlius* tanti facit, in tela cellulosa residere tuto ponas, quæ vasis circumposita ea constringit & comprimit, & vicissim a dilatatis suos per humeros vasis ipsa urgetur. Inde illa, quæ in ranis faciebam aneurysmata, cum cellulosam telam delerem, quæ arterias mesenterii ambit.

Hanc telæ cellulosæ vim contractilem & potestatem robur fibræ muscularis in nuperi vul-

*a* *Memoir. II. sur le mouvement du sang* p. 238. & 364. *Exp.* 93. 94. 96. 97. 98. 101. 145. 180. 230. *In canibus Sarcone II. p.* 259.

go adgnoscent *a*\*. Eadem ablata nervus iusto longior fit, quem infinita fila in utilem procul dubio brevitatem contraxerant. Eadem iterum tela membranas inter se revincit, & robur conciliat intestinis, ventriculo, receptaculis omnibus, quæ inutili laxitate omni impetui aeris & liquidorum cederent, nisi musculosam membranam cum nervea, & cum externa tunica fila cellulosa revincirent. Eadem, nisi peritonæum ad diaphragma, ad sternum, mediastinum, ad tendines abdominalis musculi maximi peritonæum retineret, neque viscera abdominis sua in sede manerent, neque pericardio, & adeo cordi, sua staret firmitas, neque herniæ, etiam brevi tempore, ab homine abessent. Auriculam cum capite conjungit eadem, & ubique vinculum est, quo natura ad vicinas partes uniendas usa est. Hinc, resectis cellulosis filis, glandulæ reni impositæ ad alienas, & a rene remotas sedes, versus magnos vasorum truncos migrant *b*. Eadem acinos glandularum & viscerum dum inter se unit, definitæ tenacitatis viscera efficit, solidissima si pauca & macilenta cellulosa tela, mollia si multa, longa, & adipe plena fuerit.

Verum, ut suam corporis humani plerisque partibus soliditatem conciliat, ita vicissim cellulosa tela mobilitatem conservat, quæ cum

---

*a*\* La Caze, Borden, Robert, *b* Qualis in Bartholini im-  
 Fabre. Mihi tribuit Cl. Ma- primis figuris fabrica pingi-  
 ckintrik practice p. 38. tur anat. 4. renov. T. 29.



stabilitate conjuncta sit. Fila enim cum elastica, & extensilia nacta sit, facit, ut connexæ partes cum libertate aliqua super se invicem moveantur, neque coalescant rigidæque fiant. Hinc muscoli, quando deleta cellulosa subcutanea tela cum cute coalescunt, magnam partem sui motus, & tantam amittunt, ut parancyclosi hoc malum sit *c*. Hinc cellulosa tela, cum albis succis in scirrhum indurata, glandulæ, quæ mobiles fuerant, cum cute confervent, & quæ alias in hunc sensum utiliter dici possunt *d*.

Demum figuræ partium & flexiones, unice a cellulosa tela definiuntur. Vesicula seminalis *e*, quæ sibi relicta, & a cellulosis filis soluta, intestinum cum multis cæcis appendicibus est, eadem in brevissimum & confusum, quasi multilocularem, glomerem a cellulosis filis contrahitur. Vesiculæ felleæ cervix suam capiti aviculæ similem flexionem a cellulosa tela habet, eamque amittit, si eam telam removeris. Carotidis arteriæ flexio *g*, quæ sub cranio est, a cellulosa tela nascitur, eaque destructa carotis, & longa fit, & recta protenditur. Hinc in adulto homine magis contorque-

*c* Coriago in qua pellis ossibus fabricæ datam in primis li-  
hæret Columell. L. VI. — *neis* Physiolog. n. 784. & in

*d* Boerhaave Prælect. ad Phil. Transf. n. 494. & in  
Inst. rei med. n. 412. — *progr. de viis seminis.*

*e* Vid. descriptionem hujus *g* Icon. anatom. fascic. VII.  
p. I.

tur splenica arteria *b*, indurescente ea, quæ arteriam in plicas colligit, cellulosa tela. Sed etiam in rene papillas, quæ fetui humano solitariae sunt, aque invicem remotæ, eas dum induratur, sensim conjungit eadem, donec delictis intervallis in unum viscus consentiant, quas easdem papillas aqua in cellulosa spatia effusa in eum, qui in fetu est, statum restituere potest *i*. Eadem adeo temere remota, quasi inutilis foret, veræ partium corporis animalis figuræ ubique corrumpuntur.

Adeo multa cum corpori humano præstet cellulosa tela, non necesse est, eam supra verum laudare, & eam pro nervorum fine expanso habere, aut pro organo musculosi motus, cujus lymp̄ha, in cavernulas effusa, & ab igne rarefacta, eum motum efficiat *k*, aut demum pro sanguinis & receptaculo & motore, & præparante organo. Neque aponeurotici quid & nervosi est in celluloso textu, ut organi cellulosi nomen mereatur, vel ex ejus reciprocatione plerique in corpore humano motus nasci queant, qualem naturam ei Cl. *La Caze*, anatomicarum inspectionum non immerito osor, in nupero libro adscripsit *l*. Non sentire jam *Galenus* vidit, neque ei sensus tribui debet, qui transeuntium nervorum est. Si propter nervos sensilem esse reclamaveris, nihil ages, ni-

*b* Prim. lin. phys. n. 753. 108. &c.

*i* Comper phil. transf. n. 280. *l* Specimen novi medic.

*k* Shebbeare practice of conspectus: Idée de l'homme physique. T. I. p. 80. seqq. 89. physique & moral p. 151. &c.



si quod cellulosæ telæ tribuas id quod fatearis nervi esse l\*. Qui omnia alia a nostris docere malunt, in principio suo parum sentire fatentur, in aponeurosibus magis l\*\*.

A pia vero meninge oriri, aut cum ea continuari non video l\*\*\*, utique cum dura membrana.

### SECTIO III. MEMBRANÆ.

**S**UPEREST, ut ostendamus, longe latius patere cellulosæ telæ imperium, quam vulgo quidem notum fuit. Nova hic proponebam, certe ante editas meas *primas physiologiae lineas* vix cognita, neque postulabam, ut fides mihi adhiberetur, nisi experimentis & ratione vera esse evincerem, quæ præter receptas opiniones scripsissem. Fere omnes nempe corporis humani solidas partes in meram cellulosam telam, strictius congestam, & arctius intricatam esse experiendo cognovi. Certe membranas absque exceptione omnes, vasque, quæ membranæ cavæ sint, deinde viscerum parenchymata, ligamenta, forte & tendines, & cartila-

l\* Borden tissu *nunquam* p. tum dudum an. 1740. monueram

l\*\* La Caze.

l\*\*\* Idem.

in *Prim. lin. phys.* n. XI. Latius patere cellulosum tex-  
tum dudum an. 1740. monueram  
*Comm. in prælect. Boerhaavii* T.  
II. p. 661. neque tamen penitus  
eo tempore eam rem perspe-  
xeram.

gines, & ossium partem magnam cellulofam telam aut esse, aut aliquando fuisse, per experimenta reperio. Nunc hæc vulgo nota sunt & recepta.

Ergo communis membrana muscutorum, & propria, & septa, quæ inter muscutorum lacertos descendunt, mera sunt cellulosa tela, ut aëre impulsio ostenditur, quod experimentum industriæ Cl. viri *Alexandri Monroo Sen.* debemus *n.* Eodem modo arachnoidea membrana cerebri, quæ in medulla spinali pro late patente & solida membrana omnino habetur, ea in basi cerebri, interque hemisphæria, in meras cellulosas bullas resolvitur. Membranæ, quas pro tendineis involucris glandularum non exigui nominis incisores descripserunt, in glandula ad aures posita, & in altera, quæ angulo maxillæ adfidet, manifestissime in cellulosa fila resolvuntur. Cutis, etiam obiter inspecta, solida quidem videtur, qua ad epidermidem respicit, laxatur vero eadem, & in folia laminasque cellulosas abit, qua parte ad adipem pertinet *o.* Arteriæ aortæ involucrum, durum illud & elasticum, quod vulgo tendineum vocant, vel periossteum, durissima membranarum, vel faccus prædurus, qui corpus cavernosum penis coerces, solo cultro, sublati sensim squamis, in meras cellulosas laminas resolvitur, ut nihil omnino alterius materie superfit, &

---

*n* *Essays of a Society at*  
*Edimb. Vol. V. p. 256.*

*o* *Cel. Ludwig de humore*  
*cutem inung. p. 8.*



id omne, quod adeo solidum visum est, in foliola cellulosa discedat.

Post facillima hæc experimenta, quæ negligentia fere anatomico sponte se obtrudunt, alia feci, in quibus aut aërem, aut aquam, in intervalla arctiora ejusmodi cellulosæ telæ impulsi, quæ pro membrana vulgo habetur, eamque in naturam cellulosam resolvi. Ergo albæ illæ & late patentes membranæ *tendineæ*, aut *nerveæ*, ventriculi, intestinorum, & vesicæ urinariæ, quæ solæ firmitatem his receptaculis præstant, flatu impulso, aut per vulnusculum, aut inverso eo receptaculo, & adacto per fistulam aëre, in lanuginem albam ita diffillantur, ut nihil supersit, quod gossypii non sit simile. In intestinis experimentum *III. Bernardus Siegfried Albinus* fecit *p*, in ventriculo & vesica urinaria ego, quæ quidem utraque cellulositas pulcherrime alba spumæque similis, intestinalis alterius elegantiam superat. Idem aër involucrium, quod in pene nervosum *Ruyschius* descripsit, & penis ligamentum, & darton, pro musculo descriptam, in veram cellulosam spongiam dissolvit *q*.

In aliis membranis ad cellulosam naturam ostendendam aqua utilius adhibetur. Ea enim, ut in poros sacchari inque capillares tubulos sensim se insinuat, ita in cavernulas cellulaf-

*p* In C. Bernardi Fratris Academicar. disp. de intest. tenuib. n. 8. *q* Prim. lin. Physiolog. n. 14. & nuper in L. II. adnot. 795. 774.

que membranarum paulatim irrepit, quæcunque habentur pro durissimis, & fibras, & laminas separat, easque membranas in spongiosum tomentum restituit, ex quo primum natæ sunt. Hoc experimentum in aorta arteria primus fecit *Raymundus Vieussens r*, aque eo sibi imponi passus est, ut omnino nullam in arteria musculosam membranam admitteret, cum ipse, longa maceratione, non aliam nisi spongiæ naturam in arteria reperisset. Eodem modo, cum in aqua cogerem contabescere cutem, duram membranam cerebri, pericardium, periosteum undecunque sumtum, peritonæum, scleroticam membranam, semper eundem exitum ejus experimenti inveni, & omnes eæ membranæ in flocculentæ spongiæ indolem dissolutæ sunt, quæ pericula & olim etiam fecit *s*, & inde, ut ex litteris optimi viri cognovi, repetiit *David Christophorus Schobinger*. Eadem aqua glandulas conglobatas, uterum *s\**, corpora cavernosa penis, clitoridis, in cellulositatem similem, laminasque resolvit, in visceribus vero & glandulis evidentissime parenchyma in vasa, & in fila cellulosa separat, quæ, cum vasis non repletis, solebat *Ruyschius* de arteriis viscerum, pulchre specioso sebo infarctis, eadem, quam diximus, maceratione separare *t*. Sed etiam putredo uterum in cellulosam naturam restituit.

*r* Nov. vasorum corp. humi. thol. obs. 938.  
*system.* p. 83. 84. 85. 88. *t* Conf. Boerhaavium in  
*s* Disp. cit. p. 72. 73. prælect. ad inst. rei med. T.  
*s* In rupto utero Opusc. pa- II. p. 373.



Alio etiam modo visum est ostendere, omnino in densas membranas cellulofum textum stipari, cum paulo prius demonstraverim, membranas densissimas in ejusmodi telam laxari posse. Cystici nempe tumores medio in celluloso subcutaneo spatio nascuntur: in ejus cellula una pluribusve oleum incipit stagnare, tenerrima tantum ejus cavernulæ membrana coercitum. Ejusmodi distenta cellula, dum oleum recipit, neque reddit, paulatim vicinas areolas comprimit, & deleto per pressionem ipsam oleo, quod inter laminas cellulofas medium coalitum impedit, efficit, ut ejusmodi laminæ, & perpetuo quidem plures, inter se invicem conserveant; ita pro molliissima spongia crassa, duarum linearum etiam diametri, & solidissima, & denique cartilaginea membrana nascitur v, omnino ut in arboribus cellulosa pariter tela in lignum stipatur x. Hanc degenerationem in thyreoidea glandula frequenter vidi, tum in glandulis conglobatis, oesophagi fodalibus. Eædem duræ perque morbum natæ cystides pariter macerando, aut putredine in priorem cellulofam naturam, originis suæ non immemores, revertuntur.

Omnino adeo videtur, cum pressione sola cellulosa tela in membranas abeat, laxatione vero veræ membranæ in textum spongiosum

v *Prim. lin. physilog. n. tias pollicis crassus est Dou-*  
 ii. *Cyprianus in epist. de fe- glas de hydrocele p. 83. Verum*  
*tu tubario p. 57. Saccus in hæc innumera sunt.*  
 hydrocele sæpe ad duas ter- x *Ludwig l. c.*

mutentur, utriusque organi parem naturam, & hæcenus diversam esse, quod tunc cellulofus textus sit, quando cavernulæ multo vapore, aut aqua, aut gelatina, aut adipe replentur, quæ fluida vicinas laminas separant; in membranas vero abeat eadem, quoties iis liquoribus expulsis fila propiora se adtraxerunt, & stricto nexu laminæ in se mutuo inplexæ coaluerunt.

Nunc, si membranæ ex cellulosa tela fiunt, si ex membranis convolutis vasa nascuntur, si ex vasis & cellulosis eorum vaginis viscera componuntur, si præterea glandularum conglobatarum pulpa unice cellulofus textus est, adparet, quanta pars corporis humani ex ea materie constet, quæ per tot secula pro quædam quasi purgamento habita est.

Neque forte his limitibus natura cellulosa coercetur. Nam tendines, certe aliqui, evidenter in cellulofam membranam duræ membranæ simillimam expanduntur, nomine aponeurosios, & eorum alii in membranam veram solis digitis distracti mutantur, quod experimentum in tendine plantaris musculi ante quinquaginta annos feci. Eo probabilior vero hujus conjecturæ species est, quod tendines, perinde ut cellulosa tela, neque irritabiles sint, neque sensiles. Verum de ea re alibi amplius inquiretur.

Porro cartilagine elastica cellulofitate fieri valde opinabile videtur. Nam cartilagine & adulti hominis inprimis, & pueri etiam magis, in costis potissimum, perinde fere, ut aortæ cellulosa membrana, in squamas paulatim la-



xantur: & vicissim cellulosa tela sola morbofa induratione in veram cartilaginis naturam abit, ut in strumarum membranis, in ovarii, in lienis involucro frequens est, & alibi fusius ostendemus, idoneos interim testes citaturi *y*.

Ossa ex periosteo nasci vir suo merito celeberrimus docuit *z*, nuperumque defensorem nactus est *z*\*. Verum & si in hanc sententiam descendere aliæ me rationes prohibent, tamen evidenter epiphyfes cellulis plenæ sunt, quæ sola duritate a tela, toties laudata, cellulosa differunt. Demum satis nunc constat, ossa fieri duplici parte, tela cellulosa cum vasis sanguineis; & materia calcæria inorganica, in eas cellulas effusa, ut possit cellulosa natura ossi reddi, si acido aliquo liquore calx illa deleta fuerat *a*.

Duo autem, in corpore humano, genera fibrarum sunt, quæ suis dotibus a cellulosi textus filis distant. Nempe fibra muscularis, semper recta, suisque parallela sodalibus, nusquam ramis suis vere in vicinas fibras inserta, demum irritabilis, alterius quidem indolis esse videtur. Deinde medulla cerebri, & quæ inde continuatur nervorum medullaris natura, & simplicitate fabricæ, & continuata absque intervallis longitudine, & rectitudine fibrarum, nunquam in nervis confusarum aut irretitarum,

*y Warner cases in surgery* hic, neque absque laude, p. 164. *Acrell chir. hændels.* nomino.  
p. 107. *z*\* Cl. *Fougeroux.*

*z* Alibi de ea lite agetur. *a* Ill. de la *Sone* in *Comment. Acad. Reg. Scient. Paris.* ann. 1751.

& demum sensibili indole a textu celluloso separatur, etsi nulla ratione suæ opinionis data, eo retulit Cl. *de la Caze* *b*. Medulla enim nervosa, uti monui, neque irritabilis est, neque sensu gaudet.

Hæc nunc, quæ de cellulosa tela scripsi, multis nova videri possunt, certe non ante annum 1747 prodita, quo anno, post multa experimenta mea, in primis physiol. lineis hanc fabricam membranaceam descripsi: non ideo tamen aut undique nova sunt, aut absque auctoritate clarorum virorum dicta. Et primum *Nicolaus Hartsoeker* *c*, ex vasis & cellulosa materie totum corpus animale composuit. Deinde *Guilielmus Comper* omnes membranas manifesto vesiculares esse, & flatu impulso in cellulosam telam mutari docuit *d*, insignis iterum in anatomicæ auctor. Porro *Thomas Morgan*, paradoxus homo, sibi que soli credulus, ipsa vasa ex eo textu constare scripsit *e*. Verum paucorum hominum sparsas voces facile ea sententia oppressit, quam admirabili eloquentia *Boerhaavius* proposuit, & ipse tum demum hæc, quæ nunc cito, Clarorum virorum loca aut legi, aut certe cum animi adtentione legi, quando experimenta mea me dudum in veram viam duxerant. Eam etiam theoriam *Franciscus Thierry* *f*,

*b* Idée de l'homme physique & moral p. 326.

*c* Suite des conjectures physiques p. 93.

*d* Apud Keilium, of animal secretion p. 129.

*e* Mechanical practice of physik p. 338.

*f* In disp. Ergo in celluloso textu frequentius morbi & morborum curationes. Paris. 1749. 4.



nuperusque pseudonymus *g*, & alii *h* post mea scripta Cl. viri receperunt, & nunc fere omnes.

Eam, quam modo indigitavi, theoriam superest ut exponam, cum adeo late a plerisque Europæ medicis recepta sit. Constiterat ex *Ruysschii* experimentis, albas illas, *spermatikas* & exsanguis membranas totas rubescere; quoties diligenter & feliciter trunci arteriosi materie sebacea colorata repleti essent: & parum inde distabat opinio, corpus humanum ex foliis vasis fieri. Eam clarius proposuerunt *Edmundus King*, & *Josephus Duverney i*, ut totum corpus ex vasis fieri docerent & ex vesiculis, in quas vasa paterent. Ex vasis etiam totum corpus humanum composuit *Santorinius k*. Eam sententiam paulum ornavit *Archibaldus Pitcarne*, & ex membranis minimis vasa minima, ex istis membranas alias, ex his denuo majores tubos composuit *l*. Inde hæc omnia excoluit *Boerhaavius*, & in hanc fere formam digessit. Fibra constat ex terra & glutine *m*. Ex unitis inter se fibris fit membrana simplicissima, sive prima. Ea in se ipsam convoluta &

*g* Libri, qui sub titulo anatomies *Archangeli Piccolomini* prodiit.

*h* Inter eos honoris gratia nomino *Sarcone Vajuolo* p. 67. 68. & *Johannem Douglass*, auctorem libri *de hydrocele* Lond. 1755. 8. editi p. 46. Mihi tribuit inventum non blandus homo in T. I. *prælect.* p. 128. Cl. *Marberr.* Huc &

*Loescke physiol.* p. 21. & *Robert pet. ver.* p. 75. & fere Cl. v. *Geuns de vita.*

*i* *Mem. de l'Acad. des Scienc. avant 1699.* p. 281.

*k* *De nutritione* n. 9.

*l* *Boeri epist. ad Pitcarnum* p. 236.

*m* *In aphor. ad cognoscend. & curand. morb.* n. 21. 23. *Prælect. ad inst. rei med.* T. III. p. 644.

ta & coalescens facit vasculum simplicissimum *n*, five primum. Ex vasis primis intertextis & intortis fit membrana secunda. Eadem convoluta, coalescentibus finibus, efficit vas secundum *o*. Ex ejusmodi vasis intertextis tela nascitur, qualis fieret ex vitreis tubulis in pannum textoris manu unitis *p*. Ea est membrana tertia, quæ in se ipsam revoluta vas tertium generat, quod primum nudis oculis se conspicuum offert. Ex ejusmodi vasis membrana quarta nascitur, & ita porro, donec maxima vasa & membranæ crassissimæ emergant. Hæc quidem alibi ita temperavit *Præceptor*, ut totum corpus humanum quidem vasis *q*, fistulisve fieri, arteriosis, venosis, & nerveis doceret, & tamen, si valde exquisitè animum adtenderis, ex solis nervis corpus animale tanquam ex vera ejus materie componeret *r*.

Theoriam istam plerique & celeberrimi nuperæ ætatis medici receperunt, quæ nempe vasa ex membrana, membranam iterum ex vasis componit. Inter eos, de Schola quidem *Præceptoris* sunt *Gerardus van Swieten* archiater Cæsareus *s*, *Johannes de Gorter* archiater Rus-

*n* Aphorism. n. 38.

*o* Gerard. van Swieten ad  
n. 39.

*p* Prælect. ad inst. rei med.  
T. III. p. 336. &c.

*q* Institut. rei medic. n.  
214. & in prælect. ad eas in-

stitutiones T. II. p. 252.  
iterumque n. 440. & alibi.

*r* Institut. rei medic. n. 301.

Nempe ita se habere fere  
credit Ill. *Præceptor*, & fere  
demonstrabile esse Idem n. 440.

*s* In Comment. ad aphor.  
jam cit.



ficus *t*, *Abrahamus Kaauw Boerhaave* v magni viri nepos, & *Johannes Fridericus Schreiber* x uterque ex Academia Petropolitana, & *Cliftonus Wintringham* senior y. Ex aliis scholis *Franciscus Quesnay* archiattrorum comiti suffectus z, *Antonius Fizes* Monspeliensis Doctor a, *J. Godofredus de Berger* b, *J. Gottlob Kruger* c, *Samuel Schaarschmid* d, *G. E. Hamberger* e, *Georgius Cheyne* f, alique, quos numerare necesse non est. Nuper demum, etiam microscopio acerrimo adjutus, *J. B. a Torre* fila cellulosa vasa esse defendit.

Verum ab Ill. Præceptore *Bernardo Siegfride Albino* ante 20 annos propositas rationes legimus g, quæ de firmitate sententiæ *Boerhaaviane* dubitare, etiam reluctantem, cogerent, easque reperio, dudum ab alio Cl. viri discipulo *Johanne Rogaar* publicatas h, quales fere ante plusculos annos non monitus adtuleram i; aliqua etiam in eum sensum docuit *Guilielmus Cheselden* k. In iis nempe membranis, in quibus felicissime vasa

*t* *Compend. Medic. T. I.*  
p. 4. & in figur. 1. 5. 14.  
15. 17. 18. 19. 20. 21.

*v* *De perspirat. Hippocrat.*  
n. 980.

*x* l. c. ab init.

*y* *De podagra* p. 32. &c.

*z* *Essay sur l'æconom. anim.*  
T. III. p. 93.

*a* *Conspect. mechan. secretion.* p. 81.

*b* *De tuend. valetud.* p. 12.  
13.

*c* *Pathologie* p. 128.

*d* *Physiologie* p. 136.

*e* *Physiol. medic.* p. 329.

*f* *De fibra debili* p. 12. &c.

*g* *Adnot. anat. Lib. III.* p.

11. 13. edit. 1756.

*h* *Disp. de nutritione* Leid.

1744. p. 40. 41. 42.

*i* *Comment. ad prælect. Boerhaavii* T. II. p. 253. 660.  
editi anno 1740.

*k* *Anat. of human. bod.* edit.  
6. p. 204.

sanguinea utriusque generis replentur, maxima tamen pars superficiei, inter retia vasculosa *i*, alba manet: eademque in maceratione mucii nomine decedit, fundumque petit. Deinde magnas membranas absque vasis esse posse, manifesta exempla evincunt, in allantoide membrana, in arachnoidea medullæ spinalis, in epidermide: & demum membranæ, verarum simillimæ, casu morbove, nasci possunt, in quibus ne suspicio quidem vasorum locum habet, ut in hydatidibus, laminis ligamentosis pulmonis, aliorumve viscerum. Non ergo universum corpus vasis fieri. Sed etiam medullæ cerebri, & ossium, & cartilaginum valde exigua pars est, quam vasa efficiunt; & demum natura solida animalis in plurimis bestiolis reperitur, ut in polypis aquæ dulcis, quæ animalia microscopiis vehementissime augmentibus tentata, nihil visceri ulli, aut cordi simile ostenderunt.

Non ideo negaverim, telas membranaceas, textas ex fibris, quas ad microscopium descripsit *Georgius Baglivius m*, & *Guilielmus Wierus Muys n*. Verum eas manifesto ad cellulosam telam refero, quæ utique ex filis varios ad angulos intricatis, componitur. Deinde etiam eæ telæ in aliis quidem experimentis partem unice aliquam membranæ effecerunt, ut in eo experimento, quo fabricam membranæ tendi-

---

*l* *Albin.* l. c. p. 5.  
*m* *Oper. omn.* p. 399.

*n* *De fabric. fib. muscul.* p. 283. 484.



neæ indagavit : in aliis ne partem quidem membranæ, ut in crate illo, factæ ex filis non majoribus, quam sunt fila carnea subtilissima, cujus aliæ fibræ longitudinem sequuntur arteriæ, aliæ transversim eas, quas diximus, fecant o. A vasorum natura fila cellulosa longe distant, quæ brevissima sunt, multo latiora vasculis, truncos non habent, neque ramos. *Albinus* porro, ne quis criminetur, me ad consensum magni viri provocare, qui longe a me diffideat, hætenus contraria meorum constanter docuit, ut cuique parti corporis humani proprium esse sui generis stamen defenderet. Mihi vero, præter fibram musculosam & medullarem, nihil occurrit, fatis notis dotibus a cellulosa tela diversum.

#### SECTIO IV. ADEPS.

**F**ILA diximus laminasque cellulosæ telæ. Addidimus inter eas fibras spatiola intercipi, minima alibi, laxa aliis locis. In iis nunc spatiolis liquor aliquis effusus habitat, qui solus intercedit, quo minus laminæ cellulosæ telæ conserveant, & in morbosam duritiem abeant, nunquam defuturam, quoties expulso harum cellularum liquore fila solida se contingunt,

adtrahuntque. Nunquam autem potui in his cellulis discrimen videre, nisi volueris laxiorem telam magisque vicinam cuti adiposam vocare, & cellulosa nomen ei servare, quæ filis fere absque laminis fiat, eademque tota mucilenta sit. Nam & certus sum, adiposa laxa spatia cum tenerrimis filorum intervallis communicare, ut aer de pectoris vulnere exeuns inter oculi tunicas sibi viam aperiat, & gelatinam perinde in adiposis magnis cellulis vidi, natium exemplo, ut in tenerioribus spatiolis. Non unius autem generis hic liquor est.

Tenera primum, fibrosa magis, & cellulosa tela est, quæ minores inter musculos, quæ choriodeam inter & scleroticam oculi, quæ retinam inter & choriodeam, & inter duas laminas iridis, aut in circulo striato *Petiti*: quæ exterior circa veram piam matrem circumponitur: quæ minimorum vasculorum lacertos ambit & distinguit, aut ea, quæ transversum abdominis musculum cum peritonæo conjungit: quæ demum in minimarum arteriarum areolis, in cellulosis telis ventriculi, intestinorum, penis, scrotique & vesicæ urinariæ & biliaræ, inque exteriori ambitu auditorii meatus reperitur, subque pulpa glandis penis, quæ eadem pulmonis parenchyma efficit, aut cellulosas hepatis, lienis, & glandularum pulpas. Eam Cl. vir *Carolus Augustus a Bergen* p magis pro-

---

p In programme, quod excitavi.



prio nomine cellulofam vocat, & ab adipofa distinguit, quem nuper & aliqui Angli fequuntur.

Non alia in fetu teneriori reperitur, cui ne in omento quidem, neque fub cute adeps ullus eft in cellulofis fpatiolis. Quadrimestri certe fetui omentum totum pellucet, & mufculos inter cutemque tremula gelatina interponitur, quæ eadem varias ob caufas in aliquam fedem magis collecta, monftrofas fpecies fetuum gignit *q*. Recte adeo raram fub cute fetus pinguedinem reperit *Isbrandus* van *Diemberoeck* *r*, & cellulofum laminatum textum abfque adipe in fetu *Ruyfchius* descripfit *s*.

In iis minoribus cellulis habitat aquula, tenera, evaporabilis, oleo aliquo mifta, quam in morbis auctam, & chemicæ nunc analyfi fubjectam, rectius cognofcimus. Is eft vapor *Hippocratis*, quem fpiritum vocavit, qui caveas fanas repleat *t*, in libro equidem, quem non pro legitimo receperim, pro antiquo tamen haberi video nemine contra fentiente. Idem halitus per experimenta *Kaauwii* rectius *v* innotuit. Vifcidulus digitis tangentis anatomici hæret, & collectus in rubentem gelatinam abit *x*. In offibus fetus fimilis vifcidula lym-

*q* In descriptione fetus bi- p. 13.

capitis inter opuscula ana- *t* De arte n. 17.

tomica mea edita p. 205.

*v* De perspirat. Hippocr.

*r* Anatom. p. 13.

*x* Gelatina in cellulis favi

*s* Thesaur. Anat. III. n. 64. *Muf. Petropolit. T. I. glas* de hydrocele p. 5.

pha pro medulla est: quod dudum *Aristoteles* *y*, & nuper *Stablius* monuit *z*.

Verum in ipso etiam fetu maturiori, inque omento, potissimum secundum vasorum seriem, & in reliquo demum tenelli animalis corpore, globuli albi, adipe friabili pleni, ex ordine apparent. Ii pariter minores, uti vasa teneriora sunt, primo ævo distant, deinde confertiores se adtingunt *a*. Ampullas olei solitarias in omento fetus observavit Cl. olim amicus noster *J. Fridericus Hulsebusch* *b*. Pinguedinem in fetu acinis meris componi docent *Acta Balthica* *c*. Hæc etiam est pinguedo granulosa in dorso fetus, dicta *J. M. Hofmanno* *d*. Sic infectis pinguedo rotundis fere globulis fit. Nunquam tamen perinde obesi sunt fetus, quam adulti quidem homines, ut etiam in corde parcior adeps sit *e*, & macilentior omnino fetuum adeps duriorque mihi visus est, perinde ut *Riolano* *f*.

Quando vero homo in lucem editus est, tunc primis annis ætatis suæ infans valde obesus fit, subque ejus cute adeps multo, quam puberibus, pro ratione musculosæ carnis copiosior, albissimus, mollibus & subrotundis factus glebulis suffunditur. Altera obesitatis ætas

*y* *Histor. animal.* lib. 3. c.

*zo. part. anim.* lib. 2. c. 6.

*z* *Theor. medic.* p. 376.

*a* *Kaaw de perspir.* n.

792. 794. 795. 796. hic totus legi debet.

*b* *De cellulosa* Leid. 1728. 4.

*c* *Ann.* 1699. p. 18.

*d* *Diff. de pinguedine* n. 8.

*e* Cl *Hunauld hist. de l'A-*

*cad. des scienc.* 1732.

*f* *Anthropogr.* p. 410.



est annus quadragesimus, & qui proximi succedunt, quo tempore quadratam pro gracili formam collectus adeps reddit, atque ea ubertate ad senium usque durat, in quo stadio denuo diminutus tandem pene undique evanescit, & iterum rubicundæ gelatinæ loco cedit, cujus sedem in fetu occupaverat.

Perpetuo tamen abest adeps a plusculis corporis humani partibus. Cerebrum, & cerebellum absque conspicuo adipe sunt, nisi forte glandulas calvæ subjectas ad eum referas, quæ *Ruyschii* conjectura fuit *g*; alterius autem utique & durioris generis eadem mihi visæ sunt. Neque enim hic de adipe mihi sermo est, qui plurimus ad ignem de cerebro stillat: & quod oleum in piscibus duram inter cerebri membranam & cerebrum plurimum reperitur, id a cerebri humani natura in universum longe diversum est. Parca porro pinguedo superest ad nonnullas plicas cutaneas, in quibus duo inter tubera vallecula se interponit, uti in femoris cum natibus conjuncti limite *h*. Parcus est adeps inter musculos nonnullos latos & perpetuo motu agitados, ut rectum inter & cruralem, gastrocnemium & solearem, aliosque ejusmodi. Parcus est in facie exteriori capillatæ cutis, in colli parte, quam sublinat platysma myodes, in fronte, a qua abesse varii auctores scripserunt, a *Spigelio* refutati *i* &

---

*g* *Theſaur. anat.* V. n. 1.     *i* *Anat.* p. 287. tum *Rol-*  
*h* *Jac. Ben. Winslow traité fink diff. anat.* p. 502.  
*des tégumens* n. 82.

a *Ruyfchio k*, inque palpebra, scrotique parte exteriori, interius uberior. Videtur abesse, ubicunque periculum maximum compressio facit, ut a pulmone & a cerebro, aut sensus acuti necessitas adest, ut in glande penis, clitoridis: parvus autem reperiri, ubi vasa exigua, pauci muscoli, frictio perpetua est. Contra, cum grandibus musculis copiosissimus reperitur, & abundat circa musculorum abdominis partem anteriorem, tum circa interiorem femoris, eademque superiorem regionem, & ante pectus. Glutæis musculis, sed solius hominis, ejus copia maxima subjicitur, neque alia nota simiæ facilius ab homine dignoscuntur, quam natium gracilitate. Magnæ ea in sede & rotundæ glebæ meri adipis in areas fibrarum rararum & distantium effunduntur.

Plurimus albus, & mollis, latisque glebis subrotundis factus adeps, circumponitur glandulæ mammæ muliebris, & amabilem illam hemisphæricam figuram efficit. Sub planta pedis, subque manuum vola mollis, abunde subjicitur, eum vero firmæ cellulosæ fibræ ita interstinguunt, ut sua in sede quæque gleba retineatur *l*.

Inter poplitis musculosos funiculos magnæ adipis glebæ, propria membranula continentur, & alibi similes *bursæ* passim tendinibus subji-

*k* In capite & sincipite  
*Mus. Petropolit. T. I. p. 10.*  
inque sincipite & fronte  
*Thef. II. an. II. n. 4.*

*l* Hæc sunt fibrosa stamina  
per pinguedinem ducta *An-*  
*tonii* de *Marchettis* apud  
*Hofmann* de *pingued.* n. 10.



ciuntur, quarum censum Ill. *Albinus* dedit *m*, & quales cavitatem replent, quæ malam inter & buccinatorem musculum plurima pinguedine farcitur. Magnæ & mollissimæ glebæ orbitæ id omne replent, quod musculi bulbusque oculi inane relinquunt, neque eæ ullo in animale desiderantur *n*. Et ejusmodi crassæ glebæ in obesis diaphragmati incumbunt, & pericardio, & intervallo duorum saccorum pleuræ continentur.

Uberrimus adeps & anterior, & posterior, isque potius copiosior, renibus, eorumque inferiori limiti adjectus est, quo ea viscera pfoæ musculo & quadrato lumborum insident *o*. Is iterum adeps magnis etiam glebis continetur, rotundis aut obtuse quadratis, quas laminæ quasi cellulosæ continent, in homine quidem, & quadrupedibus animalibus *p*. Durior is adeps esse solet, & fecilis, & sebi potissimum nomine notus est.

Denique in ossium longorum medio tubulo magnæ longæque glebæ pinguitudinis reconduntur, quas tenerrima membrana & extus terminat, & suis laminulis interior dividit, mollior, quam quæ flatum ferat *q*. Recte hæc descripsit *Josephus Duverney*, membranam

*m* Hist. musc. corp. hum.

p. 319. 694.

*n* Plinius hist. natur. lib.

XI. p. 631.

*o* Kaawo de perspir. n. 569.

570.

*p* Laminatus adeps latis foliis disponitur circa renes

marfupialis *Tyson* p. 35.

*q* Grutzmacher de medullæ

ossium n. 11.

nempe medullæ communem , & vesiculas tenues, quæ in se mutuo pateant, oleoque plenæ sint *r*. Glebam illam magnam in fervida abire in farcimen, sua membrana definitum, *Kaauwius* vidit *s*.

Sequitur, ut quid adeps sit, conemur exponere. In corpore hominis, & quadrupedum carnivororum, adeps, sive pinguedo, mollis est, & certe dum vivit animal, omnino ad fluidas corporis animati partes pertinet. Ita sæpe vidi in vivis canibus, pellucidum, fluidumque adipem in omento, corde, ovariis aliisque calidorum animalium membris, & gaudeo mecum consentire Cl. olim virum *Sanctorium Sanctorium t*, quem *Thomas Morgan v* secutus est. Eo etiam sensu intelligo *Franciscum Quesnay*, quando textum cellulofum vix ad solida pertinere scripsit *x*. In piscibus cetaceis adeps manifesto fluidus est, & fluidum sperma ceti, quo nomine per errorem vocatur, cellulas cranii cum toto corpore communicantes replet *y*. Adeps phocæ majoris, quem leonem marinum vocat Nobilissimus *Anson z*, in moto animale instar undarum fluctuat & agitur. Fluidum in phocæna oleum evidentius descripsit *Eduardus Tyson a*, & fluidum sper-

*r* *Memoir. de l'Acad. des Scienc.* 1700. p. 202.

*s* l. c. n. 929.

*t* In l. *Fen. Avicennæ* p. 325.

*v* *Mechanical practice of physik* p. 284.

*x* *Œcon. anim.* T. III. p. 91.

*y* *Anderson Nachrichten von Island* p. 212.

*z* *Voyage round the World*

p. 124.

*a* *Phocæna* p. 17.



ma ceti in ceto dentato amplissimus *Anderson b.* Non ergo mirum est, ex ceti spermate, cum terebinthinæ oleo, coagulum glaciale nasci, quod in modico manus vivæ calore solvitur, in aëris vero atmosphærici temperie consistit *c.* eodem omnino modo, uti adeps caninus ab aëris frigore cogitur, quam primum animal vitam amisit. In avibus aquaticis, & in struthio camelo, fluidus adeps est, ut huc illuc concutiendo agi & omnis per unum cutis vulnus educi possit. In urso, certe boreali, pene fluidus est. Fulica fluidum oleum in faciem hostium exspuit. Mollissimus tamen etiam homini, circa medullam spinalem est; & cruentus fluidusque in ossium epiphysibus *d.*

Contra in animalibus gramine solo viventibus durior adeps est, & in ipso jam equo hoc discrimen incipit *e.* cui tamen mollior quam aliis herbivoris adeps est. Evidentius vero in cornigeris ruminantibus sebum fragile inesse, vir in eo studio eximius *Aristoteles f.* docuit, & medullam, quæ multifidis adiposa sit, cornigeris animalibus sebaceam esse *g.* cui similia de adipe adnotata *Plinius* reliquit *h.* atque *Suidas i.*; ut minime credibile sit, in Scotia boves dari,

*b* l. c.  
*c* *Physical. Belustigungen* p. 341.  
*d* *Stabl Theor. med.* p. 376.  
*e* *Bourgelat hippiatricque* T. II. p. 153.  
*f* *De partib. anim.* lib. II.

*c.* 5. *Histor. anim.* lib. III. e. 17.  
*g* *De part. animal.* lib. II. c. 6.  
*h* L. XI. pag. 621. L. XXVIII. n. 38.  
*i* *Lexic. ex edit. Kusteri* T. I. p. 155.

quorum adeps non consistat, etsi ita *Cardanus* *k* reliquit. Ovibus totus adeps sebaceus est. Verum etiam humanus adeps multis modis induratur. Vidi absque vitio, quod certe innotuerit, sebaceas lentiformes particulas durissimas, & pene calculi similes, nisi ad ignem liquari se passæ essent, sub cute partis internæ tibie humanæ dispergi. Adeps camelorum in durissima sebacea tubera cogitur. In hernioso adeps sebi similis in *Philosophicis Transactionibus* describitur *l*, idque vitium in omento elapso frequens est, ut omentum cum periculo intestina comprimat. In steatomate adeps humanus in maximam duritatem sensim cogitur. Femur militis in cartilagineum pene adipem degenerans nuper descripsit *J. Wildrick* *l*\*. In ossibus humanis, quæ sepulchris conduntur, medulla humana in sebi speciem abit, *Ruyfchio* auctore, durissimo ad omnia tentanda homine *m*, cum quo similia experimenta fecit *Joachimus Beccher*, in sepulchro Holmiensi *n*. Pinguedinem subterraneam sebi similem excitat *F. Ernestus Bruckmann* *o*. Ut omnino aquæ copia maxime a sebo adeps differat, qua ipse superat, & qua lente diffusa in sebi similitudinem transit. Insectorum adeps granosus est *o*\*.

*k* De rerum varietate lib. III. n. 4. *Advers. anat.* III. VII. c. 31.

*l* n. 326.

*l*\* *Hedend. letter. oeff.* IV. n. 2.

*m* *Thesaur. anat.* II. obs.

n. 9.

*n* *Physic. subterr.* p. 196.

*o* *Epist. itinerar.* p. 57.

*o*\* *Cara Geogr. Mem. pour servir à l'hist. des insect.* II. p. 2. p. 713.



Eam vero naturam adipi esse, recenti certe, ut mollis tactui cedat, cum minimo elatere: corporibus super se invicem motis interpositus frictionem minuat; fortiter autem satis eadem cogat cohærere: corporibus non aqueis unctuosus adhærescat; in aqua solvi renuat, nisi multo tritu ignisve vi in igne colliquefcat, id quidem notum est, minus vero forte notum, adeo modico igne phocarum adipem liquefceret, ut manus etiam tunc, quando ebullire videtur *p*, non amburat, novo argumento a nostro adipe vehementer piscium adipem differre, cum noster adeps in aëre calidissimo nondum fluat, etsi is nonagesimo gradu *Fahrenheiti* fervet. Majori calore bovis adeps eget ut fluat, minori equi adeps, iterum minori felis, ut animalis carnivori. Humanus tamen æstate, sed accedente vi putredinis, intra unum diem, cum tædio incisoris, adeps liquefit, & olei modo fluit, & in morbis malignis perinde olei in modum manat. In globulos sponte se contrahit, dum fluiditatem amittit *q*.

Sponte pene insipidus, ingratum rancorem ab ætate & aëris tactu contrahit, acris tunc & cuprum corrosurus. Nupera aliqua per experimenta Neapoli facta valde volatilis, totus visus est de vitris diffari, ut etiam per poros transiisse videretur. Ab aëris alioquin vi omnia corpora satis potenter defendit, frigoris tri-

*p* Tengström de arte adip. *q* Cont. arcan. natur. p. phocar. coquend. 223. ep. 128.

stiffimos effectus in ultimo septentrione avertit *r*, & a putredine, aut exhalatione, aut fermentatione carnes, succos fermentaturos, aliaque corpora tuetur *s*. Levior quam aqua est, & ipsi homines obesi aliis leviores sunt, minusque sub aquis merguntur *t*.

Chemica analysis ostendit, in adipe hominis & animalium hominis similibus, & denique in sebo ruminantium bestiarum, aquam esse, paucam equidem; deinde oleum inflammabile, maxima id copia; tunc liquorem austerum, empyreumaticum, acidæ per sua signa indolis, ut omnino multa vestigia chylosæ & lacteæ naturæ adeps conservet, cumque butyro conveniat *v*. Et in medulla quidem per experimenta sua Cl. *Grutzmacher* tantam olei rationem reperit, ut quatuordecim omnino sedecimas totius ponderis æquaret *x*, inque J. *Conradi Barchusen* acroamatibus ex uncia una medullæ, omnino drachmæ septem granaque 23. olei fuerint, quæ satis similis est ratio *y*. Apud Cl. *David Henr. Knapé* minor olei &

*r* Svenska Acad. handlingar. 1741. p. 279.

*s* Aves butyro conditæ ex ducatu Megalopolitano ad remotas regiones mittuntur. Habet etiam *Boerhaavius* in prælect. ad inst. rei med. T. I. p. 131. & prior *Robertus Boyle* exper. phys. mach. de aëre nov. p. 209. & cont.

exp. phys. mechan. de natur. aër.

*t* *Schwenke* hæmat. p. 127.

*v* *Cæcil. Folius* della generazione della pinguedine toto libro rationes pro hac sententia adtulit.

*x* De medulla ossium. Lips. 1748.

*y* Post acroamata experim. 17.



major aquæ fuit portio *z*. Adeps, axungia enim adeps est, apud Cl. *Barchusen* septem octavas partes habuit olei *a*. In amici vero nostri, olimque auditoris, Cl. *Joach. Jacobi Rhades* 128 experimentis inter humani adipis partes omnino 113 partes olei fuerunt *b*. Sebum, ut durius, & minus aquosum, omnino quindecim sedecimas olei dedit ei, quem citavimus, ultrajectino professori *c*.

Acidi minus vulgaris est notitia, cum nuper adhuc Cl. *Pinelli d* omnino ex pingui animali acidum stillare negaverit, ut nullum in pinguitudine sale admitteret, præter alcali volatile. Quis primus hoc acidum detexerit, nondum definiverim. Certe vir Cl. *J. Fridericus Cartheuser e* ex sebo animali destillato acidum liquorem obtineri monuit, eumque fusius descripsit Cl. *Grutzmacher f*, etsi copiam non magnam invenit *g*. Accuratius noster Cl. *Rhades*, me suadente & hortante, adipem humanum in theatro nostro acceptum destillavit: ut vocant: ascendit *h* liquor limpidus, tunc oleum ceraceum

*z* In egregia disputatione de acido pinguedinis animalis Gotting. 1754. p. 15. Quatuor nempe uncias aquosi liquoris ex felibra medullæ accepit.

*a* Exp. 18.

*b* De ferro sanguinis humani aliisque liquidis animalium Gotting. 1743. p. 43

*c* Exp. 17 l. c.

*d* De podagra p. 228.

*e* De princip. specif. p. 41. 42. collat. cum. fundament. mat. med. T. II. p. 518.

*f* l. c. n. 14. &c.

*g* Grana 15. ex duabus uncis pinguedinis: duplo tamen plus, quam ex medulla n. 14. 15.

*h* Rhades l. c. p. 38. n. 63.

tyrannus intelligebat. *Jonathan* ille *Swiftius* (neque enim difficile est intellectu, de quonam viro sermo sit) quam diu se curis & iris exercuit, macilentissimus, in summam obesitatem transiit, cum debilitata vi mentis in fatuitatem delapsus esset *f*.

Ergo etiam venæ sectio frequens ad obesitatem facit, quæ cordi stimulum subtrahat, & totam machinam debilitet *g*. Eo artificio vitulos certe in Anglia saginant *h*. Alii venæ sectioni purgationem addunt *h\**. Iterum, pari ratione, castrata animalia pinguescunt, non quod moleculæ nutritiæ nunc cessent egeri *i*, sed quod universum eunuchorum corpus minus robustum, minusque acri sanguinis motu agitatū sit, quod ex brutis animalibus castratis evidentissime adparet, si mitem bovem, placidumve cantherium, cum feroci tauro, & igneo caballo comparaveris. Denique etiam in eodem animale in ea parte corporis adeps colligitur, a qua tritum & agitationem averteris. Lienis sublatis locum in cane adeps replevit *k*, & testis exempti in hominibus, quibus virilitas ademta est *l*.

Omnino huc pertinet, quod alibi rectius

*f* Baker de affect. anim. p. 20.

*g* Bagliv. de fibr. motr. L. I. p. 338.

*h* Lister journey to Paris p. 157. de humorib. p. 450. edit. Belg. Laurence in opere rustico alique.

*h\** Sloane voy to Jam. pref. p. LXXXIV.

*i* Quæ Cl. de Buffon conjectura est *histoire naturelle* T. IV. p. 444.

*k* Borrich hermet. medicin. sapient. p. 429.

*l* Hulsebusch l. c. n. 27.



dicetur, alimentum farinosum, & lacinprimis, plurimum ad obesitatem facere, cum ejus materiem plurimam in sanguinem congerat. Potentius etiam adeps obesitatem adjuvat *l*\*.

Uti ex arteriis in cellulofum textum via patet, ita a venis. Siquidem enim ex arteriis pinguedo deponitur, ita eam in venas refumi necesse est, nisi velis in immensum animalium obesitatem increfcere. Has autem vias perinde anatome, ut priores illas, demonstrat. Pariter enim in venas injectus liquor exsudat, & spongiosas cavernulas replet, ut sæpe mihi, cum aqua, ichthyocollo, aëre, experimentum cecidit, etiam invito, & cum mea interesset, ut liquor impulsus in venis maneret. Hic idem eventus fraudi fuit *J. Henrico Schulze*, ut ex venis adipis secretionem fieri adfirmaret *m*, postquam viderat, aquam venis brachii impulsam in cellulas adiposas exhalare. Ita *Stephanus Hales* aqua in venas canis injecta vidit cellulofos loculos & salivales glandulas intumuisse *n*. Sic in medullæ adiposas cellulas aqua venis injecta nonnunquam exit *o*. Verum totum illud pulcherrimum *Abrahami Kacuwii* opus similibus eventibus plenum est *p*. Opium etiam in aqua dissolutum, & sub cutem im-

*l*\* *Hemson inquiry*, p. 127. tum exstare in Cl. viri disp.  
*m* In disp. de ven. sect. in de sudore p. 9.  
*hydroticis*, citata a Cl. *Schaar-* *n* l. c. p. 117.  
*schmid* in *Berlinischen Nach-* *o* *Jos. de la Charriere anat.*  
*richten* T. IV. p. 400. & de la tête, pag. 62.  
nunc video idem experimen- *p* l. c. n. 800. &c.

pulsum, soporem excitavit, quem solet per os adsumtum, ut vim stuporiferam in venas reforberi necesse sit *p*<sup>\*</sup>. Adeo vehemens hujus medicamenti actio in venis fuit, ut eam superaret, quam deglutitum exercet, & bestiolam occideret.

Aer ipse sub cutem inflatus, aut in experimento, aut per vulnus, post aliquos dies refovetur & evanescit.

Non nimis urgeo tentamen evidentissimum *Malpighii*, qui in vivis animalibus oleum in venas ipsumque hepar repulit *q*. Exstant autem, & abunde quidem, testimonia physiologica, ex corporis humani observata functione nata, quæ hunc regressum adipis non sinunt obscurum esse. Et musculorum primo motus vehementior in omni animale, uti obesitatem arcet, ita non finit manere. Tumentes nempe in agendo musculi, cellulosam telam intervallo suorum quassant, & adipem, aliunde fluidum, per patula oscula in venas repellunt, quæ celeri in ejusmodi circuli sanguinei statu motu sanguinem ad cor revehunt, atque adeo refovetioni adipis favent. Celerrima vero est adipis resumtio. *Alaudæ* obesitatem, quam citavimus, nocturnam proximo die amittunt, multoque fiunt deteriores *r*. *Piger* ille *Bradypus* [*Sloth*], dum ab arbore ad arborem repit, ex tantillo labore, postquam pinguis de arbore

*p*<sup>\*</sup> *Monro Ess. phys. and litter. III. p. 310.*

*q* *De omento p. 42.*  
*r* *Stahl l. c. p. 374.*



descendit, in sceleti formam contabescit *s.* Bobus in Brasilia ex remotis provinciis Fernambucum actis, aut in Sinum omnium Sanctorum, carnes emaciantur *t.*, & ipsa medulla in bobus ovibusque ex provinciis Parisios actis nulla est, quando primum advenerunt: nam renascitur eadem, & satis brevi tempore, ex Cl. *Rouhault v.*, *Ludovici Lemery x.* & Ill. *Senaci y.* testimonio. In Islandia febum ovibus iter facientibus disparere adeo vulgo notum est, ut de decem febi libris quotidie felibram decedere lege statuatur *y\**.

Universi fucci armentorum pariter per æstum factum exhauriuntur *y\*\*.* A venere pecudes mares medullam in ossibus amittunt *z.* Solo motu corporis obesitatem superare *Cælius Aurelianus* suadet *a.* Velocibus animalibus etiam circa renes inanis cellulosa tela est *b.* Frictione multa, prominens aqualiculus, & incommoda obesitas dispulsa legitur *c.*

Verum inprimis animalia huic vitio obnoxia sunt, ut eorum aliquæ potissimum familiæ

*s* Dampier Voyage round the World T. II. p. 61.

*t* Zucchelli rilaz. delle missioni P. V. p. 64.

*v* De ovibus totis 25 annis sibi compertum. Apud *Vauguyon* oper. de chir. p. 683.

*x* De la nourriture des os p. 12.

*y* Præfat. ad Bertini osteologiam p. 60.

*y\** Olaffen I. p. 189.

*y\*\** Lisle agricult. II. p. 10.

*z* Hippo Metapontinus apud Censorinum de die natali C. V. p. 25.

*a* Chronicor. L. V. c. 11.

*b* Kaauw l. c. n. 569. 570.

*c* Zucut. Lusitan. prax. admirab. L. III. obs. 112. Multa alia in eum sensum reperiuntur apud *Wierum* *Guilielmum Muys* & *Franciscum Quesnay* de la saignée p. 5.

continuo a labore macilefcant, quales *Wafh-horfes* Angli vocant *d*, & qui iidem adipem fuum celerrime reparant *e*. In iis animalibus inprimis adparuit, quomodo adeps ifte evanefcat. Liquefactus nempe exhalat undique, & in ipfa intestina, ut fæces tamquam pelle vef-tiat *f*. Sed accuratius in primis has adipis vias obfervavit *Gibfonus*, nuperus hippiatrices auctor. Is adeo *moltengreafe*, morbum equinum, ita describit, ut ma-xima febris fit, a vehementi equitatione nata, in qua omnis obefitas celerrime evanef-cit, fæcesque alvi pingues funt, & in fanguine glutinofiffimus adeps reperitur *h*, quod ma-nifeltiffimum adipis in fanguinem, a mufcu-lofa vi repulfi, documentum eft. Nuper hæc a non nemine *h\** rejici non ignoro, videntur ta-men certa habere testimonia. Sed in abdomen etiam adipem effundi *Ruyfchius*, idoneus testis eft, quando equi vehementi curfu defatigati fue-rant *h\*\**.

Alias etiam caufas refluentis ad fanguinem pinguedinis omnino non oportet diffimulaffe. Et ipfe quidem mufculorum motus non unice quaffando adipofas telas animalia obefat inanit:

*d* King philof. tranfact. n. 18. *h* Diseases of the horfes p. 326. 327. & denuo p. 57.  
*e* Guilielmus Croone de matu Adipi fimilem materiem effe.  
 mufc. p. 26. *Gueriniere Ecole de Caval.*  
*f* Fischer liefländifches Land- II. p. 150.  
 buch p. 126. *h\** Garfault p. 205.  
*h\*\** Ep. ad Boerb. de fabr. gland.



cum medulla ipsa ex ossibus evanescat, ad quam nulla ejusmodi concussio pertingit. Eodem ergo modo, quo quidem in febribus, ita etiam in nimio corporis motu, videtur aucta transpiratio, & sudor, & aliæ jacturæ massam sanguinis minuere, ut in venas fluidus adeps tamquam in laxiorem, minusque resistantem sedem succedat, ea iterum ratione, qua aquæ hydropicæ post vehementes purgationes in sanguinem rapiuntur. In febribus etiam aliquis incisarum venarum effectus ad eam inanitionem admitti debet. Nam febres, uti notissimum est, miris modis emaciant, idque omne, quod ob ejusmodi causas ponderi corporis decedit, id utique adeps est *i*. Boves a lue epidemica, quæ maligna peripneumonia putridi ingenii est *i*\*, & oves ab hepatis corruptela misere emaciantur, ut ne medulla quidem in ossibus supersit. A dysenteria subito adeps disparuit *i*\*\*, & in diarrhoea pingui boum, quæ in Gebennis sæviit. A copia puris, a longa gonorrhoea, enormem macilentiam *Facundinus Angelinus* vidit *i*\*\*\*. In febre homo triginta libris levior factus est *k*, & quinquaginta libris per mercurialem salivationem *l*, &

*i* *Morgan* in cit. opere. *des bestiaux* p. 112.  
*Præceptor* passim, & olim *i*\*\* *Degner* p. 18.  
*Bernardus Connor* evangel. medic. p. 147. Ne minimus quidem musculus in tabido consumptus, & ne fibra, *Petermann* de nutrit. *i*\*\*\* *Venæ* sect. p. 28.  
*k* *F. Ruyssch. de fabric. gland.* p. 60. Conf. *Sanctorius med. stat.* I. aphor. 81.  
*l* *Baerhaave* de lue venerea p. 162.  
*i*\* *Sauvage* sur la malad. p. 162.

octoginta libris ex variolis *m*. Varioloso homini, inciso, nullus in corpore toto adeps reliquus fuit *n*, neque elephanto, quem Cl. *Blair* incidit, ne circa anum quidem renesse aut in ossibus *o*. Colica pictonum carnem omnem consumsit *o*\*, ut solæ membranæ superessent. Atheroma, neque id minimæ molis, a febre dissolutum fuit *p*, & steatoma *q*. Solvitur autem, fere ut in equis illis, adeps, & adparet in nigris urinis *r* picisque aliquando similibus, quales in pessima illa colliquativa febre insularum Antillarum infelix olim *Williams* descripsit: neque defunt homines, quibus solutus adeps per umbilicum exiit *t*, aut demum in cavum abdomen effusus est, ut in eo intestina natarent *v*, perinde ut equis, sed & vomitu idem rejectus est *v*\*.

Sed etiam aliæ vehementes humorum naturalium diminutiones obesitatem exhauriunt, & imprimis aquæ cum guajaco coctæ usus, etsi post id remedium celeriter prior pinguitudo corporis reparatur, sive decocto illo ægri vehementissime emaciati fuerint *x*, sive usu hy-

- |  |  |
|--|--|
| <p><i>m</i> <i>Lister de variol.</i><br/> <i>n</i> <i>F. Hofmann med. consult.</i><br/> <i>T. II. dec. 5. c. 3. Verdries de pingued. p. 26.</i><br/> <i>o</i> <i>Phil. Transf. n. 326.</i><br/> <i>o</i>* <i>Haen colic. pict. p. 110.</i><br/> <i>p</i> <i>Verdus traité des opérat. de chirurg. p. 139.</i><br/> <i>q</i> <i>Append. obs. post. Scultetum n. 46.</i></p> | <p><i>r</i> In hætica febre ex medulla corrupta <i>Monro of the bones p. 21.</i><br/> <i>s</i> <i>On the bilious fever p. 12.</i><br/> <i>t</i> <i>Ad sex libras act. Mar. Balth. 1701. p. 24.</i><br/> <i>v</i> <i>Bagliv. de fibr. motric. spec. I. p. 313.</i><br/> <i>v</i>* <i>Gesner Saml. I. p. 177.</i><br/> <i>x</i> <i>Verulam histor. vit. &amp; mort. p. 364. 365.</i></p> |
|--|--|



drargyri *y*, & saponis, a quo 28. libris hominem lego leviores factum.

Verum absque morbo, absque vehementiori sanguinis circulatione, in corpore sanissimo, tamen in sanguinem adeps redit & consumitur. Nam unice alimentis parvissimum adipem generantibus, & acribus, obesitas nimia superata est. Juvenem nimis obesum theriaca, sale theriaco, cursu & frictione *Galenus* sanavit *z*. Tabaci manducatione assidua obesitas consumpta est *a*. Acetum plerique hoc scopo laudant *b*, nescio an vere, & prudenter. Certe ex acidi, & ni fallor, vitriolici spiritus, usu ventriculum in scirrhosam molem intumuisse vidi, & pulmonem inde tuberculosum factum alii *c*. Napi semine dato passeris canarienses nimium obesi eo pondere liberantur *d*.

Denique sola inedia adipem consumit, & tunc unice materies deest, quæ pro eo novum repararet, quem sanguis assiduo reforbet. Serpentes fame diuturna macilescunt *e*. Adipis massulæ in chamæleonte, lacerto, rana, au-

*y* *Schlichting* *siphilid. mnesyn crit.* p. 545. Obesitas superata saliva per hydrargyrum mota *Forestus* obs. L. XXXI. obs. 10. *Pauli de nutrit.* p. 46.

*z* *Method. medend.* L. XIV.

*a* *P. Borellus*, non quidem optimæ notæ scriptor, *Cent. 2. obs. 2.*

*b* *Riolanus* in *enchirid. anat. pathol.* p. 477. etiam exem-

plis citatis. *Baynard de psychrolusia* p. 485. *Spon aphor. nov.* p. 216. *J. W. Pauli de nutritione* p. 44. 45. 46. *Act. Hasniens.* ann. I. obs. 47.

*c* *De Sault.*

*d* *Hervieux des Serins de Canarie* pag. 237.

*e* *Bertram* *dis. de pinguedin.* p. 31.

tumno plenæ reperiuntur, vere inanes sunt *f*. Mures montani, quando autumnno quieti sedant obesi, macilenti de latibulis prodeunt, sic ursi & testudines. Puer, cui cibi maligne, neque fere nisi ad mortem evitandam præbebantur, ad sceleti macilentiam redactus est *g*.

Qui negat eum adipem alere, vir in experimentis solertissimus, diminui tamen, iterumque increfcere auctor est *h*.

Exhausto adipi, inprimis a morbis, fere similis gelatina succedit, qualis ante adipis nati tempora in iis loculis fuit. Nihil in hydropicis vulgatus est visu aut facilius. In ove emaciata gelatina loco adipis *i*. In ipsius leonis morbo enecti corde Academici Parisini pro adipe gelatinam reppererunt. Hæc gelatina fecit, ut cellulosa tela pellucido liquore plena Cl. viro *Antonio Deidier* in lymphatica vasa mutata visa sit *k*. Causa alibi dicetur. Videtur autem ea & in languore viscerum poni, quæ coctioni ciborum præponuntur, quando ex eo vitio aqua & gelatina vegetabilis suam naturam retinet: & in vaporis ad venas majores inter-

*f* Valisneri de chamæleon-  
te africano T. II. operum  
p. 418.

*g* Kaauw imp. fac, Hipp.  
p. 456.

*h* A. J. Roessel de Rosenhof  
hist. ranar. p. 22.

*i* Eph. Nat. Cur. Dec. I.

ann. 8. obs. 30.

*k* Consil. T. III. p. 121.



cepto reditu, qui in suis loculis retentus stagnat, easque distendit.

Supereſt nunc, ut adipis utilitates expendamus. Eas non minimi momenti eſſe continuo autumabile videtur conſideranti, quam late, per diverſiſſimi generis animalia, adeps dominetur, ut in quadrupedibus, avibus, piſcibus, infectis denique pinguitudo reperiatur, ne *l* ephemeris quidem, aut erucis exceptis *m*, neque multo minus late dominari videatur, quam muſculoſum ſyſtema. Et princeps utique commodum, quod corpori animali præſtat, mobilitas eſt, quam adeps inter vicinas partes ejus corporis conſervat, cum frictio inter quæque duo ſolida corpora non alia ratione potentius tollatur, ſive funes fuerint, ſive coria, ſive ligna, ſive metalla denique, quam interfuſo oleo, quo videntur aſperitates illæ exæquari, quæ in ſuperficiebus ſere omnium corporum exſtant, ut repletis valleculis, quæ ea quaſi juga interjacent, tota ſuperficies in unam planitiem ſubſideat. Præterea fibræ animales facile rigeſcunt, & in ſiccam, fragilemque naturam abeunt. Nunc vero circumfuſum oleum & fibrarum ad contingentes fibras frictionem minuit, & ſingulas etiam fibras tepidum blandumque obungit. Non ignota ſunt, quæ Cl. olim *Leyſerus n*, deinde Cl. *Hunauld*, celebris in brevi ævo famæ anato-

*l* Swammerdam bibl. natur. biliff. in memoir. pour ſervir  
p. 576. à l'hiſt. des infectes p. II.  
*m* Malpighi de bombyce p. *n* Prim. lin. ſystem. medic.  
16. 17. C. de Geer, vir no-

micus o, contra hanc adipis utilitatem scripserunt. Verum non potui quidem hactenus vim earum objectionum percipere, quas receptæ sententiæ uterque opposuit, neque videre, quomodo adeps lacertis agentibus interpositus eos fugiat, quem necesse sit a tumentibus vicinis musculis premi, & per eorum superficiem late diffuere. In minoribus musculis vapor gelatinosus idem officium præstat, neque usquam partes aliquæ super se mutuo mobiles reperiuntur, quin liquor aliquis interponatur p.

Sed porro inter vicina membra torosque humani corporis adeps legitima discrimina servat, mediusque intercedit, ne conferveant. Ea vero intercapedine abolita omnia coalescunt, cutis cum musculis, muscoli ad musculos, & ad periostea, & undique motus in artu perit. Utique enim abscessuum vulgatissima sedes in celluloso textu est q, etsi non unica, cum verum pus in cerebri, testium, hepatisve carne nascatur, in quibus visceribus nullus adeps ostendi potuit. Plerumque tamen pus ipse adeps est, cui sanguis & lympa admistu suo putredinosi nonnihil addiderunt r. Hinc, uti retuli, pus variolosum flammam concipit. Hinc pinguedo in aqua putrescens dimittit al-

o *Histoir. de l'Acad. Roy. des scienc.* 1732. p. 28. 29.

p *Petit des malad. des os* T. I. p. 354. & alii plurimi

Cl. viri. Non cohaeret, quod fluido separatur Boerhaave

*Præl. T. III. p. 703.*

q Boerb. in *præf. ad Aphrodisiacum.* Sharpe *chir. oper.* p. 66. Shebbeare *practice* T. II. p. 42.

r *Grashuys de suppurat.* p.

16.



bidam, tenacem, purisque similem materiam, quæ in ea aqua subfidet *s*, & ex unctuofo febo materies puris similis nascitur, uti monui *t*. Verum suppuratio una cum adipe cellulofum etiam textum destruit *v*, ut omnino intervallis musculorum exhaustis nudæ & rubentes carnes appareant, variis, & idoneis omnino testibus *x*. In pectore vidit *Hofmannus y*; *H. Franciscus le Dran* in colli musculis ab anthrace denudatis *z*: einde in peste Massiliensi idonei testes. In musculis exterioribus cruris ab abscessu denudatis *Cl. Ravaton a*. Consumpta parotide vidit *Cl. Hodges* venas jugulares externas, arterias, nervum recurrentem, tendines, œsophagum, denudata omnia *b*. Carbo pene totum thoracem occupaverat: ut muscoli intercostales in respiratione agentes conspicerentur *c*.

Nunc eo adipe consumpto patet, quantam utilitatem corpori præsentia sua præstiterit, cum connatis ad ossa carnibus motus artus aut pereat *d*, aut insigniter certe debilitetur, & ancyloseos species succedat, si major abscessus in ea sede fuerit, in qua artus flectitur. Ex gangræna cruris, consumptis cellulis adiposis,

*s* *Grafhuys* ib. p. 26.

*t* *Idem* p. 28.

*v* *Idem* p. 22. &c.

*x* *Boerhaave de lue venerea*  
p. 16. *Bartholin centur.* 3.  
*hist.* 19.

*y* *De effect. elasticit. in corp.*  
*hum.* p. 8.

*z* *Tom. I. obs.* 94.

*a* *Traité des playes des armes à feu obs.* 87.

*b* *Loimologia* p. 130.

*c* *Traité de la peste* p. 285.

*d* *Moyle Chirurg. memoir.*

p. 10. &c.

motus membri periit *e*. A vulnere duodenum int. connatum peritonæo, hepar cum septo transverso *f*. Omento destructo post vulnera intestina peritonæo adhærent *g*, & inter se ipsa confervent *h*. Simile malum in macilento corpore, consumpta omenti pinguitudine succedit *i*. Cum omentum deficeret, ventriculus hepar & lien conferbuerunt *k*. Omento consumpto intestina villis enatis conglutinata *l*.

Eodem fine, & ad impediendas cohæssiones partium, quas super se invicem moveri e re est animalis, pinguedo de superficie mesenterii, mesocoli, omentique, & forte pariter de adipe peritonæi exhalat, & adeo evidenter liquido exhalabili abdominis miscetur, ut adipis crustas natatiles in eo liquido viderim. Videtur natura mollis & lubrica intestinorum, omniumque viscerum abdominis eo præsidio conservari. Subcutaneus pariter adeps per grandes poros, in piscibus imprimis spectabiles *m*, neque penitus in homine obscuros *n*, cumque

*e* Boerhaave præl. ad aphor. n. 302. & ad Tom. III. præf. 330.

*f* Wepfer de cicut. aquatic. p. 204.

*g* Saviard obs. 59. *Memoir. de l'Acad. Roy. des Scienc.* 1705. p. 40. *Ephemer. Nat. curiosor. Vol. 6. obs. 134.* Moyle l. c.

*h* In plerisque earum, quas nunc citavi, observationum.

*i* Comper in philos. transact.

*Bidloi.*

*k* Bartholin Centur. 3. hist. 6.

*l* Bontius obs. 7. l. 3.

*m* Cutis cetorum plena foraminibus & undique lubrica est Martens l. c. p. 102. 103.

*n* Ant. van Leeuwenboeck epist. physiol. p. 405. 406. Ruysch ad Boerhaave de fabric. gland. p. 55. *Trew in commerc. litter. Nor. 1743. hebd. 31.*



pilis & capillis o ad exteriorem cutis superficiem exhalat, eamque nitidam, & ab aspero aere tutam servat. Ea enim ejus elementi violentia est, ut omnes membranas animales, sola epidermide excepta, ficas, immeabiles, corneasque reddat, suisque humoribus & vita privet. Frigus etiam aëris non melius a cute avertitur, quam oleoso quidem unguine opposito, uti per experimenta ostendimus, quæ naturam imitata sunt.

Porro adeps intervalla plurima musculorum ita replet, ut stabilitas iis partibus concilietur, quæ absque eo adipe mobiles quasi fluctuarent, & simul, dum mollis adeps cedit, eæ partes moveri & dilatari possint absque impedimento. In orbita exemplum est, ad cujus osseam cavam cum oculos cum musculis suis non congruat, necesse absque eo adipe foret, ut minor quidem oculus nataret flaccidus, major autem & orbitam repleturus ab osseis parietibus comprimeretur. Renis ambitum convexum æquali declivitate cum musculis psoa & quadrato pinguitudo exæquat, quibus musculis id viscus infidet, ut cum firmitate iis carnibus nitatur. In homine, cui frequentissimus situs est sedere, natium cuti maxima copia substernitur, & pariter musculos glutæos a sedilium duritate & confictu tuetur, & una inter rectum inte-

---

o C. Gottlieb Ludwig in in nostra disputationum anapogr. de humore cutem inuntomicarum collectione.  
gente, quod recusum existat

stinum atque musculos obturatores internos interjectus, replet equidem hanc imam pelvis sedem, ut tamen distento per vices intestino facilis cedat: pressusque præterea molle unguen laborantibus levatoribus & sphincteri ani circumfundat. Alibi videtur inamabilem inprimis sceleti figuram tollere, dum congestus rotunditatem pro foveis efficit. Ita inter malarum ossa & buccinatorem musculum maximæ adipis glebæ sunt, quibus consumtis tristissimæ fossæ in facie excavantur: quo oculorum etiam hæctica profunditas pertinet, quoties orbita adipe male turget. Albam etiam cutem & molliter fultam adeps subiectus & pellucens reddit. Hinc infantes albi: hinc albissimæ partes, quibus plurimus adeps subjicitur, mammarum exemplo: hinc puellarum cutis, dum macilescunt, ad olivæ flavedinem marcescit.

A frigore aeris animalia corpora defendere creditur is adeps, qui plurimus undique cuti subjicitur. Certe in rigidissimo frigore oceani borealis omnes pisces, cetus, phoca, aves denique, plurimo subcutaneo oleoso adipe muniuntur *p*; & homines macilenti vim frigoris magis, quam obesi, sentiunt.

Resorpti adipis quænam utilitas sit, est inquirendum. An alat resumtus, & proprio de succo animal vivat, sunt qui dubitant. Ple-

---

*p* *Anderson Nachricht von in proprio libello Rai Wis-*  
*Island de ceto dentato Cachel-* *dom of God p. 26. 152. &c.*  
*lot. Schelhammer de Xiphia*



rique, etiam antiquiores physiologi, cum animalia hieme sopita pingua sub initio frigoris esse viderent, & macilenta de latibulis exire, in eam sententiam inciderunt *q*, oleum hoc resorbunt alere, & sanguinis inopiam sustentare *r*, quæ ab inedia sponte sequitur, materiem denique glutinis præbere, quod omnes partes solidas instaurat. Rejiciunt alii id alimenti genus, neque absque idoneis argumentis. Nam ea animalia, quæ hiemem inter somnos transigunt, nihil de alvo egerunt, vix perspirant quidquam, denique circulatione sanguinis ita sunt modica, ut penitus frigeant, quod eo loco docebitur, in quo caloris animalis historia cotradetur. Si vero nihil consumunt, non videtur necesse, ut reparent. Visa enim sunt animalia, cum sua pinguedine, de latebris produisse, & ipsi subinde urfi. Deinde sanguini redditus adeps aliis Cl. viris non est visus ejusmodi, ut blandum cruoris temperamentum conservet, cum in hominibus & equis subito & vehemente corporis motu macilescuntibus calidissimas & pessimas febres excitet *s*, & suspicio sit, ita fluidum & agitatum, ut resorbeatur, acrescere, uti oleum coctum acre fit. Et in somno adeps adeo non videtur consumi,

---

*q* Valisnieri T. II. p. 436. *r* Fanton l. c. p. 34.  
 Jacobæus de ranis p. 71. Rai *s* Huxham of fevers p. 13.  
 Wisdom of God p. 292. De Hinc febres obesorum perimuribus montanis Cl. Alt- culosiores.  
 mann vom Eismeere p. 208.

raceum butyrosfum, & aliud liquidum oleum. Inde succus five liquor volatilis fuliginofus, empyreumaticus, acidus, ad drachmas quatuordecim ex unciis fedecim adipis provenit. Eum liquorem & guftavi, & cum fyrupo violarum rubrum colorem efficere vidi, & cum alcalinis liquoribus effervescere, & cum fale volatili in cryftallos abiiffe *i*, quales ex fale succini & fale cornu cervi nascuntur. Deinde oleum ceraceum craffum, quod dixi, destillavit *k*. Id ipsum massam butyraceam fudit, & oleum limpidius, tunc aquam acidam, & liquorem acidum volatilem, & demum oleum empyreumaticum. Oleum vero liquidum adipis humani *l* denuo secessit in liquorem acidum, & oleum limpidum album, & subfuscum aliud, ut satis cum oleis vegetabilibus consentiret *m*. Ex his experimentis liquoris acidici copiam æstimavit Cl. Vir ad universum adipem, uti 121 ad 768 *n*. Cl. *Macquer* sebum purum destillatum alcali volatile edere recte negavit *o*, & acidum phlegma edere docuit, tum guttulas olei & oleum fixum *p*. Accuratus denique Cl. *David Henricus Knappe*, post meum ex Gottingensi Academia discessum, postque varia tentamina, comperit *q* ex sebo bubulo, igne arenæ sensim aucto, adscendere vapores,

*i* p. 39. n. 64. 65.*k* p. 41. n. 66.*l* p. 41. n. 67.*m* p. 42. n. 68.*n* p. 44. n. 71.*o* *Chym. pratiqu.* T. II. p. 484.*p* p. 481.*q* l. c. p. 23. n. 22.



qui in aquam vasis recipientis cadunt. Innatavit oleum aquæ, & vapor ex recipiente acerrimus, oculis perinde ut vapor putrescentis olei balænarum noxius, exhalavit *r*. Id oleum, quod aquæ innatabat, cum aqua repetito mistum, liquorem aqueum dimittit, per siphunculum subtractum, acerrimum, acidum, & sic porro a reliquo oleo successive destillato aqua acida pari modo secedit, quam idem vir Cl. depurare docet *s*, inque purum acidum, omni aceto fortius *t* reducere, ab omni tamen alio acido diversum *v*. Ex his experimentis adparet, quare adeps & medulla fero putrescat *x*, & quare pus, cujus pars omnino ex adipe nascatur *y*, quodque flammam per mea experimenta concipiat, acidum & ipsum *z* sit, ut cum heliotropii liquore rubescat, etiam per *Ruysschii* experimenta. Magnam partem adipis in pus abiisse nuper *Schreberus* vidit *z*\*, & de parte puris fatetur *Borden*, etsi succos albuminosos admisceri pinguibus non repugno. Sed etiam conjectura viri insignis in experimentis *Nehemie Grew* per hæc nova pericula utcunque confir-

*r* *Martens Reise nach Spitzbergen* p. 114.

*s* *Knape* l. c. n. 25.

*t* p. 27.

*v* p. 29. Quod nempe salem ammoniaci similem facile generet.

*x* *Pringle* *diseas. of the army* p. 425. Recens adeps fit globulis crystallinis *Leeuwenb* T. III. p. 223,

*x*\* In duobus corporibus, p. 39. 40.

*y* Ex unctuosâ sebo materies puri simillima paratur, *Grashuis de suppurat.* p. 28.

*z* *Duverney traité des maladies des os* T. II. p. 410.

Mera etiam lixiviosa principia in pure repererat *Pinelli* l. c. p. 162.

*z*\*

p. 559.

matur. Is nempe cum oleum olivarum a spiritu nitri adfuso in butyri speciem cogi vidisset *a*, non improbabile esse existimavit, etiam in animalibus coagulum acidum causam esse, quæ adipem spisset. Eandem in sententiam & Cl. *Macquer* *b* transit, & *J. Fr. Cartheuser* *c*, & inde causam deduxit, ob quam animalia herbivora carnivoris obefiora sint; acidam nempe naturam integriorem conservant. Paulo aliter *Dale Ingram* oleum coagulatum ex miscella albuminis articularis, cui multa medulla immista sit, cum aceto nasci vidit *d*.

Ultimum crassius de adipe elementum carbo est, quem Cl. *Rhades* & de adipe ipso, & de oleo ejus aut crasso, aut limpido, obtinuit. Ex adipe insipidus nascitur, undecim drachmarum pondere ex unciis sedecim *e*. Is ignem tamen concipit, terramque relinquit, absque ferro, cujus pars vere fixa totius adipis est fere  $\frac{1}{7280}$  *f*. Sal ergo fixus ex adipe nullus obtinetur, ut dudum monuerat *J. Conr. Bar-chusen* *g*.

Adeps, cum sit ejusmodi, uti nascatur nunc est inveniendum. Etsi enim ad secretiones hæc theoria pertinet, quæ nondum exponi potuerunt, adeo tamen simplicia experimenta ad hæc explicanda sufficiunt, ut malim totam cel-

*a* *Anatom. of the plants* p. 233. Experimentum etiam extat in *Comm. Acad. Reg. Scient. an. 1719.*

*b* l. c. p. 482.

*c* l. c.

*d* *of the Gout* p. 46.

*e* p. 39. n. 63.

*f* p. 42. n. 69.

*g* l. c.



lulofæ telæ adipisq̃ue connexam hiftoriam nunc abfolvere.

Cellulæ adeo funt, variæ figuræ, quas diximus laminis fibrifq̃ue textus cellulofi intercipi, & quæ adipi funt pro loculis. Eas in corpore humano paffim, & in fubcutaneo adipe, melius tamen in cavernofo corpore penis, & in vitrei humoris cellulis, & maxime in inflatis fpongiofis funiculi umbilicalis, pulmonis, ventriculi & inteftinorum telis cernere eft, quarum eæ præftant, quas ultimas nominavi, quia inanes, melius oculis patent. In pifcibus grandioribus evidentes funt, quoties adeps vacuos alveolos deferuit *b*. Innumera- biles colliguntur ubique loculi, & ab uno ad omnes via patet, non per unicum aliquod, quafi ampullæ, oftium, quam nimis artificio- fam imaginem non oportet recipere. Figura utcunque rotunda eft, cum ipfe adeps fponte fe in rotundas glebulas colligat. Ampullas er- go ovatas, cæcas, appenfas fini arteriarum, primus descripfit *Marcellus Malpigi* *i*, con- gregatas in lobulos, percurfas reticulatis vascu- lis, & quæ alia fufe narrat Vir Cl. Similia *Francifcus Gliffon* docuit *k*, deinde *Clopton Havers* *l* de medulla quidem locutus, & nu- perior Cl. *Grutzmacher* *m*, qui duplici præterea icone lobulos rotundos medullæ bubulæ ex-

*b Martens* l. c. p. 109.

*i De omento & adipof. duftib.* p. 40. 41.

*k De ventriculo & intef- tis* c. XI.

*l Osteolog. difcourfe* 3.

*m* l. c. n. 12.

preffit *n*, & arteriarum trunculos majores, qui per intervalla lobulorum, & cellularum decurrunt, atque minores furculos, ipsis cellulis inpenfos, recte distinxit. Plura vix certa fide innotuerunt.

Conjectura varia addidit. *Marcellus Malpighius*, glandulosæ fabricæ notissimus fautor, glandulas vel fontes pinguedinis esse, vel secernendi certe adipis adminicula, suspicatus est *o*. Certius inde folliculos glandulosos proprios, in cellulosis adiposis dispositos, alii descripserunt, ut *Cl. Perrault p*, & *Samuel Collins q*. *Nicolaus Hartsoeker* & glandulas pinguedinis, & ductus excretorios admisit *r*. Neque abludit aut *Johannis Fantoni s* aut *Littrii* sententia *t*. Illustri denique *Morgagnus* fasciculos pinguedinosos, globulis, quasi glandulosis acinis, refertos descripsit *v*.

Neque hic conjectura substitit. Cum enim priori seculo passim & majorum glandularum excretorios ductus alii invenirent, & minorum folliculorum ipse *Malpighius*, imposuit *Cl. viro* hæc analogia, ut etiam pinguedini proprios ductus tribueret. Ergo ex adiposis striis omenti, quæ vasa rubra comitantur, in hystrice vidit, per areolas vasis istis interjectas oleosas li-

*n* p. 2. 3.

*o* l. c. p. 39.

*p* *Essays de physiq.* T. III. p. 294. edit. Paris.

*q* *System. of anatomy* p. 281.

*r* *Suite des conject. physiq.*

p. 85.

*s* *Anat. corp. hum.* edit.

1711. p. 37.

*t* *Hist. de l'Acad. Roy. des scienc.* 1704. p. 18.

*v* l. c. p. 39.



neas, diversas ab iis striis, de stria in oppositam aliam striam decurrentes, turgidas adiposis globulis. Eas adeo lineas habuit pro ductibus excretoriis veris, qui ex arteriis omenti orti, tamquam ex aliqua adipis in animale metropoli, pinguedinem diducerent  $x$ , ita tamen, ut pro sua modestia, conjecturam esse, ipse fateretur  $y$ .

Magni viri omnes theorias per quinquaginta fere annos tota Europa adoptavit. Ergo *J. Mauricius Hofmannus* descripsit lobulos, microscopii ope sibi visos, refertos globulis pinguibus, aut potius vesiculas quasi pulmonales, vasis perreptatas, his adnatos globulos adiposos, & vasa ex lobulis exeuntia adiposa vesicularia: tum strias adiposas, vasis vicinas, & alias, quæ ad oppositas strias decurrant, easque jungant, has in vitulo: denique in calido bovis omento ductus pellucido adipe plenos se vidisse retulit,  $z$ . *Raymundus Vieussens* adiposa vasa omenti, reticulata, frenulis exiguis a se invicem remota, idem, tamquam rem sibi observatam, tradidit  $a$ . Sed etiam *Parisini Anatomici*, in splendido opere, quo dissectorum animalium historiæ continentur, in fele Zibethica visos ductus adiposos repetierunt  $b$ , propriumque iterum testimonium egregius olim vir *J. Fantonus* pro *Mal-*

$x$  p. 35. 36. 37. 38. ibid.

$y$  p. 41.

$z$  *Diff. de oment.* p. 2.

$a$  *Nov. vasor. system* p. 99.

$b$  *Memoir. pour servir à l'histoire des animaux.*

*pighio* dixit *c.* *Samuel* demum *Collins*, hic equidem alienæ potius industriæ notarius, & adesse ductus adiposos, & a splene oriri reliquit *d*, neque penitus etiam hoc ævo *Malpighiana* vasa absque patronis sunt, cum vere adesse *Cl. Imbert* nuper adfirmaverit *e*.

Verum hæc omnia, ut in conjecturis fieri solet, recentior industria subvertit. Et glandulas quidem nemo posteriorum incisorum vidit, ostendetque, quam continuo dicemus, simplicissima & facillima secretionis adiposæ historia, inter arterias, & adiposos loculos nullum aliud receptaculum interesse. Neque oculus, aut microscopium, in tenuissimis laminis cellulosis crassiorem aliquam particulam discernit, quam pro glandula habeas. Denique pro suo candore *Johannes Fantonus* in nuperiori opere priorem sententiam suam antiquavit, & glandulas adipis secretorias ipse rejecit *f*.

Adiposos vero ductus ipsa ratio poterat refutasse, quæ ostendit, pigerrimum humorem multo melius per brevissimam viam ex arteriis exhalare, quam quidem per longa, moræque obnoxia vasa. Deinde ex vulneratis iis striis, quæ pro ductibus adiposis habitæ sunt, ita adipem effluere olim monuit, ut non ex totalongitudine striæ, verum unice ex proximo veniat,

*c* *Manuduct. anatom.* p. 14. *f* *Dissert. anatom.* edit.  
*d* l. c. p. 183. 185. 1745. p. 42.  
*e* *De tumor.* p. 2.



*J. Hieronymus Sharalea*, & pro vasis haberi nequeant *g*. Et ipse demum *Malpighius* post maturiores cogitationes eos a se ipso propositos ductus abrogavit *h*, & refutavit eosdem æquus *Cl. viro* & glandulosæ theoriæ *Morgagnus i*. Facile autem est, magni viri errorem ex striis cellulosis interpretari, quæ in vivo animale fluido adipe plenæ sunt.

Ergo in veriore secretionem adipis est ut inquiramus. Nempe in arteriis corporis humani undique, & per universam earum longitudinem, poros esse persuademur, qui visui quidem non pateant, aut breves certe neque conspicuos ductus excretorios, qui ex cavea arteriarum in cellulosas cavernulas aperiantur. Eos poros experimenta manifestos reddunt. Injectus nempe in arterias liquor cujuscunque fere generis, aqueus, gelatinosus, adiposus, sebaceus, undique per totam arteriarum longitudinem exit, atque in cellulosi textus spatiola effunditur. Aqua, aut frigida, aut calens, celerrime ex arteria, in quam siphone impulsæ fuerit, in spongiosam eam telam exit, & multo facilius eam viam percurrit, quam quidem in venas transeat, ut minime necesse sit, ad hunc eventum, venas ligasse *k*. Ichthyocolla in aqua, vel in debili frumenti spiritu soluta, & colore aliquo vividiori tincta, calensque, conti-

*g* Oculor. & ment. vigil.  
p. 60.

*h* Oper. posth. p. 25.

*i* Advers. anat. III. p. 3.

*k* Douglas l. c. p. 6.

nuo ex arteria in cellulofam telam fubcutaneam, inve cellulofas intercapedines membranarum ventriculi & inteftinorum exfudat, quæ facilitas fraudi eft, neque finit vasorum fyftema tenui humore apte replere : pulchritudinem vero fummam efficit in repletis naribus, inteftinis, aut ventriculo, quando vermiculatus color, in cellulofam telam effufus, per tenuem membranam intimam pellucet. Facile autem eft, ad quamcunque torofi habitus menfuram corpora puerorum eo liquore replere, & rugofum collapsumque cadaver in rubentem & teretem speciem vivi & dormientis hominis reftituere, aut, fola continuatione experimenti, in monftificam formam distendere. Adeps calidus fufusque eamdem viam celerrime percurrit, ut omnino ad injectiones ineptus fit, cum defertis vasis, relicto colore, totus in mufculorum cellulofa intervalla exeat. Denique etiam febum calens, majori paulo conatu, impulfum de tota arteriarum longitudine exhalat, omnino ad nativi itineris adipis imitationem: quem videas fimillimis ftriis fecundum tota vafa omenti, quam longa funt, & aliarum partium corporis animalis difponi. Ea exfudatio ex integris femper vasis fit, quæ fi rupta effent, facile diftingueres, quod omnis injecta materies circa vulnus in maffam informem confufa ftagnet, atque coloratum febum plurima & pallidior circumftet: cum exhalans contra adeps lineas arteriæ parallelas efficiat, ubique perinde craffas, neque ab extremis finibus magis, quam ex fimplici, abfque ramis, trunco exeat.



Hujusmodi experimenta numerosissima etiam invitus feci, didicique, hanc summam in replendis vasis difficultatem esse, ut satis subtilem liquorem invenias, qui in minima etiam vasa penetret, neque tamen nimis tenuem, qui in cellulosos loculos exfudet. Qui plurimum in vasis animalium replendis se exercuit, *Friedericus Ruyschius*, plurimis locis hunc eventum describit, & sanguinem roris modo in tomentosam substantiam effundi inde deduxit *l*, quem discipuli, & princeps *J. Godofredus de Berger m*, passim sequantur. Aquam ex arteriis, in quas impulsam fuit, exsudare, & ea carnes inebriari, auctor est *Johannes Gottsched n*, *Fridericus Hofmannus o*, & *Alexander Stuart p*. Huc forte pertinet *J. Conradi Peyeri* locus, in quo legitur, ceram in arterias pulsam facile in cellulosam telam effundi *q*. Similia porro nostrorum vidit *Stephanus Hales r*, & toto egregio libello, per omnes fere corporis humani partes per experimenta confirmavit *Abrahamus Kaauw s*.

Aër non perinde facile per adipis vias transit, vidi tamen, & in corde potissimum, aë-

*l* Thesaur. anat. IV. n.

96. Proem. ad thes. VI. p.

13. & in eo thesauro n. 125.

thes. X. n. 35. Thesaur.

maxim. n. 19. 112. Advers.

anat. I. n. 6. De fabric.

gland. p. 67.

*m* De natur. human. p. 171.

*n* Apud Ill. olim Schreibe-

rum in vita *F. Ruyschii*.

*o* In disp. de synovia.

*p* De mot. & struct. mus-

cul. p. 14.

*q* Method. anat. p. 101.

*r* Hæmostatiks p. 144.

*s* De perspirat. Hipp. n.

562 & alibi.

rem in coronarias arterias inflatum, in cellulofam telam circa vaforum truncos exiiffe, ut spumæ fimilis, aut unionum cumulus videretur. Argentum vivum perinde difficiliter eam viam legit: vidit tamen legiffe *Guilielmus Cowper t*, & ego in corde vidi.

Quam viam varii ab anatomica manu impulsi liquores percurrunt, per eandem fanguis ipfe in plurimis morbis exit. In cadaveribus incisis hominum strangulatorum, aut gravi inflammatione peremptorum, frequentiffime vidi v, per ventriculi, aut intestinorum membranas, lineas rubras, fufcas, & pene nigras denique, fecundum totam arteriarum longitudinem decurrere, quas manifesto fanguis effecerat, undique ex arteria in cellulofam eam telam effufus, qualis omnes arterias ambit, & quam in animalibus etiam minutiffimis experimenta noftra demonftrarunt x. Quando primum hæc fcripsi, anno 1751, vidi, cum tibia fracta diu tranfverfo in fitu a chirurgo difpofita fuiffet, & fubito nunc ad perpendicularum fe disponderet fibi permiffa, fanguinem plurimis locis in cellulofam telam fubcutaneam exhalaffe, & plurimas maculas lividas effeciffe, quas ipfa natura diffipavit. In peripneumonia funeftiffima fanguis ipfe exhalat in cellulas æreas pulmonis, inque eas effufus pondus au-

t *Myolog.* p. 8.

x *Memoir. fur le mouv.*

v *Opuscul. patholog. obf. du fang.* II, paffim in feët. 8. 43. p. 109.



get visceris, ut fundum aquæ injectus petat, idemque cruor transiture sanguini immeabilis resistat: quod vitii genus, dirissimum, alias descriptum dedi *y*. Ex mensibus repressis, in scorbuto, frequens est sanguinem macularum specie per universam corporis superficiem effundi, & denique manare & sub epidermidi passim, & per internas vesiculæ felleæ, ventriculi, & intestinorum membranas. Latius etiam effundi vidi aliquoties aut a dato arsenico, aut a repetito usu antimonii emetici, ut late in ventriculo sub tunica musculari in cellulosa secunda sanguis effusus rubentes in manibus consisteret. Sed etiam petechiæ nihil aliud mihi, aliisque claris viris & videntur, quam sanguis in subcutanea spatia cellulosa exhalans: idemque, sed truculentior morbus, in carbone est: in eo enim sanguis in omnia cellulosa intervalla loci adfecti, ad ossa usque effusus, ea nigro cum colore replet. Et per internas etiam aortæ membranas maculas gangrenosas, ex sanguine exsudante natas, nimis frequenter vidi. Ea omnia integris vasis fiunt, non perruptis, quod vitii genus rarius est, & a nobis, injectis in vasa ejusmodi corporum variis liquoribus, non potuisset non detegi: eos enim liquores ex rupta arteria necesse foret erumpere, & in magnas maculas massasque confluere, uti haud pridem monuimus.

---

*y* Opuscul. patholog. obs. 14. p. 28. seqq.      *z* Rogers of epidemic diseases p. 14.

Minime vero hæc cuiquam nova debent videri. Antiquissimus enim medicus *Erasistratus* sanguinem per anastomofin exfudare docuit *a*, & inter recentiores *J. Daniel Schlichting* *b* inflammationem fieri a sanguine in telam cellulofam impulso, diferte descripsit, magnasque eo modo inflammationes nasci, cum minores a sanguine impacto proveniant, auctor est *Gerardus v. Swieten* *c*. Porro *Cl. Huxhamius* diapedesin in pessimis petechialibus febribus observavit *d*, & hæmoptoen absque vaporum eruptione, per exfudationem *e*, inque tertianis continuis malignis febribus *Cl. Clegborne* adiposas partes corporis, omentum, mesenterium, colon, ab effuso sanguine atratas describit *f*. Sed etiam maculæ, quales dixi in omento, colo intestino, & mesenterio, purpureæ minime raræ sunt *g*, & ad eundem demum eventum refero exfudationes illas sanguinis, quæ a nimia exagitatione animalium cursu fatigatorum natæ toties a *Boerhaavio* citatæ sunt, & in aorta arteria bovis potissimum *h*, tum in cervi aorta a discipulo *Cl. viri* *i*. Adde his, si videtur, *Antonii v. Leeuwenhoeck* de exfudante de arteris sanguine testimonium *k*.

*a* *Cæcl. Aurelian Chronic.*  
L. II. c. 10.

*b* *Traumatograph.* p. 239.  
not. ad *Verbrugge* p. 283.  
284.

*c* *Comment. in aphor. Boerhaav.* p. 626.

*d* *Of fevers* p. 41.

*e* p. 191.

*f* *Description of Minorca*  
p. 65.

*g* *Traité de la peste* p. 402.

*h* *Prax. med.* T. I. p. 242.  
de lepore vero *Prælect.* T.  
III. p. 501.

*i* *Ger. van Swieten* l. c. p.  
171.

*k* *Continuat. arcan. natur.*  
epist. 112. p. 55, T. II. p. 201.



Proxima ergo ex arteriis in cellulofas cavernulas via est. Verum in fano animale adipis materies est in proximo. Nam chylus quidem, cujus magna pars butyrofa est, per sanguinem conspicuus oberrat, quod sæpe vidi, & suo loco dicam. Verum adipem, guttularum specie, de amputatis vasis destillavisse, irrefragabilis auctor est *J. Baptista Morgagnus l*. In ranarum vasis fluentem pinguedinem vidit *Marcellus Malpighius*, quæ equidem felicitas nunquam mihi contigit, mihiq; ægre sperabilis videtur *m*. In scorbuticorum sanguine adipem vidit *Franciscus Glisson n*, & *Fridericus Ruyschius o*. In urina, quæ de sanguine secedit, adeps minime rarus est, in renum tabe, & in lue venerea.

Si adeo adeps cum sanguine arterioso fluit, si ex tota arteriarum longitudine via in cellulas circumjectas liberrima est, si præterea, ut ostendetur, adeps sponte ad parietes arteriarum fertur, nihil valde obscuri est in secretionem pinguedinis, de qua *Winslowus* nimis cautus desperavit *p*.

Breve uti adipi in suos loculos iter est, ita cito absolvitur. Hortulani, amatae aves magnatibus, unico die pinguescunt. Alaudæ interdiu macilentæ, noctu pinguissimæ sunt *q*.

*l* *Advers. anat.* II. p. 16.

*m* *l. c.* 42. *posthum.* p. 92.

*n* *l. c.* p. 85.

*o* *Advers. anat.* II. p. 28.

*p* *Traité des Tégumens n.*

72.

*q* *Stahl theor. medic.* p.

374.

Sues post famem triduo faginantur *r*. Pueris amissa per morbos rotunda cutis mollities celerime reparatur.

Quies autem animi & tranquillitas *q*\* & corporis ad colligendum in suis cellulis adipem requiritur. Corpora laboribus exercita non pinguescunt, siue animalium fuerint, siue hominum. Nullus operarius bajulusve pinguis est *s*. Equi, quos cursus & lassitudo corporis macilentos conservavit, in hibernis stabulis celerime faginantur. Boves vetulos, ab aratro macilentos, si in pascua læta revocaveris, brevi tempore sapidissima pinguedine repleri vulgo notum est. *t*. Sic boves, quibus fatigatis ossa absque medulla fuerant, eam quiete recuperant. Quiete, & cæcitate, & diffractis cruribus, anseres enormem molem per faginam adquirunt *v*, & columbæ pinguescunt *x*. Mures montani hieme pinguissimi fiunt, etiam absque cibo *y*, idemque de ursis est notissimum *z*, quod utrumque animal id anni tempus perpetuo somno transigit. Ut recte pinguescant

*r* Aristoteles in histor. animal. L. VIII. c. 6.

*q*\* Farre inquiry 310.

*s* Clopton Havers osteolog. p. 207.

*t* Verulam. hist. vit. & mort. p. 364. Bradley husbandry p. 55. Is faginandum bouum in Devoniam, & occidentali parte Angliæ, in-

que Helvetia & Thuringia fere mos est.

*v* Oliv. des Serres de Pradel p. 446. Bradley country farmer director. p. 27.

*x* des Serres p. 482.

*y* Rai wisdom of God p. 292.

*z* Aristoteles histor. anim. L. VI. c. 36. Hillerstroem Jämtlands diur fonge p. 15.



gallinæ, plurimum ut dormiant necesse est *a*, eoque scopo ipsum lolium in cibum admiscetur *b*. In doliis glires pinguescebant *c*, & capite damnati, sæpe *d* etiam me observante, pingues ad supplicium exeunt. Ipsi cyprini in cella pinguescunt, quando musco obvoluti, ab omni motu arcentur *e*. Veteribus modus erat notissimus, quo corpora redderent ex aridis luculenta. Ferulis percutiebant eas partes, quas volebant crassescere *e\**. Id ad laxatam telam cellulofam refero.

Quare ea omnia, quæ motum sanguinis minuunt, dum integra valetudo superfit, ea obesitatem conciliant. Ipsa ætas quadraginta & quinquaginta annorum, favet summi, quod tardiores nunc pulsus viresque circulationis minus rapidæ sint. Qui obesissimus obiit, virili tamen demum ætate id adipis incrementum fefellerat *e\*\**. Contra cura animique labor maciem facit, & obesiores ii sunt, quibus minus vehementes animi motus contigerunt. Inde *Cæsaris* vox, se pingues illos unctosque non timere: eos enim cura reipublicæ, aut libertatis desiderio minime macescere, acuti ingenii tyrann-

*a* Reaumur art de faire  
éclore les oiseaux domestiques  
p. 2. id. 2. p. 392.

*b* p. 393.

*c* Varro [de re rustic. L.  
III. c. 15.]

*d* Conf. Cl. Rhades disp.  
cit. p. 45.

*e* Rhażczynski hist. natur.  
Polon. T. II. p. 211.

*e\** Galen. Meth. medend.  
XIV. c. 16.

*e\*\** Borden Malad. chroniq.

fumi, ut augeatur: eo lentior enim sanguinis motus est, quo protractior somnus: neque satis certum est, animalia macra ex hibernaculis prodire, in quibus latuerunt *t*. De ea ergo re malim ampliare, dum de eo inprimis phænomeno rectius constet, quod ultimo loco tetigi.

Num in ureterem, crassa intestina, vesicam, pinguedo resorbeatur, quas corporis partes plurima circumstat, alibi inquiremus, & possent fæces adipe plenæ probabile reddere, quas citavimus *t*<sup>\*</sup>.

De medullæ utilitate peculiari hic quaeremus. Et primum, minimè dubium est, medullam per poros, quoscunque demum, in ossis duram naturam resorberi, omnia laminarum intervalla fibrarumque interstitia pervadere *v*, inque ipsam superficiem ex ossis cavea emergere. Id enim iter medulla etiam in mortuo osse describit, & ossa penetrabili rancidaque flavedine *x* imbuit, atque conspicuis guttulis de extremis laminis exsudat. Hujus resorptionis utilitas manifesta videtur, fibras laminasque ossis obungere, fragilitatem minuere,

*t* Plurimus in ranis flavus *v* Duverney in *Journal des adeps* reperitur; quando ex *savans* 1689. n. 19. in libello, latebris prodeunt A. J. Roquem in *disp. anat.* vol. 6. *sél* l. c. p. 34. Pingues exe- recndi feci, & in *memoir. de unt de latebris urfi Plinius l'Acad. des scienc.* 1700. p. L. VIII. c. 36. *Hillerstroem* 204. *Vieussens traité des li- l. c. Aristoteles hist. L. VI. queurs* p. 138. *Glass de in- c. 30. Pontoppidan hist. nat. flammant. oss.* p. 200. 201. *norveg. T. II. p. 32.* *x Duvernèy, Glass l. c.*

*t*<sup>\*</sup> Id. p. 85.



flexilitatem aliquam *y* conciliare. An ideo ossa nutrit? Multa in utramque sententiam dicta sunt: adfirmant alii *z*, multi negant *a*; non quidem firmo argumento *b* aliqui, quando medullam in ossiculis auditui dicatis, cervino cornu, aut cellulis cranii elephanti nullam reperiri objiciunt: uti enim de medulla in glebas collecta hæc vera sunt, tamen & rubicundior illa & fluidior ossium breviorum spongiosorumque, & epiphysium gelatina, medullæ nomine venit, & ea perinde, per *Ruysschii* adnotationes, in naturam sebi in sepulchris transit, eamque ab ullo quadrupedis osse abesse vix crediderim. Leonis ossa contra veterum opinionem habent medullam *b\**. Onocrotalo nullam esse, & in aliis avibus alte volantibus certum est, quarum ossa aëre necessarium fuerit replere. Nulla in testudine erat, causam ignoro *b\*\**. Alii negant alibilem naturam medullæ esse, quod oleosa *c* sit, succus vero nutritius de gelatinæ indole. Hæc mihi utique ratio vim habere videtur, si de glutine reparando sermo sit, quod elementa ossium terrea unit, & cujus pars major aqua est. Magis etiam persua-

*y* *Iidem* ibid. *Clopton* *Havers* disc. 3.

*z* *Andry* des vers II. p. 670. *éclairciss. sur le tr. des vers.* *Lientaud* *essays* p. 12. *Grutzmacher* n. 18.

*a* Ex professo *N. Lemery* in tr. de la nourrit. des os & in diar. *Trivult.* Dec. 1707. & olim. *Jac. de Mar-*

que in proprio libello Paris. 1609. 3. tum *Malpighius* de oment. § adip. duct.

*b* *Duverney* in memoir. de l'Acad. 1. c. p. 203.

*b\** *L. a Capoa* *raggionam.* V. p. 153.

*b\*\** *Caldesi* delle tart.

*c* *Glisson* de rachit. p. 119.

demur medullam non nutrire, quod de crudorum humorum genere, acidaque sit, in ossibus vero nullo experimento acidi quidquam adpareat, ut in libro *de nutritione* ostendetur *d.* In ossibus enim fere meram lixiviosam naturam reperimus.

Alia utilitas medullæ esse videtur, ut per tenuem cartilagineam crustam epiphyfes obliuientem transsudet, seque liquiori articulari misceat, ejusque partem oleosam augeat *e.* Non ignoro fuisse Cl. Viros, qui nolint hanc transsudationem admittere *f.* Verum omnino medulla cadaverum perinde per cartilagineam crustam exsudat, eamque flavedine sua tingit, viamque adeo ad caveam articuli patulam nacta est. Deinde Cl. olim amicus noster *Benedictus Stæbelinus* vidit, rubrum liquorem, in quem cartilago epiphyseos immissa fuerat, penetrare per id munimenti genus, per amplos omnino sinus, inque medullæ caveam se penetrare, omnino ut per ovorum testas solet: idque experimentum memini virum præstantissimum olim in literis mihi aperuisse. In equi humero & femore conspicuos poros describit *Clopton Havers*, qui a medulla ad caveam cap-

---

*d* In ossibus humanis apud 1. c. exp. 5.<sup>o</sup> in cartilagine  
*C. Neumannum* (1. c. p. vitulina apud *Eundem* exp.  
 1244.) in bubulis apud Cl. 14. & in ungulis equi exp.  
*Macquer chym. prat. T. II.* 20. ubique nullum acidi ve-  
 p. 478. & *Neumannum* (1. stigium repertum exstat.  
 c. p. 1250.) in cervi cornu- *e* *Clopton Havers discours*  
 bus apud *Eundem* p. 1242. 3. *Gorter Chirurg. p. 32. &c.*  
 & *J. Conradum Barchusen f Gratzmacher n. 20.*



fulæ articularis ducunt *g*. Ea via credit Ill. *Senacus*, animalia per labores & itinera medullam amittere *h*.

Utilitates adipis enumeravimus, sequitur ut aliqua vitia ejus succi exponamus. Nempe suus adipi modus est, quem ad octo libras Cl. viri in adulto homine constituerunt *i*. Eum modum aliquando & homines superant, & animalia, & immensum adipem coacervant, tum ex lauto victu, tum ex nimia quiete animi & corporis, maxime si ea laborioso vitæ generi successerit, ut boum exemplo ostendimus, qui ab aratro ad læta pascua dimissi, lautissime faginantur. Illustrius exemplum legitur *Demetrii*, qui melioribus annis Poliorcetis nomen meruerat, & captus nunc, & in custodia servatus, regio tamen apparatu sustentatus, ita adipe crevit, ut intra non plurimos menses perierit *k*. Ad magnam vero rationem & homines & animalia consuetum pondus superant, mirumque est, quantam vim adipis subcutanei colligant. Homo enim, cujus pondus medium fere 160 librarum est, ad 427 *l* 448 *m* 480

*g* l. c.

*h* *Senac* ad *Bertin osteol.* p. 61.

*i* *Quesnay sur la saignée* edit. nov. p. 145.

*k* *Plutarchus* in vita ejus principis.

*l* *Smetius* in principe femina, cui maximus ventriculus fuit. *Miscellan.* L. X. p. 580.

*m* *G. Cheyne english medical.* p. 342, cum bona sed vulgari diæta.

n 492 o 500 p 565. 569. 580 q 600 & 609. r & demum ad 800 librarum pondus pervenit: Bos a 500 libris ad 2540 r\* 2666 & 2792 s & 2800 t, & 3520 t\*, quod dimidium elephanti pondus est. Sus non magnum animal supra 600 l. t\*\*. Imprimis autem infantes obesitati enormi obnoxii sunt. Puerum quinquennem 250 libr. pondere v, & alia exempla quam plurima reperi. Deinde ad sex unciarum crassitiem adipem sub cute collectum, in homine memorant *Philosophicæ Transactiones* x, ut nihil improbable sit in historia *Dionysii* Heracleæ tyranni y, quem obesissimum, & somnolentum, longis acubus, in carnes defixis, necesse fuerit excitare; neque alienæ a fide sint *Varronis* z historiæ, aut *Buffonii* a; quorum uterque mures nidos in vivi suis larido fecisse vidit, prior ille præterea quindecim pollicum distantiam a cute ad os fuisse. Ita L. *Apronii* filio medici adipem detraxerunt, eumque pondere levarunt b. Et si enim nervi omnino per subcutanea cellu-

n *Phil. Transf.* n. 479.  
o *Hanov. Anmerkungen* T. I. p. 144.  
p *Philos. Transact.* l. e. & in *Gentlemans Magazine* anni 1750. in quibus hominis icon exstat.

q *Breslauer Sammlungen* 1721. m. dec. 1724. p. 530.

r *Idem* & eph. nat. cur. Dec. 1. ann. 2. obs. 87.

r\* *Statius Muller suppl.*

s *Hanov.* l. c. p. 220. 221.

t *Gentlemans Magazine* Decemb. 1750.

t\* *Young Easttour* T. p. 71.

t\*\* *Muller* il.

v *Tulp.* L. III. obs. 55.

x n. 265.

y *Photius in biblioth.* p. 269. *Ælian. var. lect.* L. XI. c. 13. *Athen.*

z L. II. c. 4.

a *Histoire naturelle* T. V. p. 112.

b *Plin.* L. XI. p. 632. edit. *Harduin.* nuperior.



losa spatia incedunt, cutemque adeunt, non ideo tamen in cellulas adiposas earumve laminas finem faciunt, quos, si curiose profecutus fueris, omnibus, vel minimis furculis in cutem infumi videas. Hinc cellulosa insensilis, & acus, quæ per eam adigitur, non prius dolorem excitat, quam eo tempore, quo oppositam cutem adtigit *c*. Qui autem per cellulosam quasi peregrinantur nervi, in citatis exemplis nihil senserunt, quod pauci, plurimo adipe interfecti, in plerisque vulneribus inviolati abierint, & forte, perinde ut vasa, ab adipe elisi, sensu facti sint obtusiore.

Omnino autem hæc obesitas denique suffocat, non aves solas *d*, aut animalia *e*, sed ipsos utique homines. Exstinctus fuit, præ nimia mole pinguitudinis, cui sex pollicum mensura adipis fuit. Similia exempla plurima legimus *f*. Pueri ipsi præ nimia obesitate, dum lactent, pereunt, *g*, quod id alimentum plurimum butyri, in adipem facillime abituri ipsis exhibeat.

Non inutile fuerit, paulo minutius inquisivisse, quænam nimix pinguitudinis propria vi-

*c* *Memoir. 2. sur les part. irrit. & sensibles exp. 52. 53. &c.*

*d* Hortulani, quando cibi satis nacti sunt, occiduntur ab adipe *Doebel Jägerpractica p. 56.* Pereunt præ obesitate aves *Maubeches Reaumur art de faire éclore &c. T. II. p. 409.*

*e* *Aristoteles hist. anim. L. III. c. 17.*

*f* *Hartman in Eph. nat. cur. dec. 2. ann. 9. obs. 13. F. Loff. obs. 8. l. 3. qui plurima exempla adfert. Hildan cent. 6. obs. 97. Plutarchus de Demetrio Poliorcete.*

*g* *Dionis cours d'anat. p. 412.*

tia sint. Et primo sensus acumen frangit, si in ea loca collectus fuerit, in quibus acutior desideratur, penis exemplo. Deinde inter fibras musculosas congestus, eas a se invicem ita separat, ut pene evanescant, & ex parallelo situ divulsæ *h*, inque nimis molli medio nantes, vim suam contractilem definant exercere. Ita musculos, etiam grandes, cum in fibras diffitas dissolverentur, *Salzmannus* junior evanuisse vidit *i*. In femore duro adipe pleno muscoli evanuerunt *i*\*. Hæc altera forte, & cum impotentia musculorum ad nimium pondus corporis ferendum, conjuncta causa est, quare ad motum inepti fiant, qui nimia obesitate laborant. *Nicomachus* Smyrnæus immobilis præ obesitate fuit, quem *Æsculapius* sanavit *k*. Vix corpus movebat, cuius obesitatem nuper retuli *l*. Plurcula autem sunt exempla hominum, quibus adipis vis fibras musculares ita elisit, ut lacerti in fibras dissoluti quasi evanescerent *l*\*. In fetibus, quibus artus superflui aliqui accesserunt, frequenter pro carne merus adeps repertus est.

Deinde obesi minorem copiam sanguinis possident, quod id omne massæ humorum vas contentorum decedat, quod in cellulas con-

*h* Ant. v. *Leeuwenhoek* epist. physiol. p. 321. 362.

*i* Disp. de plurium musculorum defectu, & in E. N. C. Vol. V. obs. 149.

*i*\* *Wildrik* hedend. letter. oeffen. v. 2.

*k* Apud *Galenum* de different morb. L. I. c. 9.

*l* *Philos. Transact.* n. 265.

*l*\* *Verhand der Holl. Maatschapp. T. XLII. 2. Mémoires présentés à l'Acad. des sciences T. VI, p. 301.*



gestum immotumque stagnat; tum quod adeps vasa comprimat, eorumque, & mollium inprimis venarum, diametros comprimat, uti chirurgi obesarum feminarum venas in brachio inciduri, nimis sæpe experiuntur. Quo plus pinguedinis animalia habent, eo minus ipsis est sanguinis, & *Aristotele* auctore *m*, & aliis bonis rei naturalis scriptoribus *n*. Deinde sensim compressa jugulari vena, ut sanguis ex cerebro difficulter redeat, obesi homines somnolenti fiunt & apoplectici. Somnolentus *Heracleæ* tyrannus fuit, quem citaavi. Verum etiam pulmones a nimia pinguitudine elisi faciunt, ut intercepto spiritu homines suffocentur: colligitur autem in pleuræ cellulosa exteriori lanugine, & in mediastino *o*. Celebris, vel ob scriptoris famam, historia est nobilis Angli, comitis de *St. Albans*, quem adeps in mediastinum collectus exstinxit, corde oppresso *p*. Sed etiam hydropi obnoxii fiunt, qui nimis pingues, isque fere ipsis funestus morbus plerumque accidit, compressis forte venis, quas oportebat refluxum vaporem accipere. Et a renibus demum obrutis calculus nascitur *q*, atque renum ulcus *q*<sup>\*</sup>.

---

*m* *Histoir anim.* L. III. c. 19. *ann.* I. obs. 101. *F. Loff.* 1. c. *Linden physiolog.* p. 221.  
*n* *Franc. Redi oper. omn.* p. In historia morbi atrocis  
*T. VII. p. 61. Hildanus cent.* altera *Hermannii Boerhaave.*  
*6. obs. 97. Boerhaave præl.* q *Eph. nat. cur. dec. 2.*  
*ad inst. med. T. IV. p. 527.* *ann. 9. obs. 13.*  
*o* *Eph. nat. cur. Dec. 1.* q<sup>\*</sup> *Cheston p. 18. 19.*

---

# ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

## LIBER SECUNDUS.

### V A S A.

---

#### SECTIO I. ARTERIÆ.

##### §. I. *Arteriæ in universum.*

**E**X celluloso textu fiunt vasa corporis humani, quæ hoc capite dicentur: neque tamen dicentur omnia, aliæ enim erunt opportunitates, pro receptaculis, quæ alium a rubro sanguine humorem continent, ad quam classẽ ventriculus, intestina, vesica urinæ, & fellis vesicula, & capsulæ articulos continentes, & excretorii ductus, folliculive glandulosi pertinent. Sed etiam ea vasa interim omitemus, in quibus equidem sanguis continetur, neque tamen perpetuo motu circumfluit, ut incertas per vices inania sint, aut plena, quales cavæ ad genitalia inprimis membra pertinent, penis cavernosa corpora, & clitoridis. Ea enim hoc loco vasa describenda nobis sumimus, in quibus vitales animalium humores pereïni motu vehuntur, & quæ rubra vulgo a colore ejus humoris dicuntur, qui animalibus præter insecta vermesque communis est. Num etiam



in his bestiolis, uti proprii humores vitæ conservandæ destinantur, ita propria, & nostrorum similia vascula sint, per quæ ii humores fluunt, de eo nuper dubitatum est. Magnus omnino in animalium historia auctor *Aristoteles* infectis, uti sanguinem, ita venas negavit *a*.

Vasa equidem in multis infectis Cl. viri viderunt, in ephemeris branchiis & in alio infecto Ill. de *Geer b*. Vidit in verme marino, nereide, & arteriosa vasa & venosa Ill. *Mullerus c*; vidit in cochlea *Listerus*. In cimice vas universi corporis longitudine ramosum *Ledermullerus* depinxit *c\** & in capite chrysalidis *c\*\**, & in serpentulo aquatico *c\*\*\**: in animalculis hepatis ovilli vascula adesse videntur, etiam in *Bidloi* iconibus expressa.

Neque ideo potest dissimulari, post multa vasorum ramosorum in infectis visorum testimonia, valde fiduciam nostram a *Petro Lyonnet c†* labefactari, qui admirabili industria crucæ anatomem descripsit. Diserte enim negat, se vasa veri nominis in hoc animale vidisse, qui plenissime tantillæ bestiolæ fabricam persecutus sit. Nullum certe sanguinis circulum in multis animalibus esse Ill. *Fontanae* est sententia *c††*: neque negari potest in multis vermibus aquaticis cor

*a De partib. animal. Lib. 52.*

IV. c. 5.

*b Mémoir. II. p. 2. p.*

647. 697.

*c Wassermürmer T. VI.*

*c\* Microsc., Belust. II. T. &c.*

*c\*\* Belustig. II T. 75.*

*c\*\*\* Ib. III. T. 27.*

*c† Chenille du Saule.*

*c†† Viper. p. 146. 147.*

longum conspicuum esse, nullos tamen ramos conspicuos inde provenire. Sic alter peritus insectorum contemplator negavit, se aut in rotifero animalculo, aut in infectis, vasa reperire c†††. Eam litem senex & infirmus conficere nequeo.

Id tamen video, quoties alii docti viri corpus aliquod viderunt, non viderunt alii, in universum adfirmantium partes potiores esse. Facilius enim oculos aliquid fugerit, exiguum potissimum, quam se obtruserit, quod nullum fuerit. Sed veras arterias, in quibus sanguis suis temporibus acceleratur, deinde alia, non pulsantia, neque alterne dilatata vasa, ramosa, venis comparanda, vidit idoneus auctor *Carolus Bonnet d.* Descripserunt alii in multo minoribus animalculis, ut in muscis, alba, numerosa vasa, & truncos ex uno fonte præcipuos, princeps olim in microscopicis auctor *Robertus Hooke* vidit *e*, inque ipsis pediculis arteriæ venæque dictæ sunt, & pulsui analogæ vibratio *f.* De tenerioribus illis animalculis, quæ tota sunt intestinum, ut de polypis, & de illis simplicioribus aquæ incolis, a *Johanne Hilario* descriptis *g*, equidem nondum constat, peculiare & a toto animale diversos tubulos ipsis inesse. Et in universum nulla esse vasa putes, ubi cor nullum est.

c††† *Spalanzani Opusc. II.*

d *Insectologie T. II. p. 12.*

e *Micrograph. p. 184.*

f *Philos. transact. n. 284.*

g *Microsc. observ.*



Cæterum vasa vitalem humorem vehentia, duas in classes in homine & animalibus dividuntur, quibus cor est. Prior eadem densior & solidior est, & per experimenta, quæ suo loco dicentur *b*, sanguinem a corde avehit, atque ad omnia in corpore humano membra & viscera defert. Altera classis, tenuior eadem & mollior, liquores vitales ab omnibus animati corporis particulis resumit, adque cor revehit, sive ruber sanguis fuerit, sive aliquis eorum humorum, qui conjuncti eo nomine veniunt.

Commune olim omnibus nomen venarum fuit, & frequentissime utriusque classis vasa ea voce antiquitas appellavit *i*. Venas quæ pulsant, vocare solebat *Hippocrates*, & eadem appellatione carotidum arteriarum micantem in temporibus ramum intellexit *k*. *Aristoteles* venarum unicum genus, non duo constituit, ipsamque aortam venam dixit minorem *l*. Arteriarum nomen serius ortum est, ex aliqua cum veri nominis arteria in officio similitudine, quæ eadem fecit, ut *pneumatica* etiam *aggeia*, sive spiritum vehentia vasa vocarentur *m*. Quæ enim fistula in pulmonem aërem ducit, ea ab officio primum arteria dic-

*b* Lib. III.

*i* *Rufus Ephesus* de appellat. part. p. 42. Confer doctissimum virum *Meibomium* in commentar. ad formulam

*Cassiodori* p. 85.

*k* *De locis in homine* n. 6.

*l* *Histor. anim.* Lib. III.

c. 4. Lib. I. c. 16.

*m* *Rufus* l. c.

ta est, quam postea, cum sanguinea vasa arteriarum nomine venirent, asperæ titulo *n* distinxerunt, & eam ipsam hoc arteriæ nomine unice intelligit *Aristoteles*. Prima autem omnium levium & sanguineorum vasorum arteria dicta est, quæ princeps ex corde oritur *o*, paulatim reliquæ, ut omnino eos libros, qui inter *Hippocratis* opera locum tenent, & arteriarum nomen habent, satis certo pro supposititiis habeamus. Primus enim *Erasistratus* spiritum in vasis, de quibus sermo est, contineri scripsit, novoque ut videtur, nomini ansam dedit. *Aristoteles* equidem aortam *p* dixit, quæ etiam nunc hoc nomine venit, & aortarum nomen universum pro arteriis vulgo receptum fuit *q*.

Paulatim accuratius loqui didicerunt. *Aretæus* arterias pulsantes retro aures dixit, quas secare jubet *r*. *Plinius* equidem antiquo more venarum percussum pro pulsu scripsit *s*, alibi tamen arterias vocavit, quæ spiritum vehunt *t*, & quarum pulsus *Herophilus* subtiliter exposuit, & alio loco denuo iliacas arterias appellavit *v*. *Galenus* nomen arteriarum accuratius conservavit, & *Auli-Gellii* tempore me-

*n* *Celsus* Lib. IV. c. 1.  
*o* *De oss. natura* p. 274. de  
*princip. & carnib.* p. 250.  
 edit *Linden.* *Aretæus* *acut.*  
 Lib. II. c. 1.

*p* *Histor. anim.* Lib. III.  
 c. 3. &c. Nomen tamen jam  
 receptum reperit, & *nonnul-*  
*los aortam* vocare scribit. Non  
 ergo primus eo nomine usus

est, ut ex *Rufi* vocibus &  
*Galen*i de *dissect. arter.* c. 1.  
 vulgo concluditur.

*q* *Rufus* l. c. *Aristot.* de  
*gener. anim.* L. II. c. 4.

*r* *De curat. morb. diuturn.*  
 Lib. I. c. 2.

*s* Lib. VII. c. 51.

*t* Lib. XI. p. 633.

*v* *Ibid.* p. 631.



dicus, qui venas pulsare dixerat, risum movit  $\alpha$ , cum peritior quisque arteriarum nomine uteretur. Nunc absque controversia, ut res ipsæ, ita nomina separata sunt.

## §. II. *Sectio est circulus.*

Omni in corpore animali arteriis commune est, tubos esse, quorum sectio circulus sit. Non ideo crediderim, recte ab æquabili pressione, quæ ad perpendicularum undique in latera nitatur, hanc luminis arteriarum figuram deduci  $\gamma$ . Id enim theorema unice locum habet in tubo, cujus eadem undique firmitas sit, & quem nulla externa causa cogat aliqua in sede magis cedere, in alia minus, cujus adeo extensiones pro æque longis lineis perpendicularibus haberi possunt, in omnem ambitum nitentibus, a quarum æqualibus pressionibus utique curva linea nascitur, quæ circulus vocatur. Si vero aliqua pars arteriæ firmior foret, & sanguini magis resisteret, sive ab aliis causis reprimeretur, sive alia parte sui facile cessuris aliis corporis partibus ambiretur, alia immobilem sinum ossis teneret,

$\alpha$  Noct. Attic. Lib. XVIII. P. Ant. Michelotti de separ. c. 10. rat. fluidor. p. 58. sqq. Jac.

$\gamma$  Ita fere mathematici docent Hermannus in Phoronom. Keil de secret. anim. p. 127. Lib. II. p. 164. Job. Ber- Polen. epist. mathemat. Orlov. de motu sanguin. in arter. noulli de motu muscul. n. 10. & venis p. 5. &c.

## SECT. I. ARTERIÆ SECTIO. III

minime est dubium, quin a resistentia, hic aucta, ibi imminuta, perpendiculares illæ lineæ inæquales redderentur, & alia tunc figura arteriæ nascitura foret, ovi forte similis, cujus vertex obtusus ea in parte esset, quæ minus cederet. Venosæ in dura meninge receptacula certe ex triangulis curvilineis fiunt<sup>z</sup>, neque est in mathematicorum demonstratione conditio aliqua, quæ magis ad arterias, quam ad venas spectet. Verum non ideo errarunt Cl. Viri: ipsa enim natura, quantum quidem ego novi, arterias ubique teretes fecit, & sectionem ipsis circularem dedit. Plana quæ videtur *a*, qua vertebris incumbit aorta: plana non est, quamprimum cera repletur, & in similem cylindrum certo adfurgit, uti artuum arteriæ solent, quæ planæ sunt, dum inanes jacent. Facile id adparet in sceletis arteriarum sebo repletarum, qualia olim parabam, & nunc in thesauris sunt Göttingensium. Quod injectum sebum hic efficit, id utique sanguis præstat, quando in vivo animale ex corde in aortam arteriam projicitur, & æquum est creditu; eam pariter in circulum sui vasis ambitum extendere, neque vivorum animalium sectiones repugnant. Etiam aneurysmatum verorum, certe qualia ego in animalibus feci

---

<sup>z</sup> *Prim. lin. physiolog. n.* crassiorem & firmiorem facit.  
 346. *Franciscus Boissier de pulsu*  
<sup>a</sup> Anterius in abdomine *p. 2. Mem. de Berlin 1755.*  
*P. 34.*



feci *b*, aut in hominibus ægris vidi, circulus pro sectione fuit.

§. III. *Quomodo conica dicantur.*

Arterias *conicas* esse vulgo in definitionem recipi solet: eo sensu, ut profector arteriam quamcunque, digiti in exemplo, ad suum truncum, adque aortam, & ad cor denique profecuturus, semper eo majora lumina reperiatur, quo arteria cordi propior est, unde fit, ut conica convergens dicatur *c*, quoties aortam unicum in ramum ad minima usque prosequimur, & imaginationis certe nostræ vi abusi, hanc in digitum continuatam aortam pro unico canale habemus, cujus origo & basis in corde, finis & vertex in digito sit. Verum circa hanc adeo in vulgus receptam arteriæ definitionem multa utique sunt, quæ merito moneas, nisi errorem velis admittere.

Ergo primum arteriæ, in hac ipsa consideratione, decrementsa minus videntur pendere a distantia a corde, quam quidem a magnitudine ramorum, quos arteria ediderit, quam pro trunco habemus. Quæ arteria absque ramo, aut certe absque notabili ramo, aliquamdiu decurrit, ea in eo toto spatio non videtur, certe si mensuris vulgaribus confidi potest, ad sensum

---

*b* Second mémoire sur le mouvement du cœur p. 238. *c* Boerhaave Inst. rei med. n. 132. & Prælect. T. II. p. 4. n. 10.

fenfum decrefcere. Exemplum eft in arteria umbilicali, quæ potius aliquanto latior ad funiculum, quam ad abdominis hiatum, clariffimo viro *Johanni Georgio Ræderer d* vifa eft: aliud exemplum eft in trunco carotidis arteriæ, quam æque latam, aut certe minima portione anguftiorem, & prope cornu cartilaginis thyreoideæ fuperius, & in exitu de pericardio reperio. Sed etiam vertebralis arteria, quæ ramos, minus tamen amplos, emittit, & ad colli mufculos & ad vertebrarum fpecum, ea quidem prope occiput nihilo diminuta videtur. In aorta thoracica, in arteria humerali, radiali, & mammariis internis eandem æqualitatem invenit Ill. *Archiatrorum Comes Petrus Senac e*, in falamandra vir perfpicax *Laz. Spalanzanus*. Ut omnino aliquanto minus tribuam contrario experimento clari quidem viri, *Johannis Dominici Santorini f*, qui in ftruthiocamelo arteriam, quæ per fex pollices abfque ramo edito progrediebatur, tamen in fine hujus fpatii, quam in principio, anguftiorem reperit.

Hæc, fi accuratius penfitaveris, eo ducunt, ut arteria, quam vulgo conicam convergentem vocamus, fit potius feries cylindrorum, quæ ita fibi adaptantur, ut ad fingulos ramorum paulo majorum exortus, duæ cylindri convenient, quarum major fupra eum exortum eft, minor in-

---

*d* *Thef. medic.* n. 14. *avis anatome* p. 253. tum in  
*e* *Traité du cœur* T. I. p. *Santorini obferv. anat.* C.  
 243. VII. n. 6. *Conf. J. B. Morgagni advers. anat.* II. n. 38.  
*f* Apud *Valisnerium* in ejus *Tom. I.* H



fra eam originem. Fere eo modo arterias contemplatus est Vir Cl. *Johannes Fridericus Schreiber g*, & nuper *Johannes Stephanus Guettard b*, Cl. *Ferrenii* experimentis usus.

Deinde certum est, & olim Cl. *Martinii*, & meis etiam experimentis confirmatum, omnes in corpore humano arterias supra divisionem suam, quoties in ramos divaricantur, omnino paulum dilatari *i*. Dum enim latera arteriæ utrinque in latera rami utriusque continuantur, divergunt eadem, & prius truncus nonnihil latior est, quam rami a trunco distincti sint.

Porro idonei auctores sunt, qui aliquas certe corporis animalis arterias latiores in parte a corde remotiori reppererunt, sive in anfractu aliquo, sive absque alia, quam definias, causa. Iis in casibus arteria in conum inversum abit, cujus vertex in corde, basis in sede a corde remotiori est. Exempla, ad flexiones quidem pertinentia, de lienali, de carotidibus & vertebralibus arteriis, protulit *Guilielmus Comperus*, quas in suis infra cranium gyris reperit latefcere *k*. Ego neque valde adfirmaverim, neque tamen repugnaverim huic adnotationi. Difficile enim est efficere, ut cera,

*g* *Elem. med. phys. mathem. Lib. II. c. 1. n. 18. 19. 20.* *bus angulis facilius fluidorum dispensatio* Paris. 1741.

*b* In thesi, quæ in hæc *i* *De similibus animalibus p. verba terminatur Ergo ex 200. Essays of a Society at Edimburgh. T. III. p. 156.*

*k* *Philos. transact. n. 280.*

quæ arteriam injecta distendit, æquabili vi impulsæ, legitimam cylindrum efficiat. Posses tamen causas non improbables offerre. Potest torrens sanguineus, qui in recta arteria per lumen progreditur, & parietes minus distendit, mutata per flexum directione, nunc in parietes magis incumbere, eosque diducere. Potest superior pars arteriæ, libera, a fluente sanguinis sursum impelli, dum inferior, quæ sinu atlantis recipitur, immutata superest. Potest vertebralis arteria grandescere, quæ a recepto sanguine arteriæ occipitalis distendatur. Magna enim utriusque arteriæ circa atlantem anastomosis est *l*, neque facile definitur, num ad occipitalem sanguis arteriæ vertebralis veniat, num vicissim vertebralis arteria aliquid ab occipitali admittat, quod quidem non improbabile videtur, quoties ramus ab occipitali arteria natus eo major est, quem vertebralis emittit. Vel potest denique sanguis arteriæ occipitalis moram efficere, dum resistit undæ, quam vertebralis arteria conatur expellere, qualem quidem de arteriarum mammariarum dilatatione observationem profert *Ill. Senacus m*, in quibus similem fere laxationem diametri anastomoses cum phrenicis & epigastricis efficiunt. In coronariis certe labii inferioris arteriis hæc causa esse videtur, quare, dum plurimos ramos

---

*l* Iconum anatomicar. fasc. *m* Loco non dudum cic. II. T. II. arter. thyreoid. tato. inferior. not. 6.



emittunt, minime tamen decreſcant. Videtur hic manifeſto ſanguis dextri trunci ſanguini trunci ſiniſtri obſtare, & ea ex ratione uterque truncus paulo latior fieri.

A flexione repetita etiam arteria ſpermatica dilatatur, non adeo in homine, quam quidem in brutis nonnullis animalibus, ut in porco, cui eam arteriam, emiſſis ad adipem renalem non obſcuris ramis, tamen dilatari conſtat, uti teſti propior fit, non vigefies quinquies *n* equidem, ſatis tamen conſpicua ratione *o*.

Demum ſi aliqua ſedes arteriæ a corde remotior multo quam ea laxior fuerit, quæ cordi continuatur, fieri ubique poterit, ut arteria eo latior fit, quo longius a corde recedit: id mihi in pulli aorta viſum eſt, qui ovo continetur, cujus aorta alba & firma ex corde prodiſt, in abdomine laxa, rubra, & debilis eſt, & mihi latior videtur.

Sed etiam in univerſum viſcerum arterioſas ramis, unde prodeunt, craſſiores eſſe monuit *F. Ruysch*, quem in ejuſmodi obſervationibus plurimi ſacio, quod nullum proprium ſyſtema habuerit, quod ornaret *p*.

Alia exempla variatæ in arteriis diametri lubens hic omitto, ut ſinus grandes aortæ, & aortam alternis tumoribus variam apri mexicani *q*, & tumorem, quaſi aneurysmaticum, perpe-

*n* Keil de ſecrēt. animal. p. mine T. III. f. 5.  
 99. 100. *p* Theſ. anat. VII. n. 40.  
*o* Monro de teſtibus & ſe- *q* Phil. tranſact. n. 153.

tuum, arteriæ mesentericæ equi, quem nuper descripsit Cl. *Bourgelat* *r.* Erit & his locus.

Denique omnes omnino arterias capillares longe cylindricas esse s necesse est, tum, quod frequentes retium anastomoses tantum cuique trunculo reddant, quantum emisit, tum quod unius globuli diameter constans mensura sit arteriæ, quam is globulus replet. In microscopicis contemplationibus facile est, eam cylindricam figuram videre, & icones ad ejusmodi experimenta pictæ *Leeuwenhoeckii*, *Comperi* *t*, *Cheseldenii* *v*, omnino cylindrica vasa faciunt, tum unius capacia globuli *x*, tum majores etiam arterias, quæ caudas piscium comitantur *y*.

§. IV. *Color.*

Alba arteria est, & paucis omnino locis sanguinem finit pellucere. In ipso tenero pullo, dum ovo continetur, tres trunci, qui aortam componunt, albi sunt & opaci. Minores arterias media rubra linea percurrit, duabus albis lineis comprehensa. Minimæ demum arteriæ rubent. Alba nempe, & plurima, cellulosa tela exterior arterias continet & ambit, in

*r* *Hippiatrique* T. II. P. I. p. 379.

*s* *Boerhaave Inst. rei med.* n. 243. & in *prælect. Schwenke hæmatolog.* p. II. certe de multis.

*t* *Comper ad Bidloqu* T. III. f. 4. 5.

*v* In edit. VI. *anatom. of human body* T. XXX.

*x* *Leeuwenhoeck Epist. ad Soc. Reg. scient. Anglic.* T. III. p. 52.

*y* *Idem* passim in operibus suis.



majoribus arteriis craffior, tenuis & perfpicua in minoribus.

§. V. *Membrana. Cellulosa adscititia.*

Atque nunc ad fabricam arteriarum progredior, quam quidem possis in arteria baculo immisso fulta, adhibita etiam fervida speculari z, ut tamen multa per macerationem demum discas, per morbos alia, & per animalium majorum anatomen.

Ergo arteria tubus est, qui ex aliquot cylindris membranaceis, concentricis, quasi tunicis coagmentatur. Et extima quidem, nemini non dicta, membrana ab omnibus fere anatomicis describitur. Exiguum tamen est, quod de ea firmum scriptum sit. Nam in pericardii equidem cavea a membrana cordis externa in aortam producit, & eandem ambit, interque eam membranam, & propriam arteriæ naturam, cellulosa tela cum adipe est, cumque vasculis. Verum ea quidem vagina ad pericardii adhæssiones, quibus aortæ adnascitur, cum pericardio continuatur b. Pericardium ipsum aortæ quidem adhæret, cæterum ei externum involucrum nullum præbet.

Porro secundum pectoris longitudinem pene totam pars sinisterior facci pleuræ anterior aor-

z Schacher de Administ. anatom. p. 23.

a Christ. Gottl. Ludwig de tunic. arter. n. 8. 21.

b A. Kaauw Boerhaave de perspirat. n. 153. Ill. Senac. l. c. p. 13.

tæ incumbit, & eadem fere ratione in abdomine peritonæum aortæ, iliacisque arteriis infidet, & videtur exteriorē veram, levemque tunicā præbere. Neque tamen ea vera tunica est, cum omnino posterius nulla sit, eaque facies aortæ nuda, solo celluloso textu, cum vertebrarum membranis colligetur. Neque magis huc referre oportet duræ membranæ cerebri propagines, quæ canales varios cerebri sublinunt, atque arteriam transmittunt, carotidis cerebrealis exemplo. Ea enim periosteæ sunt, neque arteriis vere adhærent.

In artubus vero, & in collo, & ubicunque nullus, alios ob usus fabrefactus, saccus membranaceus arteriæ vicinus est, ibi quidem nulla continua tunica reperitur, quam possis externam arteriæ membranam vocare, & omnino recedendum hic est a communi scholarum doctrina, quæ perinde uti musculosam, ita externam, arteriarum tunicam numerant c. Prior ante me hunc errorem refutavit olim amicus noster *Jacobus Douglass d*, deinde Cl. Vir *Alexander Monro e*, & quem nuper amissimus, celeberrimus *Ludwigius e\**.

Aliud involucrum constantissimum totam arteriam, omnesque ejus furculos, undique continet, cellulosa nempe tela: quæ ea

c Exterior arteriarum membrana venæ similis est *Vesalius de fabric. corp. hum. ed. 1755. p. 439.* Ita docent *Thomas Willis pharmac. rational. part. II. p. 16.* *Lavr. Heister* compend. anat. n. 63. & alii fere in vulgus.  
d *De peritonæo n. 19.*  
e *Edimburg Society Essays T. II. n. 16. p. 365. I. edit. e\* 1. c. n. 9.*



vafa ad vicinas membranas, ad viscera, ad periofteum, ad mufculos religat. Plerumque brevis eft, & tanto fere tenerior, quo arteriæ in minores ramos difcedunt, nunquam tamen omnino nulla, ut etiam tenerrimæ, & capillares arteriæ, totæ quam longæ funt, cellulofis vinculis vinciuntur, iisque demum submotis laxæ fiant, mobilesque.

In majoribus arteriarum truncis eadem cellulofa tela laxior eft *f*, & filis conftat longioribus, ad angulos peracutos contextis, peneque parallelis, ut denique nonnullis locis peculiari nomine, *vaginæ*, apud claros viros veniat; cui præterea involucrio paffim nervi, vafaque minora ita fe mifcent, ut rubri quid & peculiaris habitus fimile nafcatur, cujus modi reticula arteriæ mefentericæ, venæ portarum, & carotidis demum arteriæ involucrio circumponuntur. Carotidem tum communem, tum cerebralem, ejufmodi vagina *g* ambit, quæ ad pericardii adhæfionem, adque ductus arteriofi *b* in finiftro latere fedem terminatur. Ab ea vagina non folum firmatur arteria, fed præterea flectitur, inque gyrum illum sub cranio factis notum contrahitur *i*. Quare eo cellulofotextu remoto, diffoluta arteria in rectam lineam exporrigitur, multo fe ipfa nunc longior. Eadem ratione fpermatice arteria in pampini fimili tex-

*f* Lib. I. fect. II. P. 11. *intercoftal. p. 23.*

*g* J. Ern. Hebenftreit de  
vaginæ vaforum. J. Jac. Hu-  
ber in epift. de origine nervi

*h* J. Hebenftreit in progr.  
de bafi calvaria.  
*i* Prim. lin. phyfol. n. 336.

tu flexuosa redditur, quam remotis cellulosis filis in rectitudinem restituas. In brachio robusta tela arteriam cum nervo mediano colligat, & sensim extenuatur *k*. In crure perinde cruralis nervus cum arteria in fasciculum colligitur. Non aliæ sunt celebres illæ vaginæ, quas in hepate *Franciscus Glisson* descripsit, in pulmone *Lancisius*, in liene *Jacobus Rau l*.

Exteriora hujus cellulosi textus strata, aliquid ab arteriis utcunque diversum constituunt. Verum iisdem alia paulatim interiora succedunt, quæ sensim strictiora, & minoribus interstincta intervallis, ad membranæ fere similitudinem accedunt. Passim in ea cellulosa tela adeps est, prope cor in aorta cum ipsa cordis pinguitudine *m* continuatus, tum in mesenterio *n*; in pectore vero & abdomine cum eo adipe, qui plurimus pleuram & peritonæum posterior circumstat. In eodem celluloso textu vascula repunt, & plurima per arteriarum majorem anteriorem faciem in retia coeunt, de quibus passim dicendi locus erit.

Hanc cellulosam & hætenus laxiorem arteriæ partem villosam dixit *Lancisius o*, cellulosam plurimi clari viri, ut *Hermannus Boerhaave p*, *Laurentius Heister q*, *Franciscus Nicholls r*, ar-

*k* Hebenstreit de vagin. vas.

*l* Apud *Valentinum* in *An-  
phitheatri Zootomici appendice*  
p. 92.

*m* *Ludwig* n. 21.

*n* *Ideus* n. 9.

*o* De corde & aneurysm. p.  
95. ed. 1728.

*p* *Prax. med.* I. p. 242.  
*Instit. med.* n. 132.

*q* *Compend. Anat.* not. 63.

*r* *Compend. anat. æcon.* p.



chiater britannicus, *J. Fridericus Cassebohm*, *Josephus Lieutaud s*, & *C. Gottlieb Ludwig t*. Eamdem cellulofam primam vir doctissimus dixit *Augustinus Fridericus Walther x*. *Thomas Willifius x* olim vasculofam vocavit, naturam tamen ejus vesicularem minime ignoravit.

Glandulosa arteriarum membrana, quam proposuit *idem Vir Cl. y*, repetierunt, *Vieussenius z*, *Verheyenius*, *Johannes de Gorter a*, & alii scriptores, & quam depictam dedit felix in videndis, quæ alii finxerant, *Bidlous b*: eam, si quidquam habet ferii, ex glebulis adiposis natam crediderim, quæ in extremis stratis cellulosis arteriarum reperiantur.

#### §. VI. Cellulosa propria.

Uti hæc cellulosa, quam vocant, arteriæ membrana, exteriora versus in vaginas laxatur, ita intus, & qua arteriarum musculosas fibras proxima continet, sensim arctior, densior, magis alba & solidior fit, & cum magna durtate elastica, ægre compeffilis, & facillime resilitura: vasisque nunc vix conspicuis pingitur, & eadem principem omnino arteriæ partem constituit, quæ reliquas multum crassitie fu-

*s* *Essays d'anat.* p. 119.

*t* n. 10. 21.

*v* *Progr. de aneurysmat.*

*x* *Pharmac. ration.* P. II.  
p. 38. T. VI. n. 4.

*y* *Ibid.* f. 3.

*z* *Nouvell. decouv.* p. 12.  
*Nov. vasor. system.* p. 72.

*a* *Compend. med.* p. 76.

*b* *Tab. XXIII.* f. 4.

peret, & præter quam non alia in animalibus frigidi sanguinis reperitur. Hæc est cartilaginea arteriæ tunica *Andrææ Vesalii c.* Tendineam dixit *Heisterus d*, tum Cl. viri *P. Senac e*, & *J. Fridr. Cassebohm f*, ligamento elasticam *Franciscus Nicholls g*.

Verum utcunque firma ea videri possit, & verissimæ tunicæ nomine digna, experimenta tamendemonstrant, nihil esse, præter stipatum & densiorem textum cellulosum. Et primo, si scalpello purgare tentaveris, facile reperies squamulas sine fine decedere, donec fibræ carneæ nudentur, nusquam vero leve & solidum velamentum reperiri: Si in aqua maceraveris, ea laminularum intervalla subibit, & sensim dimotis filis, quæ proxima intricabantur, ita arteriam dissolvit, ut in meram spongiam abeat. Id experimentum primus fecit *Raymundus Vieussens h*, aque eo sibi persuaderi passus est, totam arteriam, absque musculosa fibra, meram spongiam esse. Feci & ego periculum, fecit *David Christophorus Schobinger i*, fecit Cl. *Ludwigius k*, nisi quod iste diminui quidem arteriæ propriam fabricam, & cellulosam telam augeri confessus, tamen illam conservatam velit. Ante nos cellulosam ejus naturam demon-

c l. c. p. 439.

d l. c.

e p. 237. contendit ibi veram membranam esse.

f In *methodo secandi post-huma*.

g l. c.

h *Nov. vasor. systema p.*

85.

i l. c. n. 50.

k l. c. n. 12.



straverunt Viri Clarissimi *Jacobus Douglass l* & *Alexander Monro m*. In majoribus animalibus ut aliæ, ita hæc, cellulosa tela tendineam faciem habet.

### §. VII. Musculosa.

Post hanc præcipuam arteriæ partem sequuntur interiores carneæ fibræ, quas in arteriæ aortæ principio inprimis contemplatus sum, qua in sede utique & copia, & rubore facilius se produnt. Multorum ibi stratorum sunt *n*, quarum alia post alia eleves, densæ, eadem cellulositate paucissima separatæ, duræ, in circulum flexæ. Eam vocem ita volo sumtam, ut nulla quidem fibra integrum circulum absolvat, anuloque possit comparari. Perinde enim, ut in aliis musculis, rectæ brevæque fibræ extremos fines suos ad latus detortos inter vicina sui similia carnea fila abscondunt. Spirales esse nonnulli scripserunt *o*, & ex bove experimenta citarunt, quos accuratior industria Ill. *Morgagni* errasse ostendit *p*. Transversas recte veteres scriptores vocarunt, & olim apud *Oribasium Galenus q*. Hæc est musculosa tunica arteriarum, a plerisque anatomicis *r* recepta, quam *primam* arteriæ membra-

*l* Descr. of the peritonæum  
p. 26.

*m* Essays of a Society at  
Edinburg T. II. p. 267.

*n* Octo vel decem in bove  
numeravit *Bl. Ludwig* n. 14.

*o* Guil. Cole Criscentius de  
febris &c.

*p* Advers. anat. II. p. 73.

*q* In scriptis anatomicis a  
*Dundaſſio* editis p. 74.

nam vocavit Cl. *Monrous* s. In minoribus arteriis fenfim malignius adparet, in capillari- bus denique ne lente quidem vitrea adhibita, qua rerum species augetur. A cerebri etiam vasis vulgo carneas fibras abesse scriptum est t, quem errorem ita redarguit Cl. *Ludwigius* v, ut tamen pauciores faciat. In animalibus frigidi sanguinis nihil quidquam earum fibrarum simile, in plurimis experimentis reperi x, uti quidem etiam contractilis vis ab iis arteriis abest y. Non ideo æquum fuerit, ex numero tunicarum arteriosarum eam ejicere, atque simplicem arteriis elaterem relinquere, qualia quidem effata *Gunthero Christophoro Schelhammer* z exciderunt, & *Raymundo Vieussens* a. In calidis enim animalibus & in fatis grandibus arteriis, oculus ipse carneas fibras percipit, in valde exiguis vero subsidentia arteriæ demonstrat, quæ dilatationi alterna succedit b.

A corde hæ fibræ non oriuntur, solaque cum ejus musculi carne cellulosa tela cohærent c. Quomodo in arteriæ majoris interiori cavea nascentium ramorum ostiola anulis suis el-

r *Willis* l. c. Tab. VI. f. 2. *Bidloo* l. c. f. 5. *Lancisus*, *Nicholls* &c.

s l. c.

t *Boerhaave* *Prælect.* T. II. n. 234.

v l. c. n. 18.

x *Premier Mémoire sur le mouvement du sang* p. 11. *Oper. min.* I. p. 229.

y *Second Mémoire* Sect. IV. n. 4. p. 236. *Oper. min.* I. p. 375. 199.

z *De pulsu* p. 13. *Art. medic. univers.* T. I. P. CLX.

a l. c. p. 86. 88.

b *Second Mémoire sur le mouv. du sang.* Exp. 55. 56. Confirmat eisdem III. *Heisterus de vulner. art. crural.*

c *Ludwig* l. c. p. 21.



lipticis ambeant *d*, & qua ratione fibræ ramorum ex fibris trunci continuentur *e*, porro quò ordine congestæ fibræ arteriæ calcar efficiant, in ea parte orientis rami, quæ a corde remotior est *f*, & qua arte inter duos ramos sibi dorsis convexis oppositos circulorum, qui eos ramos ambeunt, sibi obversis se respiciant *g*, vere omnia, ut videtur, sed fusius aliquanto & ornatius exposuit Cl. *Bassuel*, quam quidem nobis, in nostra brevitate repetiisse licet. Cicatricem etiam quasi albam & duram, quæ in concursu fibrarum utriusque rami expressit Ill. *Senac h*, durumque & teres calcar contra extremam trunci aortici caveam obversum Ill. *Morgagnus i*, reperit in aorta, qua parte in iliacos truncos divisa secedit.

Alias fibras carneas arteriæ longitudinem sequentes, plurimi anatomici proponunt, & in animalibus frigidi sanguinis omnino idonei testes repererunt, in testudine *Johannes Mery k*, in rana piscatrice *Gualtherus Charleton l*. In homine interius stratum longarum fibrarum fecit *Willisus m*, [quem alii scriptores *n* secuti sunt,] & intimæ membranæ eas fibras tribuit.

*d* Mémoires des Savans étrangers T. I. p. 31. T. II. f. 1. 2. 3. 4. 5.

*e* p. 35. f. 7.

*f* Ibid. p. 32. 33. 35. f. 4. E. E. E.

*g* f. 5.

*h* l. c. T. II. p. 671. T. IV. f. 2.

*i* Epist. Anat. XV. n. 33.

*k* Mémoir. de l'Acad. Roy. des sciences 1703. p. 453.

*l* Mantiss. Anatom. p. 77.

*m* l. c. p. 15.

*n* *Bidlous* qui iconem dedit l. c. f. 6. *J. Petrus Albrecht* Diff. de admin. anat. p. 23.

Deinde alii Clari Viri omnino adesse ejusmodi fibras ex eo putarunt o liquere, quod arteria dissecta se valide retrahat, & longitudinem suam minuat: atque id quidem phænomenon certum est, inque omni systole arteria brevior fit, uti in diastole sua longior redditur.

Verum anatome & microscopium omnino fibras longitudinem sequentes nunquam demonstravit, aut mihi, aut aliis, ante me, scriptoribus, quorum auctoritate meam tueor *p*. Neque plicas aliquas intimæ membranæ huc trahere oportet: neque tutum est, fabricas ad phænomena accommodare. Ad producendos enim effectus aliæ causæ latere possunt, ab iis diversæ, quæ nostræ opinioni primæ ultro se offerunt.

### §. VIII. *Cellulosa interior.*

Inter musculosas fibras arteriæ, intimamque membranam, cellulosa alia tela, ut inter omnes sui dissimiles membranas intercedit. Brevis-  
 0  
 s  
 tima ea est, & tenuis, & absque adipe, & ægrius demonstratur, auctoritatem tamen habet a *Walthero r*, ab *Alex. Monro* sen. aliisque *s* Cl. Viris. Et quidem certum est, inter tunicam carneam, interque intimam, potissi-

---

o *Laur. Heister de vuln. guth arter. a vi cord. æmula art. crur. n. 25. remot. p. 28.*

p *J. B. Morgagnus advers. r De aneurysm.*

anat. l. c. C. *Gottl. Ludwig s Petr. Tarin anthropotom.*  
 loc. cit. n. 19. G. A. *Lang- T. II. p. 10.*



mum flavum eum succum effundi, qui callosus primo *t*, deinde osseus fit, & in squamas duras late per arteriam rigentes abit, quæ inter intimam carneamque membranam mediæ intercipiuntur. Steatomati adfinem crassitiem membranæ intimæ huc refero, quæ arteriam obstruxisse visa est *v*. Intumescere etiam mollem ejus cellulosa, ut thlipsi enata arteriæ tubus arctetur, auctor est semper honoratus mihi, semper venerabilis Præceptor Boerhaavius *x*.

### §. IX. *Intima.*

*Intima* membrana arteriæ levis, uniformis, tenera, internæ membranæ cordis continua & similis, araneosa a veteribus dicta est *y*, a recentioribus *nervea* *z*. In ea poros Clari Viri *a* viderunt, mihi quidem non manifestos. Eadem in arteriis viscerum propriis plerumque mollior, rugosa, laxiori celluloso textu cum musculari conjungitur, rubicundior eadem. Talem in ductu arterioso reperio: alii Viri Clarissimi, aut in bronchiali, hepatica, lienali &

---

*t* Opuscul. Patholog. Obs. anat. corp. hum. pag. 129. 47.

*v* Monroo in Essays of a Society at Edinburg. T. II. *z* Willis l. c. p. 38. T. VI. f. 1.

*x* Prax. Med. T. I. p. 242. *a* R. Vieussens nov. vasor. system. p. 87. Bidlous l. c. f.

*y* Oribasius l. c. Vesalius l. 6. Lancisius l. c. Ludwigiuss c. p. 440. Vidus Vidius in n. 19.

& mesenterica arteria *b*, aut in coronariis *c* viderunt. In aliqua ejusmodi parte corporis humani ab *Alexandro Monro d* videtur visa fuisse, & effecisse, ut cum villosa compararet.

Hæc cæterum tunica aneurysmata avertit. Carneæ enim fibræ, ut fortes sint, tamen non sunt continuæ, ut omnino intervalla earum sanguinem facile in sua intervalla recipere possent. Levissima est, & cum perenni cordis motu sanguinisque rapido circuitu cavet, ne quidquam facile, dum integra est, cum membranis arteriæ concreascit. Lapidea & ossea coagula arteriarum inter eam & carneam effunduntur, polypi violatæ fere internæ superficiei arteriarum adhærent.

### §. X. *Cavitas.*

Interior arteriarum facies, quam perfluens sanguis adluit, omnino levis in homine est, neque quidquam valvularum simile habet. Non oportet huc trahere reticulatam fabricam animalium quadrupedum oviparorum, cujus nihil in homine simile reperitur *e*. Neque humana carotis plicas transversas habet, quales in cerva Parisini Academici observarunt, ne-

---

*b* J. Nicolaus Weiss de *e* Duverney *Memoir. de l'Acad. Roy. des Sciences* 1699.

*c* Lancisius l. c. p. 62. ed. f. 6. in rana; In salmonis fol. & p. 323. ed. nuper. bulbo arterioso radiatas fibras in-4. forma. descripsit Cl. Gering de piscat. salm.

*d* *Essays of a Society at Edimburg. T. II. p. 267.*



que constat, quale fuerit valvulæ vestigium, in brachiali arteria olim *Thomæ Bartholino* visum *f*, aut quid trabium nomine *J. Mauricius Hofmannus* intellexerit, quæ arteriam interius percurrant, & a laceratione fervent *g*.

Id utique in originibus ramorum, qui ex arteriis prodeunt, omnino perpetuum est, ut oblique fere nascantur, & ad acutos angulos. In ostiolo ergo, quo prodeunt, duos arcus distinguas. Eorum, qui cordi propior est, idem cavus est, sive ad ramum respexeris, sive ad trunci arteriosi progressum: idemque leni, & continuo ductu, quasi per incile, sanguinem a corde venientem in rami tubulum ducit *h*. Alter semicirculus, ulterior, aque corde remotior, eminet, a circularibus fibris congestis factus *i*. Ab eo firmitas illa & crassities major in divaricatione arteriarum oritur, quam *Cl. Viri* ad firmiorem tunicæ tendineæ cum carnea nexum retulerunt *k*. Ejus dimidii anuli effectus est, inhibere sanguinem, in rami principium receptum, ne facile in truncum redeat. Deinde facit, ut in ramos non alius sanguis penetrare possit, nisi qui integris viribus a corde advenit, neutiquam vero ille, qui a parte arteriæ remotiori, dum ea arteria contrahitur, debiliori flumine advenire possit.

*f* *Anat. IV. renov. p. 595. p. 26.*

*g* In *I. V. Horne p. 140. i Bassuel l. c. T. I. d. T.*

*h* *Lover de corde p. 37. II. f. I. F.*

*Bassuel l. c. T. I. f. 2. n. k C. G. Ludwig l. c. m. Tab. II. f. 6. & I. E. & 22.*

Eum semicirculum eo magis eminere reperit Ill. *Senacus l*, & majorem una esse & altiorrem, quo angulus acutior est, sub quo quisque ramus a corde oritur. In aortæ magnis ramis, uti æquum est creditu, maximi sunt hi anuli, & dudum *Loweri m* considerantis oculis se obtulerunt. Alium descripsit in orificio aortico ductus arteriosi *J. Baptista Carcanus n*, & nuper *Cl. Agricola o*. Ejus equidem vestigium satis adparèt *p*, cæterum neque huic, neque prioribus arcus aortæ calcaribus, quidquam tribui potest ultra ea, quæ de semicirculo ad originem ramorum arteriosorum eminente modus diximus. Valvulas arteriæ coronariæ nonnullis *q* scriptoribus dictas, ad rugas & plicas membranæ intimæ retulit olim *Meibomius r*, & ego refero.

### §. XI. *Arteriola arteriarum.*

Hactenus crassiores, & *organicas*, partes arteriarum contemplati sumus, æquum est nunc tenuiores addere & magis *similares*. Ergo arteriis suæ arteriolæ sunt, suæ venulæ, sui nervuli. Recentioris hoc industriæ inventum est:

*l l. c. n. 242.*  
*m De corde T. II. f. 5. 12.*  
*Bassuel l. c. f. 3.*  
*n Anatomes Lib. I.*  
*o Commenc. Litt. Noric.*  
*1735. hebd. 4. T. I. f. 3. 4.*  
*p. 26.*  
*p Fascic. IV. icon. ana-*  
*tom. ic. valv. Eustach. not.*  
*q Lancisio p. 62. 63. edit.*  
*fol. Omnino pro veris val-*  
*vulis habuit, quæ sanguinis*  
*circuitum determinant, Glass*  
*de circulat. P. XLIII.*  
*r De motu sanguin. n. 22.*



fenſu enim, & ſanguine arterias carere *Plinius* s reliquit, ex veterum proculdubio ſcholis. *Thomas* autem *Willis* minores arteriolas arteriarum deſcripſit, quæ & vaſculoſam t membranam efficerent, & glanduloſam v, deinde *Vieuſſenius* x. Accuratiuſ vero *Fridericus Ruyschius* & elegantiuſ, ut ſolebat, depictas dedit y, auctoritatem vero tribuit *Boerhaaviuſ*.

Diverſa earum arteriolarum origo eſt. Quæ cordi proximæ ſunt, earum multæ a coronaria dextra arteria & a ſiniſtra veniunt, variis inter ſe retibus innexæ z. Sed non rarum eſt, trunculum proprium, viciniſſimum oſtiolo dextræ arteriæ coronariæ, prodire, quem poſſis pro tertia coronaria habere, adipoſam dixit *Raymunduſ Vieuſſenſ* a. Similem alteram, ſiniſtræ coronariæ vicinam, etiam vidi.

Harum arteriolarum propagines in fetu, & in juniore homine, abſque ullo artificio, & abſque injecto liquore colorato, in arteriæ aortæ & pulmonaliſ membranis conſpicuum rete faciunt, in adultis & vetulis minus conſpicuæ, niſi tincto liquore repleantur. Id rete b cellulofæ membranæ imponitur, & ea tegitur, quæ cordis externo velamento continuatur. A celluloliſ filis hæc vaſcula undique revinciuntur, ut

s Lib. XI. p. 633. edit. *Hardouin*.

t l. c. T. VI. f. 4.

v Ibid. f. 3.

x *Nouvelles decouvert.* p. 12.

y *Epist. III. Tab. III. f. 1. 3.*

z *Icon. anat. fascic. VIII. p. 7, 8.*

a *Du cœur* p. 68. T. V. f.

1. T. II. f. 2. *Diſp. noſtr.*

de vaſis cordis propriis n. 5.

*Morgagni Epist. XV. n. 8.*

b *Ruysch. 1. c.*

recte moneat nos *Monrous*, quoties vasa membranarum ostendere scopus est, ne cellulofam telam removeamus *c*. Musculofa tunica & intima graciles ab iis furculos habent.

Reliquam aortæ longitudinem adeunt suis furculis arteriolæ variæ, natæ a bronchialibus supremis *d*, quas aut mammariæ edunt, aut subclaviæ arteriæ; a furculis mammariarum *e*; a bronchialibus vulgo notis; ab œsophageis, a phrenicis, & nonnunquam a proprio ibi ex aorta nato trunculo; a capsularibus; a spermaticis; a minimis trunculis qui glandulas lumbales adeunt *f*, & ex principio arteriæ mesocolicæ, aut ex aorta proveniunt, ex vicinia ubique, in brachio & pede ex brachialibus & cruralibus. Neque enim urgenda sunt præceptoris verba, quasi totum systema arteriarum suos ex coronaria arteria furculos accipiat. Exigui enim trunculi, iidem breves sunt, neque facile unius, aut alterius, uncia longitudinem superant.

In aliis arteriis similes ramuli reperiuntur. In pulmonalibus nascuntur a coronariis, & a bronchialibus tum supremis, tum vulgo notis, qui iidem in iis ipsis arteriis cum coronariarum propaginibus inosculantur. In minoribus truncis aut ex iis ipsis, aut ex vicina qualibet arteriola, ortum ducunt.

Ab istis arteriis reliquas arteriæ majoris

*c* *Essays of a Society at Edimb. T. III. p. 112. 113.* *e* *Ruyseh. l. c. & f. 2.*  
*d* *Icon. anat. fasc. III. art. renal. n. 7.* *f* *Icon. anat. fasc. III. ic.*  
*Tab. art. bronch. n. 6.*



tunicas ali, & vaporem exhalare, qui cellulosa spatia obungit, id quidem manifestum est. Aliquid autem ad systolen arteriæ conferre, quæ conjectura est *g Boerhaavii*, alibi ostendam, cur mihi quidem non probabile videatur.

Arteriolæ venulas sodales manifesto ponunt, quæ sanguinem ab arteriolis advectum revehant. In aorta bovis venulam, quæ substantiam ejus arteriæ perreptaret, *Malpighius* vidit *b*. Res facilis est, & in aorta ex venæ sine pari furculis, maxime vero sinistris, aque superiori intercostali vena natis *i*, deinde ab œsophageis venulis, rete excitatur, multo magis conspicuum, quam arteriolarum rete. Similes venulas alibi ex venis spermaticis ad aortam datas vidi, & passim aliæ alios truncos habent.

## §. XII. Nervi.

Nervi arterias inprimis majores plurimi percurrunt. Ita ex magno ganglio intercostalis nervi, quod est in summo collo, rami molles *k*, pulpofi, flavescentes oriuntur, non minimi, qui omnes truncos carotidis arteriæ perreptant, lingualem, maxillarem externam, temporalem, thyreoideam superiorem, occipitalem, truncum carotidis communem, in qua, proxime divisionem, proprium ex his nervis

*g* *Instit. rei Med.* n. 213.

*b* *De polyp.* p. 127.

*i* *Fasc. II. Ic. vasor. bronchial.*

*k* *Icon. anat. fasc. II. not.*

13. *ad art. maxillar. intern.*  
& in *diff. de orig. nerv. interc.* n. 17.

ganglion, sed minutissimum nascitur. Verumnum hi nervi in carotide, aut in ejus propaginibus vere maneant, non satis certum est. A ganglio *l*, quod modo dixi, furculus per carotidis truncum communem descendit, cujus finem non vidi. Qui labialem comitatur, in nervum maxillarem, sive in tertiam quinti pari propaginem, se immittit *m*.

Ita porro ex nervis cardiacis, quos superficiales voco, & quos ganglion cervicale supremum producit, rami per faciem anteriorem arcus aortæ incedunt, quos non ultra deduxi.

Mesentericam arteriam, mesocolicam, cœliacam, integri plexus nervei circumplectant, a magno abdominis ganglio nati. Reliqui fere nervi eisdem ubique cum arteriis canales nati sunt, ut in illustri exemplo trunci intercostalis apparet, qui & ipse carotidi, sed absque ramulis in ea manentibus, utique incumbit.

Neque dubium est, cum nulla absque nervo fibra muscularis sit, & cum absque ea vi, quæ per nervos advenit, debilior omnino sit ea potentia, qua eæ fibræ contrahuntur, nervulos adeo ad carneas fibras arteriarum accedere, etsi nemo, quantum memini, ejusmodi furculos demonstravit.

Sensu arterias olim carere *Galenus*, & nostro ævo satis consentitur carere. Exiguos, pro totius arteriæ portione, nervos esse, & ex cellulosa ejus natura colligi potest, & ex parvitate lacertulorum musculoformum, quos ade-

---

*l* In disp. cit.

*m* Illust. *Mekel* in litteris.  
I. 4.



unt, & ex debili omnino sensu, quem experimenta in vivis animalibus facta in arteriis ostendunt. Nunquam enim ullum animal irritare vidi, aut doloris edere indicium, dum arteriam solam, & absque nervo, vinculo adstringebam *n.* Et umbilicales, & placentales arterias absque nervo esse certum est, qui ulla arte ostendi possit.

Arterias minores, & arterias animalium frigidorum, musculosis fibris destitutas, nulli stimulo obsequi omnino videtur. Qui enim musculosam vim in arteria admittas, ubi nullus sit musculus.

### §. XIII. *Vis contractilis.*

Si fibræ carneæ in arteria sunt, naturam in ea esse irritabilem necesse est, cum inseparabilia in corpore humano sint, musculosum esse & irritabile *a.* Distinctius tamen & minutius, ne in errorem incidamus, de arteriæ natura contractili dicendum est.

Et primum firmitas sola arteriæ, & innatus cellulosi textus elater, aliqua signa roboris exhibent. Huc ergo refero, quod arteria dissecta suum lumen apertum servet, quam constantiam luminis in ipso pullo, decimo quinto die incubato, toties vidi. Vena enim dissecta

---

*n* Second Memoir. sur les olim Galenus add. Fontana part. sensibl. p. 217. Idem est Mem. p. 261. testimonium Cl. Bromfield o Premier Memoir. sur l'irchir. obs. p. 162. Pouteau & ritabilité p. 53.

collabitur, arteria se retrahit, & cavea libera manet, nihilo arctior. Neque quidquam ultra requiri crediderim ad plicas illas faciendas, in quas dissecta arteria in vulneribus collabitur *p*, aut certe lumen apertum arteriæ diminuitur, demumque claudi putatur *p*<sup>\*</sup>, & ad quas non minima pars pertinet ejus curæ, qua natura hæmorrhagias compescit. Eamdem etiam vim esse credo, qua arteria, cum nervo comparata, brevior redditur. Arteria 27 lineas cum 7 decimis longa contraxit se dissecta ad duodecim lineas *q*, triplo & quintuplo magis, quam nervus *r*. Eadem extendi potuit ad 55 lineas, priusquam rumperetur. Sed mortuus hic elater est, & in arteria post vitam dudum deletam superest. Ita porro aorta bubula, digitis distenta, iis remittentibus cum impetu se contrahit *s*. Denique post mortem, & contrahitur arteria, ut quadruplo se ipsa minor fiat *t*, & inflata, aerem inter duo vincula interceptum, pertusa, cum impetu expellit *v*, neque adeo musculosa vi. Sanguis ex arteria crurali incisa ad duos pedes, in rarissimo equidem exemplo, post animalis mortem exsiliit *x*.

*p* Morand in *Memoir. de l'Acad. Roy. des Scienc.* 1736.

*p*<sup>\*</sup> Aitkin and White, Ad quartam partem Kirland.

*q* Sauvages theor. tumor. p. 8. De pulsu p. 2. Aortæ humanæ portionem a 21. lineis ad 13 se restrinxisse auctor est Ill. Senac. l. c. p. 239.

*r* Sauvages p. 9.

*s* Illustr. & Ven. Senex Johan. Fantonus in dissert. anat. 1745. editis P. III. F. Hoffmann de effect. elasticit. p. 7.

*t* Lamure de secret. p. 26.

*v* Senac l. c. T. II. p. 199.

*x* Drclin-court Canicid. III.



Sed etiam experimenta ad simplicem elatrem, adque cellulofam arteriæ fabricam refero, quæ per venena chemica capiuntur. Nempe arteria cultro irritata, contra quam musculoſæ fibræ, minime contrahitur *y*. Sed etiam leviora venena arteriam non movent, ut vini ſpiritus, & fuccus tithymali *z*. Acerrimi vero acidi liquores, ut oleum vitrioli *a*, omnibuſque iſtis ad hæc pericula potentior ſpiritus niri fumans *b*, arterias tactu ſuo anguſtant, tum integram, tum incifam, ut interna membrana acido liquore tangi poſſit.

Primum non oportet hæc nimium ornare. Non recte arteriam ranæ nuper diſſectam conſtringi ſcriptum eſt *c*, quam patulam manere toties vidi; non bene pariter ab oleo vitrioli tactam imperviam reddi legimus *d*. Deinde irritationes illæ chemicæ, quibus nimium tribuit amicus noſter, neque ſemper effectum ſuum producunt, aut arterias cogunt contrahi, neque eum effectum per vim aliquam vitalem exferunt: perinde enim a morte, aliquando etiam altero die hæc ſuccedunt *e*, & in viventibus animalibus ſæpe aliter eveniunt *e*\*.

Sed alia phænomena ſunt, quæ magis na-

*y* Second Memoir. ſur les anat. p. 7.

part. irritabl. p. 274.

*z* l. c. Exp. 278.

*a* l. c. Exp. 267. Zimmer-

man diff. de irritabilit. p. 24.

*b* Second memoire &c. Exp. 276. 277. 278. 279. 281. 282. 280. 565.

*c* Ant. de Heyde Exper. I. exp. 219 ad 238.

*d* Idem obſ. 85.

*e* Exp. 565. 566. 567.

*e*\* l. c. Exp. 265. 266. 269.

270. 271. 272. 273. 274. 275.

283. 284. 285. In oper. min.

turæ arteriarum contractili tribueris. Arteriæ incisæ immixtus digitus fortiter comprimitur *f*. Ligata arteria aorta, & super vinculum pertusa, sanguinem in quiete cordis valide ejicit *g*; aliquando etiam vulnerata vehementius dicitur in systole projecisse, quam in diastole *h*, raro id quidem exemplo, & omnibus nostris adverso. Bis ligata arteria tamen inter vincula se evacuat *i*, quod quidem a cordis efficacia fieri non potest, atque adeo fabricæ arteriosæ debet acceptum referri. Aorta ligata sanguis tamen ex arteria exit, inanemque relinquit, & in venas transit, quod videtur contractioni arteriosæ tribuendum esse *k*, cum etiam corde deleta succedat *l*. His si addideris, manifesto in vivo animale, cui calidus sanguis est, arteriam, quam unda nova sanguinis a corde adveniens dilatavit, in proximo tempusculo contrahi, & subsidere, non erit, cur omnino vim contractilem arteriis deneges. Nondum tamen inde evictum erit, num elateri soli obediunt, num omnino ad muscutorum modum constringantur. Certum est enim, multis a morte diebus arteriam, dum humida sit, ita se contrahere, ut incisa ceram mollem, qua repleta

*f* Senac T. II. p. 199.  
*g* Vieussens neurograph. p. 27.

*h* G. van Swieten Comment. T. I. p. 65.

*i* Schwenke hæmatolog. p. 80.

*k* Senac T. II. p. 228.

Pecquet de mot. sang. c. 7.  
 Drelincourt canicid. l. g. Gævet nov. febris idea p. 137.

*l* Borell. mot. anim. L. II. prop. 31. Conf. Stæhelin de pulsu p. 20. Quincy of animal fibres.



fuerit expellat, quæ vermiculi specie per vulnus prodit.

Quare experimenta oportet conquirere, per quæ de hac lite definiatur. Nunc si de conspicua contractione quæritur, quæ ferro etiam, aut alia irritatione mechanica cieatur, mea quidem experimenta arteriam ad omnes eos stimulos surdam faciunt.

In arteriis majoribus, potissimum etiam cordi continuis & contractionem vicinis facilius admittas. Non vidi, non vidit *Ill. Caldanus*, non *Cl. Jadelot l\**, non alii curiosi viri. Vidit tamen *Cl. Verschuur* sæpe quidem surdas ad stimulum arterias, nonnunquam tamen obsequiosas, ut ferro, veneno, scintilla electrica percussa, erosa, incisa, vossella demum comprehensa arteria se constringat. Huc etiam experimenta referas *Spalanzani* & *Verschuurii*, in quibus, dum difsecabatur, arteria se contraxit.

Ex ea ergo lege, quæ adfirmantium experimenta paribus negantium experimentis potiora statuit, putes in arteriis magnis, quarum fibræ circulares manifestæ sint, vim esse insitam; non perpetuo conspicuam, non alacrem, non validam, quæ sit paucarum fibrarum, sed aliquam tamen, si omnino, ut ego quidem malo credere, experimenta *Cl. Juvenis* absque partium studio, & absque videndæ contractionis cupidine, instituta sunt. Bulbus certe aortæ pulli, qui in ovo est, manifeste contrahitur.

---

*l\* Journ. med. 1773, febr. & in libello.*

Deinde si quærat de contractili vi inconspicua, quæ oculis se ob debilitatem non offerat, ut tamen ad eam admittendam ex causis suis te deduci patiaris, omnino ubicunque fibræ sunt musculares, ibi vim contractilem esse putes, cum absque ea vi fibra musculosa cogitari nequeat, etiam quando ejus teneritudo & debilitas conspicuo motui ciendo non sufficit.

Pleraque frigidorum animalium arterias omnino tamen vi contractili destitui videtur. Centies vidi, incisam subtili ictio lanceolæ arteriam aliquam mesenterii sanguinem profudisse: nunquam autem ea rima ullo modo aut se contraxit, aut vicissim retractis labiis hiare visa est. Nobiscum sentiunt *Spalanzanus* & *Galenus* l\*\*. Sed hæ arteriæ, ut in parva bestiola, sunt de maximis l\*\*\*.

Convulsionum, quas non rari nuperi arteriis tribuerunt, nullum certum testimonium exstat. Sic inflammationem l\*\*\*\* a spasmodica contractione vasorum minimorum derivarunt, contractionem ab acribus: verum hypothesein utique docuerunt, experimenta ei e directo contraria videntur prætervidisse.

#### §. XIV. *Robora arteriarum.*

Robur & densitas arteriarum pendet a crassitie cellulosæ fabricæ, aque arcta filorum unio-

l\*\* De tubulis capillaribus experimenta omnino 14. Ingolstatt 1774.

l\*\*\*\* *Whytt nervous disorders*

l\*\*\* *Oper. min.* I. p. 88. *dres* p. 63. 227.



ne, quibus ea tela componitur. Dudum notum erat, magnum arteriæ aortæ robur esse, tenuem arteriam pulmonalem *m*, tenerrimas & fragiles arterias cerebri. Cæterum satis receptum erat, firmitates arteriarum esse, ut diametros, ut robustissimi trunci forent, rami eo debiliores, quo minores sunt *n*.

Verum plurima nova hic utiliter detexit *Cliftonus Wintringham* o junior, Archiater regius. Arteriarum robora explorare adgressus est ope machinæ, quæ aërem in minus spatium arctat; eo aëre arterias replevit, donec rumperentur: deinde aëris copiam reputavit, quam adhibuerat, & crassitiem membranarum, & luminis amplitudinem, ita calculos posuit firmitatis, quæ in qualibet arteria est. Compendium inventorum dedisse operæ pretium omnino fuerit.

Ergo aorta, cujus crassities in homine est nonæ partis pollicis *p*, habet pondus specificum ad aquam, uti 106. 100. *q*, & in fene uti 1098. 1000. *r*. Densitas eadem, sive pondus specificum, in bove vetulo est ad aquam uti 1086. 1000. *s*, in verre vetulo uti 1084. 1000. *t*, in cane juniore, uti 1059. 1000. *t*\*.

*m* Aorta ad arteriam pulmonalem est uti 148. 110. *Sauvages de pulsu* p. 8. Sed majorem aortæ prærogativam esse certum est.

*n* *Morland on the heart* p. 62. *Martine de anim. simil.* p. 60. *Sauvages physiolog.* p. 213.

*o* *Experimental inquiry on some parts of the animal structure.*

*p* Exp. 5. de aorta descendente.

*q* Exp. 1.

*r* Exp. 6.

*s* Exp. 7.

*t* Exp. 8.

*t*\* Exp. 9.

Aorta arteria in juvene prope cor rupta fuit ab aëris vi æquali ponderi 119 librarum, unciarum 5, & aliquanto inferius pondere libr. 131 unciarum 10, firmior adeo fuit in progressu, quam ad cor, in ratione 1794 ad 1000. *v.* In verre aortæ prope cœliacæ arteriæ originem robur fuit ad robur aortæ prope iliacas, uti 1000. ad 1713. *x.* Aortæ prope arterias renales, ad ejusdem aortæ robur prope ortum iliacarum, in arietate fuit, uti 1000. ad 1112. *y,* & robur iliacæ ad robur aortæ prope arterias emulgentes, uti 1897. ad 1000. *z.* Carotidum robur insigne est, cum in exiguo cane carotis non rupta fuerit, nisi a 25. libris cum 71 centesimis *a,* & in homine triginta unciaë argenti vivi solam ruperint internam membranam, reliquis integris *b.* Arteria splenica viri tulit libras 41. uncias 8., & ejus robur ad aortam fuit, uti 1319 ad 1000 *c,* & in alio experimento uti 1302 ad 1000. *d.* Arteriæ renalis robur fuit, ad robur aortæ, uti 51 ad 40 *e.*

Hæc cum aliis similis scopi experimentis evincunt, arterias in universum quidem satis robustas esse, & ad vim cordis sustinendam aptas: cæterum in ratione incerta & variabili *f* densitates earum progredi. Debilissimam tamen esse aortam *g,* & in ea imprimis eam

*v* Exp. 15.

*x* p. 57.

*y* p. 86. 87.

*z* p. 87.

*a* Hales hæmastat. p. 156.

*b* Senac p. 241.

*c* Clifton Wintringham l.

*c.* exp. 34.

*d* Idem exp. 36.

*e* Idem exp. 38.

*f* p. 60. 178.

*g* p. 87. 90.



partem friabilem esse, quæ est inter membranam extimam & intimam *b*, & quæ vulgo tendinea vocatur. Adparebit enim, ex venarum exemplo, robora fere esse in ratione inversa duritatis. Verum præterea adeo non minui cum diametris arteriarum firmitatem constat, ut increascit *i*, & in universum trunci ramis suis debiliores *k*, & arteriæ secretioni dicatæ reliquis robustiores sint *l*. Denique legimus arteriæ partem convexam aliquanto firmiorem esse parte concava *m*, & pedum arterias reliquis duriores *n*.

Hæc omnia primo quidem ictu oculi videntur contra receptam theoriam pugnare, exquisitè tamen considerata cum ea adprime consentiunt. Nempe arteriæ artuum primum multo majori in periculo compressionis versantur, quam a corporibus circumpositis, & a ponderibus, & demum a musculis patiuntur, firmiores adeo fieri decuit. In nervis hæc naturæ prudentia manifestissima est, qui molliissimi & pene gelatinosi sunt, quoties ossibus firmiter proteguntur, exemplo intercostalis trunci, nervorum metacarpeorum: iidem vero dura cellulosa tela vestiuntur, quo loco per artuum musculos offensionibus obnoxii migrant. Deinde per omnia experimenta Cl. *Wintringhami* adparet, arterias

*b* p. 209.*i* p. 90.*k* p. 92.*l* p. 210.*m* Exp. 12. p. 62.*n* *Cheselden anat of human body* edit. VI. p. 201.

arterias, duras facile, venas molles ægrius rumpi, & in univcrsum sanguini ea vasa melius resistere, quæ se facilius extendi patiuntur. Molles ergo & minus densas natura arterias fecit, quæ cordi vicinæ sunt, & primum ejus integrumque impetum ferunt, ut eo minus ab ea unda potentissima violentur: forte etiam, ut serius offescant o. Utriusque enim vitii periculum eo majus est, quo cor propius sanguinem urget. Nam etiam cum hac cautela, uti incurfus sanguinis in arcum aortæ maximus est, ita ibi frequentissima sunt aneurysmata, uti ex plurimorum clarorum virorum testimoniis adparet p. Neque absque exemplo est eo loco aortam, etiam absque ulla prægressa dilatatione ruptam fuisse, Sed etiam femorales arteriæ, & coronaria, & varii rami carotidis, etiam in facie, passim ruptæ fuisse leguntur. In varioloso corpore arterias coronarias ruptas vidit Ill. *Lieutaud* p\*. Deinde arteriæ flexuosæ facilius ab aneurysmate distenduntur p\*\*, ut splenice p\*\*\*, & eadem rumpitur p\*\*\*\*: sic

o Est conjectura Cl. *Wintringhami* p. 90.

p *Schreiber* l. c. p. 325. J.

B. *Morgagni advers. anat.* II.

p. 81. *Lancisus* l. c. p. 76.

*Ferrein* apud *Henkel samlung medicin und chirurg. anmerk.*

III. p. 9. *Senac* l. c. T. II.

p. 319. qui aliam etiam causam adducit, de qua alias dicetur.

p\* *Sepulchr.* II. p. 20.

\*\* *Biumi* obs. 10.

p\*\*\* *Giorn. de lett.* XI. n. 1.

*Beaussier Journ. med.* 1770. febr.

p\*\*\*\* *Giorn. de lett.* l. c. & sanguis funesto eventu in abdomen effusus: iterum eadem post pulsationes hypochondriorum rupta *Act. fisico crit.* II. p. 196.



aneurysma tibialis arteriæ ruptum  $p\ddagger$ . Animalibus in universum multo robustiores arteriæ sunt quam homini, majoribus potissimum, ut vasa exigua testis equini pene cartilaginea sint duritie. In ipso tamen equo frequentia sunt arteriæ mesentericæ aneurysmata  $p\ddagger\ddagger$ , & idem sanguinem per nares, or, & penem amittit  $p\ddagger\ddagger\ddagger$ .

Convexitatem vasorum crediderim ab ictibus ipsis sanguinis, eam in sedem fortius nitentis, densiorem fieri. Non repugnat autem vera esse, quæ Vir Amplissimus *Lancisius* monuit, non idem in omnibus hominibus arteriarum robur esse, & reperiri, quibus ab ipsa origine arteriæ, quam aliis hominibus debiliores sunt  $q$ .

#### §. XV. *Ratio solidi ad fluidum.*

Adfinis est consideratio, quæ eadem perinde Cl. *Wintringhamio* debetur. Nempe ratio membranarum arteriosarum ad lumen inane, sive ad sanguineam columnam, qua perfluuntur, non eadem est ubique  $r$ , neque decrescit cum radiis arteriarum  $s$ , & alibi major est solidarum partium ad fluidas ratio, minor alibi. Ita sectio solidarum partium ad fluidas, in canis vetuli aorta prope renalium arteriarum ortum,

$p\ddagger$  *Weiz Auszüge* IV.

$p\ddagger\ddagger$  *Bourgelat Elem. d'Hippiatr.* p. 316.

$p\ddagger\ddagger\ddagger$  *Sind Stallmeister* p. 376.

$q$  *Lancis.* ed. fol. p. 108.

$r$  *Clifton Wintringham* l. c. p. 176.

$s$  Quæ fuit *Morlandi* opinio l. c. p. 27.

fuit, uti 1000. 1229 *t*, prope iliacarum originem uti 1000. 1636 *v*, in ipsis arteriis iliacis uti 1000. 1698 *x*, in lienali uti 1000. 1890 *y*, in renalibus demum arteriis, uti 1000. ad 2027. 2037 & 2079. *z*.

Has rationes, si in seriem conjeceris, erit portio fluidi ad solidum quidem semper major, ita tamen ut ad cor ratio minima sit, eundo vero augeatur, sitque ad ortum arteriarum renalium, omisso communi divisore 1000. uti 1229, ad ortum iliacarum uti 1636, in iliacis arteriis, uti 1698, in lienali uti 1890, in renalibus uti 2037. Hæc progressio eo magis meretur observari, quod priorem §. XV. pene compenset. Nempe, cum arteriæ ramorum duriores sint, quam truncus aortæ est, magis adeo cordi resistent: sed cum iidem arteriosi rami majora habeant lumina, & membranas minus crassas, a majori ergo etiam massa sanguinis distendentur pro membranarum portione. Resistant ergo magis ex sua densitate, sed vires distendentes majores sunt, & crassities quæ resistit minor. Ut omnino multo magis nunc æquabilis sanguinis in arterias dilatandas potentia sit, quam per priora videbatur. Optabile vero foret, ut eadem experimenta per alias etiam aortæ propagines continuarentur.

*t* Wintringham p. 84.

*v* Ibid.

*x* Ibid.

*y* p. 174. reductis numeris.

*z* p. 202. &c.



§. XVI. *Locus.*

Proximum est, ut sedem & loca arteriarum dicamus. Universum equidem corpus humanum, exceptis paucissimis membranis, arterias accipit, eæque per cellulosam telam progrediuntur. Nondum tamen repertæ sunt in arachnoidea membrana cerebri *a* & medullæ spinalis, in epidermide, unguibus, pilis, bulbo excepto, & in funiculi umbilicalis membranis. Cartilaginearum epiphysium cum osse limitem circulus vasculosus ambit, ex quo ramuli in juniorum animalium cartilaginee euntes ostendi possunt *b*. Ipse demum in cartilaginum ipsarum epiphysibus intimis arteriarum trium generum vidi: quarum aliæ ex arteriis rectis corporis ossis per hemisphærium vasculosum in cartilaginem epiphysios late penetrant: aliæ ex nucleo osseo undique exeunt, cum prioribus inosculatæ: aliæ demum ex arteriis superficialibus per puteolos in epiphysin se demergunt.

Verum multum a venis diversa ratione arteriæ incedunt. Uti enim venæ fere truncos sub cute, ramos profundos minores habent, ita arteriæ ramos subcutaneos ubique breves & exiguos nactæ sunt, truncis vero suis majoribus per profundas & tutas corporis humani regiones incedunt. Non ergo ubique arteriæ venarum comites sunt, nisi velis exiguis venis pro-

*a* Ruysch *advers. anat.* III. § *b* Hunter *Philos. Transact.* n. 8. n. 407.

fundis abuti, quæ arterias comitari solent, & exiguis pariter arteriis superficialibus, quæ passim venosos truncos maiores comitantur. Plurimis ergo locis arterias venæ deferunt. Vertebrales arteriæ per canales osseos transversorum processuum, venæ secundum eos processus nudiores adscendunt. Arteriæ artuum radialis, cubitalis, tibialis, peronea, arteria lingualis, unicam venam, neque eam maximam comitem habent. Contra venæ magnæ, cephalica, basilica, saphena utraque, jugularis externa, absque arteriis, aut minutis certe furculis comitatæ, sub cute incedunt. Manifesto videtur, *Naturam* hic periculum evitasse, quod ab arteriarum vulnere maximum imminet, cum in arterias vis proxima cordis celerime sanguinem impellat, & per vulnera cum periculo effundat, per venas idem sanguis multum fracta cum celeritate redeat. Quare, ubicunque venosum iter & ipsum tutum fuit, ossibus, grandibusve musculis tectum, ibi venosi trunci arterias comites habent, exemplo arteriarum mesenterii, renum, pulmonis, pelvis, truncorum cruralium, brachialium. In cerebro propria venarum fabrica exceptionem fecit. Minimi rami utriusque generis fere se comitari solent. Ita venæ, quæ arterias superne in tibia deferuerant, in digitis ad arterias redeunt. Arteria cutanea alicujus longitudinis nulla est, cranii enim arterias eo referre non æquum fuerit, cum profundius eas ponere subjectum os vetuerit. Venæ propriæ profundæ nullæ sunt, nam etsi trunci paulum ab ar-



teriis diffident, rami tamen se comitantur, exemplo venæ portarum, sine pari, & coronariarum. Multo, in universon, magis variabili incessu venæ ludunt, arteriæ constanter sunt. Quare illarum quidem paulo minutiozem historiam nemo dedit. Numerum comparabimus, quando de venis sermo erit.

§. XVII. *Rami. Divisionum numerus.*

Ergo truncos arteriarum contemplati, ad ramos progredimur, quorum alii magni, nomina acceperunt, ad fluviorum modum, alii mediocres plerisque in corpore humano locis parcius hætenus descripti sunt, alii innumera- biles, minimi & capillares, omnem patientiam fatigant. Multa in his ramis sunt, quæ considerationem nostram merentur.

Et primo, ut a simplicioribus incipiamus, quoties arteriæ dividantur, donec nomen suum servant, omnino difficile est dictu. Quadraginta, & quinquaginta, divisiones liberali manu adsignavit Cl. *Keilius c*, atque, his numerosis divaricationibus magnam partem ejus theoriæ superstruxit, quæ miram in minimis vasis retardationem sanguinis ponit. Multum decedet de admiratione eorum calculorum, si divisionum numerum minuerimus, sed nobis certe diminuendus videtur. Aliquoties in membranis intestinorum accurate repletis divisiones

ramorum numeravi, initio divisionis a corde capto, fine demum in minimis & evanescentibus arteriolis facto, quæ novissimæ oculis se offerunt. Vix unquam viginti divisiones reperi; neque ultra eas, quas ego pro ultimis recepi, valde multæ, ad venarum usque principia, divisiones esse possunt, tum quod minimæ visibiles arteriolæ brevissimæ sint, paucisque lineis non longiores, tum quod finem numerandi in ipsa convexitate intestinorum fecerim, quæ a truncorum ingressu remotissima est. Trans id jugum vero, in alterius intestinorum hemisphærii venulas, arteriolas continuari non videtur probabile.

§. XVIII. *Lumen ramorum majus est lumine trunci.*

Majoris momenti illa observatio est, qua constat, in toto corpore animali *d*, quoties arteria dividitur, nullo contrario exemplo, lumen trunci constanter minus esse, quam est summa luminum duorum ramorum, qui ex eo trunco nascuntur. Nescio an quisquam hanc arteriarum proprietatem ante *Guilielmum Cole* perspexerit *e*. *Johannes Locke*, plus molis esse in omnibus finibus conjunctis ramorum quam in trunco, perspicax senserat *e\**, de luminibus

*d* In equio eandem legem edit. Oxon. 1674.  
reperit *Stephanus Hales* p. 24. *e\** Die 3 Martii a. 1670.  
In ranis ego. *Birch history of the Royal Society* in T. II.  
*e* *De secret. anim.* p. 97.



non locutus. Sed minutius hanc legem considerare oportet, quæ in animalibus, & demum in plantis, pariter dominatur.

Rationem nempe quæſiverunt, in qua lumina ramorum ad truncum ſint. Eam rationem non definivit inventor, augeri tamen perpetuo docuit, ut trunci ſumma ramorum tanto minores ſint, quanto a corde remotius progreſſi ſunt, uſque dum extremorum & capillarium ramorum conjuncta lumina ſuos trunculos maxima ratione ſuperent, minime certe in illis imperitus auctor *f*, etſi a Cl. *Geudero g*, reprehenuſ eſt.

Inde Cl. olim chirurgus & anatomicus *Buſſiere* arterias ramis ſuis ſimul ſumtis minores eſſe ſcripſit, addita hac ratione, quam dicam. Diametrum aortæ deſcendentem pueri eſſe quatuor linearum, intercoſtalium omnium ſimul ſumta lumina efficere lineas quatuordecim, meſentericas arterias novem lineas æquare: his ergo ramis aortæ ſolis computatis, rationem naſci ramorum ad truncum, quæ eſt 16 ad 23 *b*.

*Archibaldus Pitcarnius* arteriarum lumina perpetuo augeri docuit, quo magis a corde recederent, *i* ultra non eſt progreſſus.

*Jacobus* vero *Keil*, uti primus iatromathematicam methodum & logarithmos ad fluidarum partium corporis humani velocitates indagando

*f* l. c.

*g* De fermentis p. 45.

*b* Lettre à M. Bourdelin

p. 10.

*i* De motu quo cibi adte-

runtur n. 8.

das adhibuit, ita insigniter inprimis hac proprietate arteriarum usus est. Experimenta sua superstruxit sceletis vasorum a *Guilielmo Cowpero*, celebri chirurgo, cera repletis, & aortæ primum ad suos ramos rationem dimetitus est. Eam fecit 100000. ad 102740 *k*, nimiam, cum aorta oriens in adulto certe homine aliquanto latior sit: deinde in arteriis femoris trunci ad ramos rationem fecit 10000. 12387 *l*, & brevius uti 4. 5. in mesenterio vero, pariter ramos dimensus, uti 15129. 37418 *m*, quæ ratio multo major est. Porro consideravit, arteriam non semel aut in paucos ramos dividi, sed in ramos iterum ramosos, quorum propaggines denuo suis truncis ampliora lumina nactæ sint. Atque adeo, cum secundæ divisionis rami luminum summam habeant ad truncum primum, in ratione luminum primæ divisionis ad eum truncum quadrata, eademque ratio in luminibus ramorum tertiæ divisionis ad suum truncum sit cubus rationis primigeniæ, & sic porro eadem crescât, demum in quacunque divisione ramorum conjunctum lumen erit ad trunci primi lumen in ratione primorum ramorum ad suum truncum, elevata ad eam potentiam, cujus exponens est numerus divisionum *n*. Ergo si quadraginta divisiones fuerint, & ratio constans trunci ad duos ramos 10000. 12387. erit ratio luminis trunci ad conjuncta lumina ramorum uti 5233. ad

---

*k* De secret. anim. p. 87.

*l* De velocit. sang. p. 46.

*m* De secret. anim. p. 88.

*n* De velocit. sang. p. 46.



I. o, & si quinquaginta fuerint divisiones, omnino uti 44507. ad 1. p, & immensa ratione major, si centum divisiones fuerint, & ramorum centesimæ divisionis ad truncum ratio sumatur.

Inde Ill. Archiater J. *Claudius Adrianus Helvetius* & ipse novis ad corporis humani arterias mensuris usus, q aliam rationem mediam truncorum ad ramos reperit, quæ sit 256. 284. vel 84. 71. eamque rationem in nuperiori opere contra *Johannem Bessé* defendit r, atque repetito adfirmavit, eam esse in puero rationem aortæ ad conjuncta lumina subclaviarum, carotidis sinistræ, cœliacæ, mesentericarum, renalium, iliacarum. Sed ea ratio ponendorum calculorum insigniter ab ea ratione differt, qua alii physiologi usi sunt, truncus enim non cum duobus ramis unius divisionis, sed cum ramis novem divisionum se consequentium ab *Helvetio* comparatur.

In universum cum *Helvetio* sentit Cl. olim clinicus *Sylvanus*, arteriarum nempe lumina eundo increfcere, & truncum aortæ ad conjuncta lumina arteriarum capillarium esse uti 1. ad 500. si minimum luminum incrementum posueris t.

Similia habet *Thomas Morgan*, addit tamen trunci ad ramos rationem in minimis &

o Ibid.

p Ibid.

q *Histoir. de l'Acad. Roy.* 181. seqq.

des Scienc. 1725. p. 24.

r *Lettre au sujet de la lettre critique de M. Bessé p.*

s *De la saignée p.* 112.

t Ibid. T. II. p. 297.

capillaribus vasculis minorem fieri v. Sed ex integro ad hanc contemplationem rediit *Georgius Martine*, ex posthuma Eustachianarum tabularum interpretatione clarior. Iis ergo tabulis ad metiendas arteriarum diametros usus x, legem posuit ejusmodi, ut trunci ad ramos communis ratio foret uti 100. ad 122. 123. & 125, sive, ut in prima *Keiliana* ratione, fere uti 4. 5. si vero plures rami fuerint, rationem fecit uti 100. 138. y. Et in universum, diametrum arteriæ cujusque æqualem posuit radici cubicæ numeri, qui nascitur ex summa cuborum diametrorum ramorum omnium z. Verum ea hypothesis parum omnino a conjectura differt, & optimus olim *Eustachius*, quoties partes aliquas corporis humani delineatas dabat, ad summa potius rerum capita, ad verum situm ordinemque ramorum, & inprimis ad refutandos errores *Vesalii* respexit, de minutis illis diametrorum mensuris unice securus.

Nimis parcus fuit alter iatromathematicus *Johannes Tabor*, qui lumen omnium ramorum simul sumtorum ad aortam fecit uti  $8\frac{1}{2}$  ad 1. a.

*Franciscus Nicholls*, olim Regis Britannorum Archiater, alias iterum mensuras cepit, aliasque inde rationes obtinuit b. Summam

v *Mechanic practice of phy-* & de animalib. similib. p.  
sik p. 124. 183. 184.  
x Loco statim citando p. 2 Conf. *Essays* l. c. p. 150.  
142. & de anim. simil. p. 194.  
y *Essays of a society at* a *Exercit. Medic.* p. 3.  
*Edinburgh* T. III. p. 143. b *Compend. anat. æconom.*  
T. II. f. 4.



ergo luminum ramorum ad lumen trunci sum-  
sit in ratione constanter sesqui altera. Ex me-  
fentericis arteriis adeo primæ divisionis ratio-  
nes fecit  $\frac{100}{10}$  ad  $\frac{49}{7} \frac{64}{8}$  quæ ratio est uti 10.  
15. In secunda divisione lumen trunci posuit  
ut  $\frac{64}{8}$  lumina ramorum  $\frac{49}{7} \frac{25}{7}$  quæ ratio est de-  
nuo 8. ad 12. In tertia ratione eadem  
portio repetitur.

Denique Vir Ill. *Petrus Senac c*, non  
quidem lumina truncorum, sed diametros,  
magnis valde numeris expressos suppeditavit.  
Ita aortæ truncus est apud Cl. Virum 90000  
partium, quarum rami conjuncti efficiunt  
118490. In axillari arteria diameter trunci  
est 22801. partium, quinque vero ramorum  
diametri similium partium 36499. Brachialis  
arteriæ diameter est 6241. radialis vero & cu-  
bitalis arteriæ conjuncta lumina efficiunt 8441.  
Iterum aorta ad originem cœliacæ est 42500.  
truncus vero aortæ infra divisionem, cum cœ-  
liacæ trunco conjunctus, 57249. Aortæ ad ilia-  
cas ratio est 24964. 28573. Nunc eos nume-  
ros, resectis millesimis, ad primos & præci-  
puos reduxi, deinde quadrata summi, ut ratio-  
nes luminum prodirent. Ita prima ratio est  
81. 144, proxime; secunda 484. 1296. quo  
in exemplo truncus insigni portione minor est.  
In tertio exemplo ratio prodit 36. 64, in  
quarto 1764. 3249.

Cum his experimentis mea conjunxi; men-

furas nempe plurimas cepi arteriarum cera repletarum, & in systemate ficcatarum. In unico exemplo recens nati hominis trunci aortæ diameter quadrata est 0. 004900; lumina conjuncta trium ramorum arcus 0. 003866. lumen arteriæ aortæ infra divisionem 0. 002209. juncta ergo lumina ramorum 6075. cum truncus esset 4900. In alio exemplo hæ rationes fuerunt 3789. 4659. & iterum in alio 1521. 2250. Verum hæc ratio major est, quia ea ætate ductus arteriosus altera aortæ descendentis radix est, neque ergo aorta, quæ de sinistro ventriculo prodit, totus truncus est aortæ. In mesenterica arteria rationem trunci ad undecim ramos reperi 529. 988. In carotide reperi lumen trunci communis fuisse 529 decem millesimarum pollicis, lumina vero cerebrealis arteriæ & externæ conjuncta 768. In eodem homine luminis carotidis externæ quadratum, nam de quadratis semper sermo est, super thyreoideam fuit 169. lumina vero quinque ramorum, quos confer-tim eo loco hæc carotis producit, 376. Plures mensuras recensere supersedeo, plurimas autem sumsi. Ex iis autem, quas proposui, facile deducitur, trunci ad ramos lumen esse in ratione sub-fesqui-altera, vel etiam minori, ut ramorum portio major sit. Inconstantem vero rationem esse facile ex mensuris adparet, & videtur in minimis lumina ramorum pro trunci portione minora esse. Vulgare est in ranis vidisse, duas venas mesenterii, unius globuli capaces, in unum trunculum confluere, qui duos globulos transmittat. In eo exemplo, potest



globuli diameter pro diametro vasculi haberi, quod replet, & metitur. Erit ergo trunci diameter ut 2. summa diametrorum ramorum pariter ut duo, lumen vero trunci ut 4. summa luminum ramorum ut duo: lumen ergo trunci duplum luminis ramorum. Nunc si venæ duæ unius globuli capaces in unam duplæ diametri venam confluunt, analogia suadet, arteriolam duorum globulorum capacem, in duos ramos, quorum singulum unus globulus metiatur, pariter dividi, etsi ejusmodi arteriolas microscopium vix attingit.

Utcunque autem inconstans luminis trunci ad lumina ramorum ratio sit, tuto tamen ostenditur, arteriosum systema esse conum inversum, cujus apex in corde, basis in universi corporis minimis arteriolis sit *d*, ut magna inde summæ ramorum omnium ad truncum portio nascatur. Si enim valde modestos calculos posueris, & feceris divisiones ab aorta ad minimam arteriolam in corpore universo vigenis non plures, erit tamen, satis proxime, ratio omnium ramorum ad aortam, uti vigesima potentia numeri 3. ad vigesimam potentiam numeri 2. quæ ratio maxima est, multoque major, quam 20. ad 1. quam Vir Cel. posuit *e*, qui 23. divisiones sibi sumsit, aut altera, in qua idem vir Clar. quadraginta primos ramos aortæ unica octava parte aortæ trunco majores fecit

*d* Pitcarne de motu quo ci- acceler. & retard. Prop. I.  
bi n. 8. &c. Walther de sang. e Sauvag. de inflamm. p. 218.

*f.* Neque probari potest censura, quam Cl. Vir in *Comperianas* administrationes exercuit, quibus calculi Keiliani nituntur. Nimis enim dilatatos fuisse ramos objicit, quod debiliores sint *g.* Verum ramos omnino truncis suis robustiores esse ostensum est *h.* Et hæc omnia debent ex anatome definiri, nec ex retardatione sanguinis, quæ in minimis vasis esse creditur, neque certo cognita est, ad eorum vforum amplitudinem concludi.

Ultimæ arteriæ diameter facile definitur, quæ paulo major sit globulo sanguineo, paulo inquam, quum nonnunquam hi globuli ægre per arteriam minimam viam sibi aperire videantur: globuli sanguinei diametrum alibi dicemus.

### §. XIX. *Anguli ramorum cum truncis.*

Sequitur, ut de angulis dicam, sub quibus arteriæ dividuntur, & quorum non minima apud Cl. aliquos physiologos auctoritas est. Erit autem, cur profectores moneamus, quoties angulos istos volent metiri, ut intactis utantur vasis, neque cellulofam telam de arteriis solvant. Id enim si fecerint, mire mutatos habebunt angulos, neque naturam describent. Omnes autem anguli resectis, his frenulis majores fiunt, quod ea frenula vicina

---

*f* De pulsu p. 12.  
*g* p. 21.

*h* In hoc opere n. 14.



vasa ubique ad se invicem adducant & revinciant. Quare tabulæ anatomicæ, quæ fiunt ad mundata vasa, angulos fere omnes majores faciunt, quam quidem in vivo homine sint. Acutissimi illi anguli, qualem cum ductu cystico hepaticus intercipit, purgando in semirectos abeunt. Acuti, quales aortam inter & renales arterias aut intercostales, aut lumbales sunt, in rectos mutantur. Ex acutis etiam obtusi nasci poterunt, uti dicemus.

Ergo prima lex est, ut in omni divisione arteriæ ea propago, quæ major est, sit in directione trunci, ea vero quæ minor est, oblique de trunco exeat *i*. Deinde in universum plerique anguli, ad quos in corpore humano arteriæ dividuntur, rectis minores & acuti sunt, aut propriores rectis, aut frequenter semiacuti, aut denique peracuti, neque enim hi inventu rari sunt. Sed etiam in ipsis arborum foliis fere istiusmodi anguli in divisionibus vasorum, & nervorum, ut vocant, plerumque reperiuntur. Acuti sunt, sed magni, quos rami intercipiunt, quos aortæ arcus edit. Magni etiam, & paulo minores rectis, quos aorta cum intercostalibus & lumbaribus ramis efficit. Acutus, quo prædit phrenica, aut cœliaca, aut mesenterica. Acuto, sed grandiori, arteriæ renales nascuntur, peracuto sæpe, acuto

---

*i Martine Essays of a so-* 141. *Chefelden anat.* Ed. VI.  
*ciety at Edimb.* T. III. p. p. 195. 196.

to semper, spermaticæ. Acuto, pene semi-recto, angulo dividitur in iliacas aorta, & pari fere in hypogastricam, & femoralem iliaca secedit. Acuto pariter, & sæpe peracuto, magni rami femorales oriuntur, ut profunda femoris, tibialis postica, & peronea; aliæque plurimæ. Carotides arteriæ ad minimum angulum dividuntur, cum utraque adscendat. Minus acuti sunt anguli, quibus thyreoidea superior, lingualis, occipitalis prodeunt. Acuti etiam plerique ramorum faciei anguli sunt, aut brachii *l*.

Qui recti videntur, & pro rectis describuntur, plerumque prius, quam industria anatomici accesserit, rectis minores fuerunt, ne facris quidem anterioribus, aut tarfi arteriis exceptis.

Qui obtusi vulgo dicuntur, iidem etiam, dudum me monente *m*, deinde Cel. Ræderero *n*, in primis suis principiis acuti fuerunt, ut ex trunco quidem prodeant sub angulo cum ejus progressu acuto, deinde reflexi & retrogradi, utique contra trunci sui directionem revertantur. Ita reperio in umbilicalibus, epigastricis, intercostalibus aorticis, nutritiis femoris, ulnæ, radil, aliisque: etsi omnino, postquam cellulosa tela remota est, & hæ arteriæ obtuso angulo nasci videntur, & aliæ plurimæ, quæ in epi-

*l* Vide hæc omnia aut in *m* Comment. ad prælect. Eustachii Tab. 25. & 26. Boerhaav. T. II. p. 457. aut in nostra tab. art. Arter. *n* Thes. anat. med. n. 13. corp. tot.



physi tibiæ ex tibiali antica prodeunt *o*, quæ ex iliacis truncis ad renes revertuntur *p*, quæ ex truncis brachialibus secundum articulum cubiti versus humeros redeunt *q*, quæ ex trunco popliteo ad epiphyfin femoris *r*, adque ejus cum tibia articulum *s* dantur: quæ ex arcu profundo volæ *t*, aut plantæ *v*, ad carpum & tarsum regrediuntur. Maximi & vel obtusi, vel certe recti, videntur anguli ad originem spinalium anticarum *x*, arteriarum inferiorum cerebelli *y*, arteriarum coronariarum *z*.

Nullus omnino certus ordo angulorum est, ad quem de aorta truncisque suis prodeant, multumque dederunt hypothefi Cl. olim viri, quando ramos minores ad majores angulos oriri, majores ramos ad minores angulos nasci scripserunt *a*: aut quando ramos arteriarum minorum, cordi viciniorum, obtusos esse, inde sensim acutiores fieri, & in extremis finibus acutissimos adfirmarunt *b*. Vides enim maximum ad angulum prodire coronarias arterias, ad maximum intercostales, lumbales, ap-

*o* Tab. corp. tot. antic. I. N. X.

*p* Eustach. Tab. anat. XII. f. 10. 12.

*q* Icon. anat. fasc. VI. T. IV. delta, tau T. V. theta, tau.

*r* Tab. corp. tot. postic. tau chi.

*s* Ibid. 2. 7.

*t* Icon anat. fasc. VI. T. IV. 30. 31. 36.

*v* Icon. fasc. V. T. VI. f. 2. Delta maj. eta, theta, c.

*x* Icon. anat. fasc. VII. T. I. f. f. Ruysch. Epist. XII. T. XIII.

*y* Ibid. d. h.

*z* Ruysch. Epist. anat. IV. T. III. Recto tamen propior est, etsi obtusum angulum fecit Eustach. T. XV. f. 2. T. XVI. f. 1.

*a* Cheselden anat. of hum. body Edit. VI. p. 195.

*b* Cantwell Ergo secret. div. versitatis causa multiplex.

pendicales, sed ad exiguum feminales, ad minimum angulum facram mediam: verum paulo post iterum ad permagnos angulos facras laterales, quas aliæ, perminutis angulis natæ excipiunt, aut circumstant, de pelvi prodituræ, iliaca posterior, ischiadica, hæmorrhoeidea.

Si minorum arteriarum angulos requisiveris, iterum plerisque acutos reperies, perinde ut in magnis, & acutissimos quidem alios, alios grandiores, semirectos & ultra. Qui vero rectos omnino angulos in minutissimis arteriis musculorum *c*, & vesiculæ felleæ *d* descripserunt, cum eorum quidem experimentis neque mea consentiunt, neque *Ruyschiana e*, neque *Leeuwenhoeckiana* demum, in quibus perinde plerisque minimorum vasorum angulos acutos esse, & aliquos etiam obtusos recte exprimitur. Verum rectius videtur de his retibus arteriosis, eorumque angulis, in libro VII dici, quo de secretionem agemus.

## §. XX. Flexiones.

Nunc etiam de flexionibus arteriarum dicendum est. Frequentissime autem arteriæ, quas sebo repleveris, flexuosæ sunt, etiam de quibus non cogitares, artuum arteriæ, interossea v. c.

---

*c* Hales *Hæmastat* p. 59. *e* Confer vesiculæ felleæ re-  
*Parsons* in *supplem. transact.* te arteriosum, valde certe  
*philos.* ad. T. 43. T. I. f. 4. acutangulum, pictum in *Epi-*  
*d Hales* l. c. p. 150. 151. *stola* IV. T. V. f. 4. *The-*  
*saur. anat.* IX. T. IV. f. 1.



utraq̃ue, tibialis *g*, peronea *h*, plantaris *i*, tibialis anterior *l*, radialis, ulnaris *m*, vertebralis *n*, hepatica *o*, spinales *p*, oculares *q*. Ita post curatum aneurysma & ligatam arteriam brachii, cum ramus aliquis minor trunci nunc dignitatem consecutus sanguinem omnem a corde ad manum veheret, is ramus mire flexuosus factus est, qui prius rectus erat. Ita uteri arteriæ in virguncula rectæ, in femina nunc adultæ flexuosæ sunt. Videtur autem hæc repletio fere eum statum restituere, qui est in arteriarum diastole: quare etiam in vivo homine, vivoque animale, eas arterias alterne flexas esse credibile videtur, neque repugnant, quæ in vivorum animalium incisionibus vidi. Quando vero eædem arteriæ inanes reperiuntur, uti fere in cadaveribus fit, tunc eædem rectæ fiunt, & eandem rectitudinem recuperant, quando filis cellulosis solvuntur. Rectas ergo, ut mundatas, fere pingunt anatomici *r*, ego, quantum potui, naturam imitatus sum.

Aliquæ tamen arteriæ peculiariter flexuosam directionem amant, ut etiam inter anatomicos ea undulata natura nota sit. Et primo flexuosæ sunt eæ arteriæ, quæcunque per mem-

*g* Icon. anat. Fasc. V. T. V.

*h* Ibid. T. V.

*i* Ibid. T. VI. f. 2. p.

*l* Ibid. T. IV.

*m* Fasc. VI. T. III. e. & Tab. V.

*n* Fasc. II. T. art. thyr.

*inf.* II.

*o* Fasc. II. Tab. art. cæliac. I.

*p* Fasc. VII. T. art. medull. spin. utr.

*q* Fasc. VII. Tab. art. ocul. f. 2. 3.

*r* Et princeps Eustachius.

branam, perve viscus incedunt, cujus mutabilis magnitudo sit, ut per conditiones vitæ humanæ variatas eas arterias modo longiores fieri necesse sit, modo breviores. Ita flexuosæ sunt arteriæ labiorum coronariæ *s*, arteriæ uterini *t*, intestinorum, & inprimis crassorum, iridis, umbilicalis funiculi. Labia enim modo constringuntur, in summam brevitatem, quando os aut sugentes aut sibilantes claudimus, modo insigniter extenduntur, dum oscitamus, aut ridemus. De utero notum est, rectiores fieri, quando in graviditate extenduntur. Crassa intestina a fæce alvina, & a flatibus mire distenduntur, & in motu peristaltico adeo accurate arctantur, ut spinulas piscium & aciculas devoratas promoveant. Iris ad lucis varietates laxior fit strictiorve. Umbilicalem funiculum in vario fetus situ necesse est modo longius a placenta recedere, modo proxime ad eandem redire. Eodem modo flexuosa arteria splenica *v*, cum liene suo & cum ventriculo, cibo flatuque distento, longius ab origine sua in sinistrum hypochondrium educitur, brevior alias immotæ origini manet vicinior. Idem de linguali arteria verum est *x*, quæ una cum lingua aut longius de ore exit, aut retrahitur vicissim, breviorque fit, & de gastroepiploica *y*, quæ ventriculi dimen-

*s* Fascic. III. T. II.

*t* Fascic. IV. T. I. *pelv.*

*v* Fascic. II. Tab. art. cæl.

II.

*x* Fasc. III. T. I. Z.

*y* Fasc. II. Tab. Cæliac. I.



siones sequitur, & de bronchialibus, quæ ad pulmonis extensionem flexus paratos nactæ sunt  $y^*$ .

Facile vero finis fabricantis naturæ perspicitur. Arteria flexa omnino multo longior est, quam ea recta linea, quæ ab initio arteriæ ad finem per medias flexiones transit, & arteriæ longitudinem metitur, si ea recta foret; potest adeo arteria flexa, quoties ejus finis a principio removetur, absque ullo incommodo & longior reddi, dum gyri a se invicem recedunt, & arteria totam longitudinem suam explicat, quæ nunc exporrecta distantiam terminorum metitur. Est enim ea harum flexionum constans indoles, ut arteria circa lineam imaginabilem decurrat, supra quam alterne elevatur, infraque eandem vicissim deprimitur. Plethora, & injectio anatomica, has flexiones augment. Arteriæ cerebri, dum inanes sunt, pene rectæ videntur; eadem repletæ flexuosæ fiunt. Quæ vero arteriæ etiam inanes flexuosæ sunt, eadem repletæ ad angulos minores incurvantur, si interim ea pars corporis animalis, cui incumbunt, longitudinem suam non mutaverit. Alia flexionum causa est, quando arteria se ad ossium intervalla accommodat, ut in maxillari interna  $a$ .

$y^*$  Fasc. III. Tab. art. quæ in Tomo VI. collectionis nostræ recusa est p. 172.

$z$  Conf. Cl. viri J. Zachariæ Petsche obs. angiologicas a Fascic. II. T. art. maxill. in disputatione inaugurali,

Non repugnat ruptionem arteriarum & hæmorrhagias per has ipsas flexiones caveri.

Aliud genus flexionum est, quando magni arteriarum trunci subito bis terve in seipso magnis anfractibus replicantur, ut eadem arteria, cum seipsa, duos tresve angulos acutissimos intercipiat. In parvis arteriis vix exempla sunt, sed in magnis arteria carotis *b* sub cranio insignem anfractum efficit, cujus tres, quando paucae, directiones sunt: alium anfractum partim sub atlante, partim in ejus fulco vertebralis arteria *c* percurrit. Has etiam flexiones cellulosa tela facit, evanituras, si eam abstuleris.

### §. XXI. *Anastomoses.*

*Anastomoses* nunc dicemus, sive arteriarum inter se conjunctiones, quæ fiunt aut duobus truncis in unum coeuntibus, aut ramo intermedio duos truncos conjungente. Harum unionum paucae olim cognitæ fuerunt, nunc, postquam anatome, & repletio ceracea frequentius exercetur, in toto corpore humano vere unus consensus & una conspiratio detecta est.

Duo trunci majores in unum ad acutum angulum confluunt in fetu, quando arteriæ pulmonalis productus truncus cum aorta in unam

---

*b* Comper apud Drake T. icon. anat. II. T. art. thyreoid. inf. Hebenstreit de flex. XX. n. 13.

*c* Idem ibid. n. 15. Fasc. art. p. 14.



arteriam dorsalem confluit *d*. In avibus ex arteria pulmonali duo, non unus, ductus arteriosi in aortam descendunt, & alter post alterum inferitur. In piscibus frigidis duo aortæ trunci in descendentem aortam uniuntur. In homine porro arteria parietalis, minor equidem, coalescit ex ramo arteriæ temporalis, & ex alio ramo arteriæ occipitalis, in trunculum, qui per foramen parietale furculum in duram cerebri membranam mittit *d*\*. Vertebrales arteriæ, notissima in ponte Varoliano unione, in unum communem truncum conflunt. Aliud, inter minores trunculos, exemplum est in arteriis spinalibus anterioribus. Nam etiam istæ unicum in trunculum in principio medullæ spinalis abeunt *e*.

Frequentius est, duos truncos uniri quidem, ita tamen, ut e diverso sibi occurrant, atque finis angustior prioris arteriæ in angustiore pariter finem alterius ita continetur, ut contraria fluenta sanguinis sibi obviam eant. Ejusmodi arteriæ mesentericæ superioris, ejusque rami colici medii, cum ramo adscendente mesocolicæ sinistræ arteriæ arcus est *f*, ab Angliæ incisforibus dudum laudatus. Verum is unus est ex multis. Nam ejusmodi arcus ægre numerabiles ab ipso ventriculo ad ultimum intestinum usque reperiuntur. Et primo gastroe-

*d* Duverney *Mémoire de l'Acad. Roy. des Scienc.* 1699.

*d*\* Janke *for. valv.*

*e* *Icon. med. spin. anter. in fascic. VII.*

*f* *Fascic. icon. anat. III. Tab. art. mesent. 3. 6.*

piploica dextra finistræ occurrit *g*: tunc dex-  
 træ furculi cum pyloricis, hæ cum pancreatico  
 duodenali *h*, duodena superior cum eadem,  
 quam nunc dixi *i*, arteria, ea vero cum me-  
 fentericæ ramo pancreatico *k*, iste cum primo  
 jejunum adeunte intestinum ejusdem trunci  
 ramo *l*, hic cum altero, sic reliqui jejunales  
 & iliaci inter se mutuo *m*, horum ultimus  
 cum ileocolica *n*, ista cum colica dextra *o*,  
 hæc cum media *p*, ista cum mesocolica *q*, ejus  
 majores rami inter se invicem *r* perpetuos ar-  
 cus faciunt, dudum mira industria ab *Eustachio*  
 delineatos *s*. Ejusdem indolis arcus sunt, qui  
 in ventriculo coronariam dextram cum sinistra  
*t*, in manu ulnarem & radialem, tum sub  
 cute & ligamento palmari *v*, tum in ossibus *x*  
 transversis conjungunt, & similis alter arcus  
 profundus plantæ, quo tibialis anterior in plan-  
 tarem externam continuatur *y*. Similis iterum  
 arcus facras laterales cum media *z*, corona-  
 riam labii superiorem *a* & inferiorem *b* dextram

*g* Fascic. icon. anat. II.

Tab. celiac. I.

*h* Ibid. T. II. c. c.

*i* Ibid. not. q. f.

*k* T. II. f.

*l* Fascic III. not. 6.

*m* Eustach. T. XXVII. f.

2. 4.

*n* Fascic icon. III. 1. 2. 2.

*o* Ibid. x. y.

*p* t. u.

*q* Ibid. 3. 6. 5.

*r* Ibid. 7. 9. 15. 14. II.

*s* l. e.

*t* Tab. celiac. I.

*v* Fasc. icon. VI. T. III.

e. t. chi & in tab. corp. tot.  
anter.

*x* Ibid. Tab. IV. a 9 ad  
44. & in tab. cor. tot. anter.

*y* Fasc. V. T. VI. f. 2. mi  
& in tab. corp. tot. post.

*z* Fasc. IV. fig. V.

*a* Fasc. III. tab. art. faciei

K. K.

*b* Ibid. V. & tab. corp.  
tot. anter.



cum sinistra, uterinas dextras cum sinistris *c*, iliacarum posticarum diversos ramos *d*, & infrascapularium *e* ramos, & tarseas utraque conjungit. Sunt etiam alii, arcus uterque *f* arcus digitorum pedis & manus in digitorum apice *g*, aliique innumerabiles. Circulum integrum arteriæ choriodeæ inosculatæ efficiunt *h*.

Hi frequentes arcus, quibus dextri trunci cum sinistris late coalescunt, faciunt, ne possis nuperorum mediastinum, duasve corporis humani distinctas medietates admittere. Id unum in ea hypothese verum est, quod in vertebris inque sterno, anastomoses dextra inter & sinistra vasa angustiores sint, interque minores ramos, ubique tamen innumerabiles sunt, & in osse sacro latiores.

Verum etiam istis conjunctionibus frequentior est altera species, quæ fit ramo minori trunci insignioris, cum ramo pariter minori alterius grandis trunci coeunte. Hæc fabrica adeo vulgaris est, ut omnino nulla in corpore humano arteria sit, quin cum vicinis arteriis numerosis furculis communicet, qui ex ea arteria orti, cum ramis vicinorum trunculorum conjunguntur. Infinita res foret ire per omnia, quare majora & illustriora exempla delibasse suffecerit.

*c* Swammerdam *miracul. natur.* T. II.

*d* *Tab. corp. tot. postic. fasc.* IV. not. 9.

*e* *Fascic.* VI. p. 13. T. II. f. 2. O.

*f* *Fasc.* VII. *Tab.* VI. f.

I. g. c.

*g* *Fascic.* IV. T. VI. f.

12. *Fascic.* V. fig. 6.

*h* *Fascic.* VII. T. VI. f. 6.

Ergo arteriæ cerebri profundæ a vertebra-  
libus natæ, cum arteriarum carotidum ramis  
posterioribus, insignibus duobus furculis con-  
junguntur *i*, quam unionem *Willisii circulum*  
vocant. Brevis etiam, sed luculentus ramus,  
duas carotidum anteriores propagines *k*, & si-  
milis alter duas arterias umbilicales in fine fu-  
niculi *l* unit. Celebres etiam, ob chirurgicos  
usus, arteriæ sunt, quæ a radiali *m*, ulnari *n*,  
& interossea posteriori *o* recurrunt *o*\*, cumque  
variis arteriæ profundæ humeri *p*, alteriusque  
anastomotici humerariæ rami *q*, propaginibus  
inofculantur. Minus notæ sunt similes  
conjunctiones, quæ sunt inter arterias a  
tibiali anteriori *r*, & posteriori *s* recurren-  
tes, & arterias articulares genu superiores *t*,  
de poplitea natas. Insignes etiam, certe fre-  
quenter, conjunctiones, inter occipitalem ar-  
teriam, & vertebralem, prope atlantem *v* in-  
tercedunt.

Minores alias, aut nobiliorum trunculo-  
rum, aut nondum notissimas inofculationes

- i* Fasc. VII. T. I. phi phi  
*k* Ibid. Lamda maj.  
*l* Comment. ad prælect. T.  
V. P. II. p. 294.  
*m* Tab. corp. tot. post.  
dext. t.  
*n* Fasc. VI. T. VI. eta Tab.  
corp. tot. post. delta.  
*o* Fascic. VI. T. VI. tau  
Tab. corp. tot. post. figma.  
*o*\* Vide has arterias in  
Trewii lib. de aneurysmate  
apud Ludwig de varietat
- vasor. Pohl. obs. angiolog.  
de arter. White cases. Journ.  
de medec. XXIX. p. 456.  
*p* Fascic. VI. T. VI. chi  
Tab. corp. post. r. t. u. x. y.  
*q* Arter. corp. tot post. alpha.  
*r* Tab. arter. corp. tot. ant.  
sin. beta.  
*s* Art. Poster. Tab. 15. 16.  
*t* Ibid. Tab. ant. p. P.  
*v* Fascic. II. in thyroid.



paucis verbis recensebimus. Ergo in capite inter arterias cerebelli superiores & inferiores  $\alpha$ , circa vermem: inter ophthalmicas & frontales  $\gamma$ , nasales  $\zeta$  a labiali natas, temporales  $a$ , infraorbitales  $b$ : tum inter infraorbitales & buccinatorium ramum arteriæ maxillaris internæ  $c$ , & earundem cum labialibus  $d$  anastomoses sunt.

Porro maxillaris inferior cum labiali  $e$ , & mentali  $f$ , auriculares anteriores cum posterioribus  $g$ , temporales cum occipitabilibus  $h$ , hæ cum vertebralibus  $i$ , cum cervicalibus  $k$ , cum thyreoideis  $l$ , arteriæ medullæ spinalis cum vertebralibus  $m$ , thyreoideis inferioribus  $n$ , cervicalibus aliis  $o$ , intercostalibus  $p$ , lumbalibus  $q$ , sacris lateralibus  $r$ , coccygeis  $s$  varie conjunguntur.

Ita in collo & trunco corporis humani

$\alpha$  Fascic. VII. T. II. prope C.

$\gamma$  Ibid. n. II. p. 52. Fascic. III. Tab. faciei. 8. 19.

$\zeta$  Fasc. VII. Tab. VI. f. 1. Z. Fascic. III. Tab. fac.

$a$  Fasc. VII. l. c. e hh. Fasc. III. l. c. y.

$b$  Fascic. VII. Q. X. Y. Fascic. III. ih. 3.

$c$  Tab. corp. tot. ant. pi.  $d$  Ibid. kappa lamda.

$e$  Fasc. III. T. art. faciei Q. P.

$f$  Ibid. Q. 36.

$g$  Ibid. 22. 23. Delta maj.

$h$  Ibid. p. 28. not. 24.

$i$  Fascic. VIII. p. 58. 59.

$k$  Fascic. VIII. p. 59. Fascic. II. not. b.

$l$  Fascic. II. Ibid.

$m$  Tab. art. med. spin. ant. & post.

$n$  Tab. art. thyreoid. inf. II. & tab. med. spin. ant. K. postic. V.

$o$  Tab. art. med. spin. ant. Q. l. m. n. r. post. rho, chi, omega.

$p$  Ibid. ad varias non omnes tamen costas.

$q$  Ibid. 86. 91. 94. 97. 101. 105.

$r$  Ibid. 107. 108. 113. 114. 115. 119.

$s$  Fascic. IV. T. III. o. p. not. 9. II.

huc refero conjunctiones thyreoidearum inferiorum, & scapularium *t*: Arteriarum mammæ ex diversis truncis naturam inter se *v* mutuo, mammariarum cum thoracicis externis *x*, & intercostalibus *y*: earum cum thoracicis externis *z*, epigastricis *a*, lumbalibus *b*: mammariarum cum epigastricis *c*, quæ unio immerito majorem, quam aliæ etiam insigniores anastomoses, famam obtinuit, neque recte pro invento præcipuo *Josephi Exuperii Bertini*, viri aliena laude non indigi, citata est *d*, cum adeo dudum & in vulgus nota sit.

Deinde in eodem corporis trunco phrenicæ cum ramulis subclaviarum *e*, cum mammariis *f*, cum lumbalibus *g* & intercostalibus *h*, cum hepaticis, cum alterni trunci furculis *i*: intercostalis suprema a subclavia nata cum iis intercostalibus, quas aorta generat *k*, & cum bronchialibus *l*; hæ cum thyreoidea inferiori *m*, cum œsophageis *n*, cum pericardiacis *o*, cum

*t* Fascic. VI. T. li. f. 2. 43.

*l* f. c.

*v* Ibid. T. 1. m. n. o. p.

*q*. r. s. t.

*x* Ibid. OE. o: 1. p. n:

8. E: 4. lamda lamda, kappa

kappa 7. kappa kappa, lam-

da lamda 8. 9. ni ni 12. rho

rho 13.

*y* 14. phi: 15. chi: 20. pfi

maj. 21. omega 22. Theta

maj. 24. lamda maj. 25.

*z* Ibid. n. l. alpha F. 5.

ypsil. &c.

*a* Ibid. P. 46. Phi maj. 46.

Pfi maj. 43.

*b* Ibid. Omega 43. Omega

*c* Ibid. 30. 30. 45.

*d* *Interprétation de la nature* p. 172.

*e* Fascic. III. Tab. art. pect. not. 7.

*f* Fascic. VI. p. 8.

*g* Fascic. III. Tab. art. ren. & phren. p. 55.

*h* Ibid.

*i* p. 54.

*k* Fascic. VIII. & Tab. art. thyroid. anter. in fasc. II.

*l* ibid. & fasc. III. p. 36.

*m* ibid.

*n* Fascic. VIII. p. 21.

*o* ibid.



coronariis *p*, cum pulmonalibus *q*; spermaticæ cum intestinalibus *r*, epigastricis *s*, hypogastricis *t*, uterinis *v*, hepaticis *x*: epigastricæ cum uterinis *y*; vesicales cum arteriis penis *z* aut clitoridis *a*; intestinales anteriores & posteriores inter se invicem *b* in convexitate intestini, cum hæmorrhoidæis mediis *c*; sacrae laterales inter se invicem *d* omnino uniuntur. Sic dextra arteria penis aut clitoridis cum sinistra *e*, sacrae cum ischiadicis *f*, lumbales cum sacris *g*, cumque iliolumbali *h*, & cum abdominali *i*, ischiadicæ cum arteriis circumflexis a femorali natis *k*, iliaca posterior cum iisdem *l*, obturatoria cum femoralibus *m* anastomoses habent.

Iterum tibialis posterior variis locis cum anteriori *n*, & cum peronea *o*, ejusque diversi rami inter se *p*; tum peronea cum tarsea

*p* Fascic. III. p. 36. Fascic. VIII. p. 21.

*q* Fascic. III. p. 37.

*r* Fascic. III. hist. art. mesenter. p. 48.

*s* Fascic. IV. in hist. ejus art.

*t* Secundum ductum deferentem.

*v* Fascic. IV. in hist. art. uteri.

*x* Fascic. VIII. p. 33.

*y* Fascic. V. p. 8.

*z* ibid. not. 12. 16.

*a* ibid. Tab. I. Zeta.

*b* Fascic. III. p. 48.

*c* Fascic. IV. not. 17. Tab. corp. hum. post. p. 37.

*d* Fascic. IV. Tab. V.

*e* Fascic. IV. not. 19.

*f* ibid. in hist. art. ischiad. not. 11.

*g* Fascic. VIII. p. 72.

*h* ibid. fascic. IV. not. 8.

*i* Fascic. V. p. 9.

*k* Tab. corp. hum. post.

sin. i. p. q. r. s. Fascic. IV. not. 11. Fascic. V. T. III.

delta, kappa.

*l* ibid. T. VIII. delta e, ypsil.

*m* Fascic. IV. not. g. fasc. V. T. II.

*n* Fascic. V. p. 29.

*o* ibid. p. 58. Tab. corp.

tot. post. sin. 48.

*p* Tab. corp. tot. ant. H. M. E.

a tibiali antica nata *q*, cumque plantaribus *r*; arteriæ plantæ variorum truncorum inter se *s*, & cum arteriis tarfi *t* infinitis modis conjunguntur.

In brachio majores anastomoses sunt scapularium inferiorum cum supernis *v*, inferiorum inter se invicem *x*; circumflexarum posteriorum cum profundis *y*; interossee posterioris supremæ cum infima *z*; ejus infimæ cum arteriis digitorum *a*, cum ulnari arteria *b* & radiali *c*; digitalium internarum & externarum inter se *d*, & aliæ, innumerabiles, quemvis lectorem fatigaturæ, si in unam paginam conjicerentur.

In minoribus ramis inosculationes adeo frequentes sunt, ut eas enumerare frustra susciperemus. Certe plurimis in corpore humano locis, in membranis omnibus, in musculis omnibus, in corde *e*, in utero, in ovariis *f*, in glandulis conglobatis *g*, in pulmone ar-

- |   |   |
|---|---|
| <i>q</i> ibid. T. IV. alpha <i>T. corp.</i>   | <i>corp. post. dextr.</i>                 |
| <i>tot. ant. x.</i>                           | <i>b</i> ibid. A. B. <i>Tab. corp.</i>    |
| <i>r</i> ibid. T. VI. f. 2. delta <i>c.</i>   | <i>post. 4. 7.</i>                        |
| <i>Tab. corp. tot. post. 58.</i>              | <i>c</i> ibid. D. <i>Tab. corp. po-</i>   |
| <i>s</i> ibid. <i>Tab. corp. postic.</i>      | <i>ster. 4. 5.</i>                        |
| <i>dextr.</i>                                 | <i>d</i> In vola T. <i>quinti fascic.</i> |
| <i>t</i> ibid. T. V. theta, omega,            | <i>quinta 51. 53. 54. &amp;c. in</i>      |
| <i>ypsil.</i>                                 | <i>dorso T. VI. in pede T. VI.</i>        |
| <i>v</i> <i>Fascic. VI. Tab. II. Z.</i>       | <i>f. 1. 2. &amp; in Tab. corp. an-</i>   |
| <i>b. d. Tab. corp. tot. post.</i>            | <i>ter. 5 post.</i>                       |
| <i>dextr. 3. a.</i>                           | <i>e</i> <i>Ruyssch Thesaur. IV. T.</i>   |
| <i>x</i> ibid. in f. 1. & 2. <i>Tab. III.</i> | <i>f</i> <i>Fascic. anat. II. Tab.</i>    |
| <i>corp. post. m.</i>                         | <i>uteri.</i>                             |
| <i>y</i> ibid. T. VI. l. <i>q.</i>            | <i>g</i> <i>Ruyssch in figura ad Epi-</i> |
| <i>z</i> ibid. ch. 2. <i>Tab. corp.</i>       | <i>stolam de glandul. fabric. ad-</i>     |
| <i>post. dextr. c. t.</i>                     | <i>jecta.</i>                             |
| <i>a</i> ibid. p. &c. & in <i>Tab.</i>        |   |



teriæ *retia* efficiunt, celebratum a *Malpighio* *h*, & a *Laurentio Bellino* *i* nomen. Nempe trunculus arteriosus quilibet bifurcatus utroque suo ramo aliis duobus furculis vicinarum arteriolarum se immittit; ut in tota, quam late patet, pia membrana cerebri, aut in integro periosteo humeri *k* femorisve *l*, nullus sit ramulus, ad quem ex omni alio ramulo ejus membranæ libera via non sit. Varias horum retium figuras ad librum VII. differimus, quo de secretionem agetur. In visceribus alia *m* fere fabrica est, ramique arteriosi magis paralleli, aque mutuo nexu liberi incedunt, neque perinde arteriolæ vicinis arteriolis inosculantur, exemplo renum, lienis, corticis cerebri: sed de istis eodem loco agetur.

### §. XXII. Fines. I. Venæ.

Superest, ut arteriarum, de quibus hactenus egimus, fines ostendamus ultimos: varii autem ii sunt, eorumque alii aliis evidentiores. Primus & frequentissimus est, quo arteriæ in venas continuatæ mutantur. Hæc terminatio antiquis medicis pene ignota fuit, cum venas inter & arterias spongiosum, & compactum sanguinem interposuerint, in quem sanguis

*h* De pulmonib.

*i* De ferment. & gland.  
Prop. 38.

*k* Fascic. anat. VI.

*l* Fascic. V. p. 12.

*m* Boerhaave prælect. T. II.

p. 13.

sanguis arteriosus effunderetur. Hoc *parenchyma* scholæ ab *Erasistrati* sectatoribus *n* absque ulla refragatione receperunt. Hepar totum quasi sanguinem congelatum esse *Aretæi* vox est *o*, & altera, renes similes esse *haimalopi* *p*. *Galenus* innumeris locis ea voce usus est, de jecore, pulmone, rene, liene *q*, aliis visceribus. Non ideo ignorabant veteres, ab arteriis in venas sanguinis commercium intercedere, eoque evadebant medici de *Erasistrati* schola, quoties in vivis animalibus de incisa arteria sanguinem confestim effluere *Galenus* objiciebat *r*. Sed & ipse *Galenus* minime istam vasorum communionem negabat, & phlegmonem a sanguine ex venis in arterias elapso explicabat *s*. Neque multa addiderunt recentiores scriptores, aut *Baughinus* *t*, aut *M. Aurelius Severinus* *v*, quando vasa corporis animalis ubique anastomosi conjungi docuerunt, non satis manifestis experimentis usi. Solebant autem in hepate, satis ruditer *excarnato*, ejusmodi anastomoses ostendere *x*, crassasque etiam arteriarum & venarum conjunctiones, tamquam rem certam recipere, quales sunt rami venosi arteriæ, post sanatum aneurysma transversim

*n* Apud *Galenum* administr. anat. L. VI. II.

*o* Curat. acut. L. II. c. 6.

*p* ibid. c. 9.

*q* Method. med. L. X. C. II. nempe in jecore, renibus, liene, pulmone.

*r* Quod sanguis natura in arter. contineatur.

*s* De usu part. L. VI. c. 17.

*t* Theatr. anat. p. 48.

*v* In Anatome Phocæ.

*x* J. Casserius in Tab. VIII. Lib. VIII. f. 2. G.



inferti *Johannis Riolani* *y*, aut communicationes illæ conspicuæ arteriarum venarumque spermaticarum, a *Leale Leali* propositæ *z*, a *Cromwello Mortimer* confirmatæ *a*, ab *Albino* *b* nobisque *c* rejectæ. Contra optimus *Harveyus*, difficilis ad ea credenda, quæ non videbat, anastomoses sensibus patentes arteriarum & venarum dari negavit *d*; & sanguinem vasa inter utriusque generis effusum *Joh. Pecquetus*, *Harveianorum* experimentorum imitator, retinuit *e*. Proxime ad eam ætatem *Georgius Ent*, etsi perinde fatebatur, non posse manifestas has arteriarum venarumque anastomoses ostendi *f*, negavit tamen spatium inter arterias venasque medium dari *g*, & liquorem arteriæ injectum per venam & cito & libere transire vidit *h*: addidit etiam hypothesein, arteriam in venam oblique ita subire, ut vena sub insertione paulo ultra in uncum producat *i*.

Primus continuitatem cum venis, microscopii ope, in ranæ vesica urinaria manifesto visam, confirmavit *Marcellus Malpighius* *k*. Deinde *Edmundus King* parenchymatis loca mera vascula in viscerum carne recepit, pro-

*y* Respons. ad *Harvei*. p. 53.

*z* De spermatic. organ.

*a* Phil. Transf. n. 415.

*b* Apud *Cl. Moers* in disp. de nutritione.

*c* Comment. Boerb. T. V. P. 1. p. 281.

*d* Diff. II. p. 204.

*e* Diff. anat. C. V.

*f* Apolog. pro circul. sang. p. 160.

*g* p. 249.

*h* p. 145. in vena axillari.

*i* p. 150. 151.

*k* In Eph. II. de pulmonib. quæ anno 1661 prodiit.

priis experimentis usus *l.* *Ruyschius* sanguinis in spongiam arteriarum finibus circumpositam effusionem experimento refutavit, quo constat, sebum in cellulofam telam elapsum in massam informem confundi, qualem ipse post felicem suam repletionem non reperiēbat. Deinde non fieri posse, ut filo continuo sebum ex arteriis in venas transeat, si spatium spongiosum intercederet, in quod potuisset se diffundere, *Idem* adjecit *m.* Posterioribus tamen experimentis bonus senex tantum tribuit, ut sanguinem iterum halitus modo in tomentosam partium corporis animalis substantiam diffundi persuaderetur *n.*

Non ideo parenchymatis causa deserta fuit. Nam *Johannes* quidem *Mayow* o hactenus eam ornavit, ut arteriam in vesiculam desinere scriberet, a qua vena oriretur. Eam hypothesin recepit *Josephus Duverney* *p.*, & paulo aliter *G. Christophorus Schelhammer* *q.* ita reformavit utriusque generis vasorum anastomosin, ut per foramina quædam transitus liber esset, quale illud inter utramque cordis auriculam celeberrimum est, quod ovale dicitur. *Theodorus* etiam *Kerkring* *r.*, frustra *Ruyschianis* usus præ-

*l* *Phil. Transact.* n. 18. anni 1666. & 52.

*m* *Epist. anat.* III. p. 28.

*n* *Thesaur.* IV. n. 96. fin.

*Thesaur.* VI. sub finem. *Thesaur.* X. n. 35. *Thesaur. max.*

n. 19. 112. *Advers.* I. n. 6.

II. n. 8. *Epist. probl.* XVI.

*o* *Oper. omn. belg.* ed. p. 307.

*p* *Memoir. de l'Acad. des scienc. avant 1699, T. I. p. 281. Exemplum lienis & pulmonis citat.*

*q* *Physiolog.* p. CLXV. CLXXI.

*r* *Spicileg. obs.* 8.



*parationibus*, ob flatum ex arteriis in venas non transeuntem, continuitatem horum vasorum rejecit. Sed etiam *Stablius* s cellulosa fibrarum interstitia inter arterias venasque restituit, in quibus aut stagnaret sanguis, aut certe lente transflueret, uti ex usu foret animæ, quæ eas fibras suo arbitrio regeret: ita fieri, ut modo majori copia sanguis transmittatur, modo parcius transeat, uti anima aut laxet ea intervalla, aut adstringat. Eam hypothesin non dudum *Johannes Junker* t eo inprimis argumento confirmavit, quod ex ea fabrica varia corporis animati phænomena facilius exponantur. Verum etiam melior omnino anatomicus *Johannes Bohn* v, cum vidisset liquorem in arteriam impulsam per venam non redire, & poros cellulasve muscutorum prius replere, ad parenchyma rediit: eademque *Petro Senac* x ratio persuasit, ut intervalla aliqua admitteret.

Ediderat tamen interim *Antonius van Leewenhoeck* epistolas suas, post quas non videbatur dubio locus fore. Illiteratus nempe homo, in usu vero lentium vitrearum peritissimus, & eo magis persuasurus, quo minus erat ipsi hypothesium, quas ornaret, in piscibus, aliisque aquaticis animalibus, pellucida cute

---

s *In Historia temperamentorum, diss. de motibus humor. spasmodicis, Mechanismo motus progressivi sanguinis.* t *Conspect. Physiolog.* p. 184.  
 x *Diff. de hæmoptys.* p. 17.  
*Circul. anat. physiolog.* p. 99.  
 100.  
 x *Essays de physique* edit. 1735. p. 460.

obductis, manifesto vidit, arterias venis continuari, & quidem, in caudis piscium potissimum, incurvatam arteriam in venam abire, quæ contrario ductu versus cor redeat: esse vero ejusmodi arteriolam unius y globuli sanguinei alias capacem, alias duorum, triumve z. Hanc conjunctionem arteriarum cum venis ipse etiam in cobitide aculeata vidi a. Alter modus, quo arteriæ cum venis junguntur est ejusmodi. Arteria venæ fere parallela decurrit, in caudis enim piscium ipse officulorum situs vasorum iter definit. Ab arteria ramuli exeunt, iterum unius, duorumve globulorum latitudine, qui in venam inserti b, per eam globulos suos versus cor revehunt, aut plures etiam arteriolæ in unicam venam confluunt c. Etiam hoc genus anastomoseos in ejusmodi animalibus vidi d. Similia viderunt Cl. viri Johannes Bernoullius e, Guil. Cowper f, Marcellus

- 
- y *Arcan. natur. detect.* sive operum omnium latine editorum T. II. p. 160. f. A. B. C. p. 168. f. 10. conf. etiam p. 183. 185. & in *continuat. arcanorum naturæ* sive Tomo operum III. p. 52. 110. f. 1. Adde G. Cowper in *phil. transf.* n. 280. f. 45. App. ad *Bidl.* T. III. f. 4. Baker *microscope made easy* p. 124. 126. 136. T. X. f. 2.
- z A. v. *Leeuwenhoek* T. II. p. 175. 177. f. 1. p. 183. T. III. p. 116. Cowper l. c. *Chefelden anat. of human bod.* T. 30. f. 2.
- a *Second Memoire sur le mouvement du sang* Exp. 62. 63.
- b *Leeuwenhoek* T. II. p. 178. f. 1. p. 183. f. 14. p. 185. f. 15. p. 186. f. 16. 17. T. III. p. 52. & ic. p. 223. f. 7. Cowper in *append. ad Bidloi anat.* T. III. f. 4. 5. *Chefelden* l. c. *Hales hæm. stat.* p. 58.
- c *Leeuwenhoek* T. II. p. 161. T. III. p. 119. Baker p. 121. T. X. f. 1.
- d l. c. *Exp.* 59. 62. 63.
- e *De nutritione* n. 8.
- f l. c. & in *Phil. Transact.* n. 285. in pulmone ræ.



*Malpighius g*, *Stephanus Hales h*, *Henricus Baker i*, & tot alii egregii in experiendo viri, ut omnia experimenta repetiisse supervacaneus labor sit. • Nuper demum *Lazarus Spallanzani* hæc suis experimentis confirmavit. Vidit in animalibus frigidis, modo plusculas arterias in unam venam confluere: modo, & in branchiis salamandræ aquaticæ, arteriam reflexam in venam abire unici globuli capacem: in cauda salamandræ alias arteriam venæ parallelam in eam transversos ramos mittere, & ramulum arteriæ in venulam reflexum abire. Vidit sanguinis modo unicum globulum ex rubra arteria in primam venam transire: modo quatuor & quinque globulorum capax vasculum ab arteria in venam continuari.

Cum præterea magis atque magis ars replendorum canalium corporis animalis innotesceret, etiam ad continuitatem arteriarum cum venis stabiliendam experimenta facta sunt. Nempe oleum terebinthinæ, sebum, cera, sæpe etiam aër & aqua, facile & celeriter, fere in omnibus corporis partibus, de arteriis in venas transeunt. Primum reperio *Dominicum de Marchettis* aquam de arteria in venam urfisse. Inde *Regnerius de Graaf* in capite & crure eadem expertus est, liquoribus coloratis & cera usus *k*. In arteriis renis, pulmonis, femoris confirmavit

*g* *Posthum.* p. 123.

p. 150. 151.

*h* Angulos, quibus arteriæ in venas inferuntur, rectos fuisse addit *hæmæstatiks*

*i* l. c,

*k* *De usu siphonis* p. 531. 532. operum omnium.

C. Bartholinus *l*, cæterum defensor parenchymatis *m*, in rene & in musculis *n* Bohnius<sup>q</sup>, in liene Borrichius *n*<sup>\*</sup>, in pulmone Vieussenius *n*<sup>\*\*</sup>. Ex aorta in venas mesentericas ceram urfit Godefridus Bidloo *o*, ex carotide in sinus cerebri, quod facile est, Vieussens *o*<sup>\*</sup>. In brachio cera arteriis impulsa circulum obiit, & in venas rediit, adeo manifesto, ut arteriarum venarumque confinia adparerent, Morlando teste *p*: ea vero felicitas pene nimia est, cum minimæ arteriolæ, uni duobusve globulis rubris perviæ, ægre oculo se offerant. In liene, pene, Guilielmo Cowpero *q*, pulmone facile successit ceræ circuitus, tum in hepate, ut ex vena portarum & arteria hepatica cera in venam cavam transfiret *r*. Friderico Ruy-schio hic eventus adeo familiaris fuit, ut rarius eum recensuerit *s*. Inter difficultates certe penitissimæ repletionis est, quando hoc aufugium injecto liquori patet, & venas pariter, ut arterias ligare oportet, ne ea via fugituræ ceræ superfit. Ex vena portarum in venam cavam lac urfit J. God. Bergerus *t*, & alii cla-

*l* Method. demonstrat. anat.

*m* Specim. anatom. p. 85.

*n* Circul. anat. æcon. p. 100. 101.

*n*<sup>\*</sup> Apud Bartholinum centur. IV. n. 17. Aër ex art. cœliaca in venas lienis transiit.

*n*<sup>\*\*</sup> De la structure des viscères. Argent. vivo usus est.

*o* Apud Blæmesteyn administ. anat. p. 7.

*o*<sup>\*</sup> De la structure des viscères.

*p* Phil. Transact. n. 283.

*q* Phil. Transact. n. 280.

285.

*r* Ad T. 38. f. 5. anatomes Bidloianæ, & Vieussens de la structure des viscères.

*s* Ep. III. de arteriis intercostalibus.

*t* De natur. human. p. 88.

211. Idem experimentum fecit Vieussens l. c. ut argentumvivum ex cœliaca art. in cavam & portarum venam penetraret.



ri v viri x, idemque experimentum patrui repetit Ill. Archiater Britannicus J. Samuel de Berger y noster olim amicus, tum Ol. Borrichius y\*. In rene factum est a Theodoro Craanen z, J. Lud. Apino a & Ill. Walthero b, qui idem parenchyma motumque tonicum Stahliani refutavit c. Ex arteria mesenterica hominis in venas alterius quidem lateris & portas argentum vivum transfudit Vieussenius d, in lie-  
ne Guilielmus Stukeley e. In pulmone & in mesenterio expertus est F. Boissier f. Ubique in corpore humano, & in omnibus visceribus ex arteriis in sodales venas injectos liquores transire confirmavit Georgius Frid. Francus g. Ex tota undique aorta in venam cavam materiem ceraceam penetrasse vidit A. Kaauw Boerhaave h. Columna aquæ undecim pedum incumbens fecit, ut aqua totius bovis corpus repleret, & ex arteriis per venas rediret i, cum prius idem Ill. Hales vix transire scripsisset k. Ego vero plurimis experimentis fere in omnibus vasis corporis huma-

v *Negot. cholepojesicos* n. XI.

x *De admin. anat.* p. 31.

y *De transitu sanguinis per minima* p. 7.

y\* *Cent. IV. Ep. 17.* Aere inflato per art. cœliacam venam portarum & cavam replevit.

z *De homine* p. 685.

a *Fascic. disput.* p. 129.

b *De secret.* p. 18.

c *De acceler. & retard. sang.* n. 13. seqq.

d *Traité des liqueurs* p.

177.

e *Of the spleen* p. 17.

Solum hunc eventum adopto, minime recepturus miram ejus venarum fabricam, qua arterias tubulo suo comprehendunt.

f *Traité de l'inflamm.* p. 215.

g In toto libello, qui inscribitur *anastomosis resecta*.

h *De perspir.* n. 550. 151.

i *Philos. exper.* p. 84. 91.

&c.

k *Hæmæstat.* p. 144.

ni eandem facilitatem expertus sum, maximam tamen vero in rene, cerebro, mesenterio, pulmone.

Etsi hæc valde manifesta sunt, videndum tamen est, an recte contraria sententia Cl. viris steterit. Et *Bohnius* primo hoc ratiocinio usus est, venis injectum liquorem in arterias minime penetrare *l.* Possemus contraria experimenta adducere, etiam nuperum Ill. viri *Christophori Jacobi Trew m*, qui argento vivo in ductum thoracicum infuso, repletis venis cerebri, etiam arterias piæ matris repleri vidit. Et ego, neque semel, ex vena portarum ceram, quam versus intestina inpuleram, vidi in arterias mesentericas transiisse: in hepaticam vero *Vieussens m\**, & *G. v. Swieten n.* Verum in universum venosæ injectiones minus recte succedunt, neque potest perinde magna vi siphon urgeri. Si enim, ut in arteriis fit, magno trunco tubulum immiseris, resistunt valvulæ: si in parvam venam siphonis canalem illigaveris, impetum exiguum adhibere licebit. Infinitæ etiam venarum anastomoses liquorem furantur, quemcumque injeceris, & denique arterias minimas densiores magis resistere probabile fit.

Altera objectio, quæ repetitur a liquore in cellulosam telam effluente, ea quidem unice vera est de aqueis liquoribus nimis tenuibus,

*l l. c. p. 100.*  
*m Commerc. Noric. 1739.*  
*hebd. 36.*

*m\* Loc. cit.*  
*n T. III. comment. p. 82.*



de ichthyocolle in frumenti spiritu soluta, aut de adipe porcino calente, aut denique de febo nimio impetu impulso. Idem vero vitium frigidiusculo oleo, aut ceræ momento addito, sublata nimia in adigendo embolo violentia, facile evitatur, ut per venas redeat, quidcunque per arterias inpuleris. Prior autem ille eventus id solum ostendit, facilem ex arteria in cellulosa telam viam esse. Addi vero ex *Boerhaavio* posset, quam materiem *Ruyschius* pro effusa inque maculas congesta habuit; eam omnino veros penicillos vasorum exhalantium febo colorato plenorum fuisse o. Sed vere tenues liquores de vasis exire dubium non est. Multo vero minus probabile est *Stephani Blancardi* p commentum, nuper non sine mea admiratione a *Celeb. Viro q* receptum, qui sanguinem ex ultimis arteriis in musculares fibras exire, per eas demum in venas redire scripsit.

Si porro addideris, in animalibus, quorum vasa nudo oculo usurpari possunt, & in quibus manifestam continuitatem utriusque generis perspicimus, nihil quidquam adparere spongiæ, cellulosi textus, aut opaci cujuscunque medii simile, quod se his vasis interponat, aut iisdem circumfundatur, pariter credo, cum *Illustribus* hujus seculi *Viris r* pene omnibus, parenchy-

o *Prælect.* T. II. p. 17. 18. p In libello de circulatione sanguinis per fibras.

q *Fr. Quesnay* *Æconom. de anim.* T. III. p. 424. r *J. God. de Berger de na-*

tur. human. p. 84. de inflam- mat. p. 8. 9. *J. Samuel de Berger* l. c. *A. F. Walther* de sang acceler. & retard. n, 13. seqq. *Herm. Boerhaave* aliique.

ma, interjectum advehentibus & revehentibus vasculis, tuto repudiari. Esse vero eiam post penitissimam repletionem, plurimum superstitis carnis in visceribus superest, quæ nullum tinctum liquorem recipiat *s*, fatis novi, sive cellulosa tela sit, quæ alba manet, sive minoris generis vascula, in quæ nulla crassior materies penetret *t*. Cur vero, cautus vir alioquin *B. F. Albinus* anastomoses arteriarum cum venis a ratione ab experimentis, ab autopsia refutari: a microscopio, & ab injectione, vero vix confirmari scripserit *t\**, nondum omnino video. Singulares communicationes arteriarum & venarum hoc loco dimittimus, in quibus amplissimæ venæ, arteriolæ exiguæ sunt, ut in placenta *v* uterina, aut alio modo minima vascula a vulgari fabrica recedunt.

Cæterum minima hæc vasa, in quibus sanguis de arteriis in venas transit, utique tenera sunt, pellucidissima, nudo oculo minime conspicua *x*, neque microscopio prompta visu, venas enim facilius videas, quæ unicum globulum vehunt, quam arterias. Membranas tamen utique habent, etsi nullas habere ex vulgari phænomeno persuadere sibi passus est *An-*

*s* *Persoons de morbis veterum* ex Ill. *Albini* præcep-  
tis.

*t* Vascula nempe alba Ill. *Ferrenii*, quæ in *Comment. Acad. Reg. Scient. Paris. an. 1749.* descripsit.

*t\** *Nat. Hom.* p. 32.

*v* *Ravius* in appendice ad *M. B. Valentini amphitheatrum zootomicum* p. 92.

*x* *Lettre sur le nouveau système sur la formation de la voix* p. 55.



*tonius van Leeuwenhoeck*  $y$ , quo videntur globuli rubri de parietibus arteriarum eminere  $z$ . In ovo incubato videntur omnino secundo die viæ per flavam quasi acerosam pulpam factæ esse, quasi acu delineatæ, sed altero die membranæ manifesto adparent. Diametrum si requisiveris, non quidem valde difficilis erit definitu, eadem enim, & paulo major erit, quam globuli sanguinei, a quo tota arteriola minima repletur  $a$ , ut supra ejus sphaerulæ diametrum tenuem crassitiem suorum parietum arteriola habeat. Vidi in ranarum mesenterio, & *Spalanzanus* vidit  $a^*$ . Eam diametrum alibi dicemus exiguam esse  $b$ , & ægre ter millesimam pollicis partem æquare. Duplam arteriolæ ad globulum diametrum facit *Stephanus Hales*, ut eo facilius sanguis perfluat  $c$ . Minorem autem esse arteriæ, quam globuli, diametrum, ut ægre demum & cum frictione percurratur  $d$ , omnino videtur ex hypothese dici, quæ in sanguinis motu difficultatem requirit, neque ea, qua hæc opinio nititur, sæpe citata figurarum in globulis mutatio satis certo de-

$y$  Globulos sibi vias facere & transire, quæ via sit facilissima *Operum* T. II. p. 184. *Phil. Trans.* n. 460. *Muys fabric. fibr.* p. 303. *Baker* l. c. p. 136.

$z$  *Second Memoire sur le mouvement du sang* Exp. II.  $a^*$  *Mot. sang.* p. 41. 53.  $b$  Lib. V.

124.

$c$  *Hæmostat.* p. 58. 52.  $d$  *Douglafs on the generation of heat* p. 6.

$a$  *Hales hæmast.* p. 61. *Cowper Phil. Trans.* n. 280. 285.

monstrata est. Verum de ea re alibi quæretur. Si globuli sanguinei in omni animale ejusdem sunt magnitudinis, etiam arteriolas minimas in omnibus æque magnas esse sequitur e.

### §. XXIII. II. *Ductus Excretorius.*

*Secundus* arteriarum finis est in *ductum excretorium*, canalem nempe venæ satis similem, perinde cum sui similibus in majores trunculos confluxurum, quem novæ radices, priorum similes, perpetuo augeant. Hujusmodi ductuum duplex est a venis diversitas. Nam liquorem a sanguine diversum vehunt, & eum non ad sanguinis massam reducunt, sed aliquam in cavam majorem, aeream, cibariam, uriniferam, aut demum extra corporis animalis fines, exemplo ductuum, ex glandula lacrumali natorum.

Ejusmodi equidem ductus ex arteriis continuari, sensuum testimonio confirmari vix potest. Nunquam microscopiis suis vidit *Leeuwenhoeckius*, radicem aliquam excretorii ductus ex arteria ortam, cum millies viderit inde nascentes venulas, neque quisquam ab eo tempore in his principiis videndis felicius fuit. Sequitur, minores esse ductuum excretoriorum



nascentium diametros, quam venularum, etsi aliquantum his radiculis celandis etiam pellucida earum tenuitas conferre potest. Qui enim unicum testimonium pro luteis aut decoloribus globulis dixit, in canalem lateralem expressis, vir Cl. *Henricus Baker f.*, is omnino solitarios globulos sanguineos vidit, sæpe certe flaventes. Deinde plerisque locis haud est facile, liquores, arteriis impulsos, in ductus excretorios urgere. In teste non successit industrio viro *Alexandro Monroo g.*, neque mihi, tenues liquores, & aqua tincta & ichthyocolla dissoluta, in ductus salivales, pancreaticos, & lacrimales ex arteriis transferunt.

Sunt tamen etiam contrarii eventus, in quibus omnino liquor arteriis impulsus continuo canali per ductum excretorium exiit. In renibus valde facile est, aerem, aquam, sebum calens per arterias renales in ureterem urgere *h.*, & omnino eum ductum ligasse oportet, si penitus renem replere volueris, uti sæpe expertus sum, Sed etiam in vivo homine argentum vivum per matulam redditum est *i.* In hepate & mihi successit, ut oleum terebinthinæ aut ex arteria, aut certe ex vena por-

*f* l. c. p. 136.

*g* De semine & testib. p. 23.

*h* Habent etiam eum eventum *Guil. Comper* ad *Bid-  
leum* T. 43, f. 5. tum *Ruy-*

*schius Thes.* I. affer. 2. n. 8. *Thes.* II. aff. 6. n. 7. *Thes.* III. n. 41. *Thes.* VI. n. 16. *Thes.* VIII. n. 44. 96. *Thes.* IX. n. 10.

*i* Rhod obs. 17. cent. II.

tarum, tinctum in ductus bilarios transfret, & ante me aliis Cl. viris *k*.

In ductibus salivalibus aut pancreaticis *l* non mihi quidem, sed Ill. *Albino* eadem fuit felicitas, ut ex discipulorum testimoniis colligitur. In ductus sebaceos Meibomianos *Ruy-schius* suum sebum urisit *m*, in vasa lactifera mammarum argentum vivum & lac *Comperus n*, *Vieussenius o*, & *Mangetus p*. Cl. *Mekelio* idem eventus non successit.

Verum alia experimenta natura sponte supeditavit, quæ eandem omnino vim habent. Nempe frequentissimum est, sanguinem, aut ab utero repulsum, aut alioquin copia motuve abundantem, per eos ductus excretorios effluere, quos adeo denuo confirmatur ex arteriis continuari, cum inprimis in multis experimentis canales rumpi minime probabile sit, siquidem integra valetudo, & solita sui liquoris secretio, post brevem errorem succedit.

In sano homine periodica per urinam (aliasque insolitas vias) hæmorrhagia visa est *q*. In febre tertiana urina sanguinea *r*. Sanguinis

*k* Ortlob æconom. anat. p. 132. *Lischwitz* de princip. venar. p. 32. *Heuermann* physiol. T. III. p. 734. *Boerhaave* de fabric. gland p. 36. &c. *Franken* de hepate p. 19. *Vieussens* (ex vena portarum non ex arteria) l. c.

*l* Haynian Comment. in inst. inst. rei med. T. III. p. 494. p. 815.

*m* Thesaur. X. n. 124.

*n* Ad Bidloo T. 19.

*o* In append. ad editionem Genevensis *Verheyenii* T. I. p. 31. 32.

*p* Theatr. anat. T. II. p. 168.

*q* Phil. Transact. n. 471.

*r* Valcarenghi medic. ration.

p. 4.



in plethoricis salutaris effluxus dudum a *Theod. Baronio* dictus s est. In octogenario cruentæ ex plethora urinæ fluxerunt t : Felix per urinam sanguineam crisis v. Mensium loco sanguis per renes & urinam fluxus x. Sanguinis innoxius a motu solo, & a vectione, aut ab alia causa quacunque, certe non morbosa y mictio.

Ex mammis sanguis pro lacte z. Ex via sanguis menstruus per mammas a. Lac rubicundum post suppressam hæmorrhagiam b. Per mammas sanguis menstruus c.

Ex oculis mensis d. Sanguis ex vasis palpebrarum e. Magna sanguinis ex oculis effusio post insolationem f. Sanguinis in puella ex oculis

s In triplici oper. mejendi p. 235. Vid etiam *J. Th. Schenkii exerc. anat.* p. 561. 562. *Harder apiar. obs.* 79.

t *F. Hofmann de venæsect. prudenter administr.* p. 11.

v *Amatus Lusitanus Centur.* II. curat. 93. *Salmuth Centur.* III. obs. 47.

x *Bausch de hæmatite prodr.* p. 22. *Storch jungfern Krankheiten* p. 332. *Moeb inst. med.* p. 422. *Stahl theor. med.* p. 758.

y *Alex. Bened. L.* 22. c. 26. *Pechlin Cent.* II. obs. 57. *Hofman med. syst. T.* IV. L. II. p. 136. 137. 150. *Comment. Acad. Scienc. Paris.* 1735. obs. 4. *Commerc. lit. Nor.* 1731. spec. 20. *Forest obs.* 5. 7. L. 24. *River. Cent.* I. obs.

13. *Bonnet sepulchret. L.* III. p. 687. *Stahl l.* c.

z *Salmuth L.* II. obs. 24. *Auzout in libellis cum Pecqueti de sang. & chylo dissertatione editis* p. 105.

a *Stalpart vander Wiel Centur.* I. obs. 79.

b *Just. Vesti obs.* 4.

c *Panarolus Pentecost.* IV. obs. 13. *Ruysch advers.* III. n. 3. &c. conf. *comm. ad præl. T. V. P.* II. p. 88.

d *Mesapöritus in Phil. Transact.* n. 302. *Valisneri T.* III. p. 305. Hi multo tempore fluxerunt. *Dodon histor. vitis vinique* p. 110. Vide plura loca *Comment. ad Præl. T. V. P.* II. p. 88.

e *Stalpart vander Wiel obs.* 19. *centur. prioris.*

f *Bierling advers.* n. 38.

oculis & auribus, post dolorem capitis pertinacem, bonis cum ægrotæ rebus, quatuor annis continuatum flumen *g*. In convulsa lacrumæ sanguineæ *h*. Sic in tenero puello *i*. Menfes per oculos guttatim a septimo anno ad decimum tertium, inde ad naturale iter reversi *k*. In vertiginoso felix per oculos & copiosa, quinque etiam unciarum, sanguinis effusio. Maxima hæmorrhagia ex angulo palpebrarum *m*.

Ex ductu salivali sanguis menstruus fluxit *n*. Sudor sanguineus minime infrequens *n*\*. In universas cellulosas telas in scorbutico *n*\*\* cruor exiit.

Post exempla ista, quorum loco multo majorem numerum congerere licuisset, possumus carere aliis, magis a naturali corporis statu alienis, sanguinis per ductus excretorios effusionibus. Paucissimas citabimus. A serpentis Ibiracoa morfu sanguis per aures, nares, & oculos fluit *o*. Morbus ille periculosissimus, quem ob sanguinem in flavum ichorem dissolutum Angli *flavam febrem*, Galli *Mal de Siam* vocant, hæmorrhagias per aures, nares, oculosque aliasque corporis partes ciet, funesto

*g* Phil. Trans. n. 168.

*h* Diar. Trivultienſe Maj-Jun. 1701. Lacrumæ sanguine tinctæ infantis *Fr. Frenck* disp. Witteb. 1768.

*i* Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 6. 7. obs. 200.

*k* Helwig obs. 140.

*l* Zacut. Lusit. hist. med. mirab. obs. 54.

in Blancaard jaarregister Cent.

VII. obs. 27.

*n* Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 7. 8. obs. 48.

*n*\* Eschenbach obs. p. 42.

*n*\*\* Lind fever. and infect. p. 285.

*o* Piso hist. nat. Ind. p.

276.



equidem fere eventu *p*. In febre regionum fervidarum *Carli* ipse per os, nares & aures *p*<sup>\*</sup>, sanguinem amisit. Ex ore & naribus in maligna febre. Ex philtro dato sanguis per renes, lacrimas, ceruminis vias, erupit *q*. In icterica sanguis ad duas libras ex glandula lacrumali fluxit, funesto pariter eventu *r*. Sanguis in variolis pessimis per urinas fluit, ut tamen post id symptoma ægri raro vitales evadant *s*.

Hæc exempla omnino ad nostrum finem faciunt. Etsi enim aliena sunt a salubri corporis habitu, tamen non solidas partes ruptas, novasque paratas cruori vias requirunt, sed unice sanguinis dissolutionem. Verum nunc ostendendum sumus, ductus excretorios suam originem ab arteriis sanguiferis deducere. Eam demonstrationem nihil quidquam debilitaverit morbosa vasculorum laxitas, aut tenuitas sanguinis.

Denique addi potest, etsi rarum est, dari tamen exemplum, in quo continuatio ductus excretorii cum arteria rubra pene ad oculum demonstrari potest *t*.

*p* Chevalier *malad. de S. Domingue* p. 5. *Loyer voyage d'Issigny* p. 7. *Lind health of seamen* ed. 1774. p. 55. & olim *Labadie de la peste* per os, nares, aures, uterum, penem, oculos, sudorem, venam ruptam, vari-

cem ruptum, mammas, fluxisse vidit sanguinem.

*p*<sup>\*</sup> *Relat. del viagg.*

*q* *Henr. ab Heers obs. opido rar.* p. 126. seqq.

*r* *Phil. Transact.* n. 208.

*s* *Lister de variol.* p. 93.

*t* *Bertin Memoir. de l'Acad. des scienc.* 1744. p. 98. 99.

Siquidem adeo & injecti liquores (ex arteria rubra in excretorios ductus varios absque mora, aut excitatis nodulis, transeunt: siquidem sanguis ruber etiam, a levibus solidasque certe partes non mutantibus causis, incitatus in eos ductus elabitur, si quidem denique oculi ipsius testimonium accedit, omnino videtur, sanguineas arterias cum ductibus excretoriis continuari, atque hunc exitum pro terminorum earum arteriarum aliquo, tuto, & absque erroris metu, recipi posse.

§. XXIV. III. *Exhalatio Quintuplex. Cellulosa. Pulmonalis.*

Tertius finis est, quo arteria sanguinea vel ipsa sanguinem suum de resecto quasi sine evomit; vel tenuius liquidum per suos poros exsudat, in cellulosam telam effusum; vel certe in vasculum exhalans terminatur, quod neque vena est, ad cor reditura, neque ductus excretorius, cum sui similibus in majorem aliquem truncum venarum more coiturus, sed omnino breve, & simplex; de aperto sine suum liquorem effundit. Iterum, ex diversitate horum vasorum exhalantium, quinque classes constituuntur. Nam id vasculum aut in magnam aliquam corporis humani caveam aperitur, os, ventriculum, intestina, nares, vesicam, fellis receptaculum, uterum, vaginam, caveas ventriculorum cerebri, pleuræ, pericardii, peritonæi, vaginalis tunicæ. Vel exhalatio fit in ambitum exteriorum corporis huma-



ni, per universam cutem, & palpebrarum, & oculi conjunctivam membranam: aut denique in subtiliores caveas vascula de arteriis rubris nata aperiuntur, suumque liquorem deponunt, in cryptas nempe verasve glandulas.

Ostendendum erit, omnino quinque hæc exhalationis genera vere locum habere. Et sanguinis quidem effusionem de arteria rubra in spongiosam fabricam corporum cavernosorum clitoridis, penis, & in subcutanea spatia cellulosa palearium meleagridis, cristarumque galli gallinacei, alias ostendemus *v*.

Secundi generis exhalatio, in qua de arteria rubra vel per poros, vel per brevissimos canales, in spatiola cellulosa circumposita, liquor exsudat, prius insigne exemplum enarravimus *x*, quod est in cellulosæ telæ cavernulis. Alterum, æque illustre, pulmonis est, suo loco dicendum *y*, ut tamen interim hoc experimentum præmittam, quod facillime fit. In venam cavam prope cor tubus immittatur, urgeatur in eum tubum aqua, cæruleo colore tincta; transibit ea in cor dextrum, arteriamque pulmonalem, & tota pulmonis vesicularis spongiosaque natura cæruleo sudore inebriabitur, qui spumofus, aëreque mistus, per aspe-

---

*v* L. penultimo quo *x* p. 72. seqq. Ex arte-  
dicetur de partibus, quæ riolis minimis aliquid exfu-  
generationi inserviunt. Conf. dat B. S. *Albinus* adnot. L.  
interim *Comment. ad Præ-* III. c. 10.  
*lect. Boerhaa vianas* T. V. *y* *Comment. ad Prælect. n.*  
P. I. p. 423. 424. & P. II. CCI.  
p. 426.

ram arteriam exhibit. Eandem exfudationem pulmonis in diriffimo morbo ipfe fanguis imitatur, qui tranfitu per inpervium pulmonem exclusus, fumma vi urgentis cordis dextri in obftructas arterias inactus, undique exfudat, inque maffam rubram, hepatis fimilem, per totum pulmonem effufus, funeftiffimum genus peripneumonix facit *a*. Olim a nobis dictum, ad rem noftram vero perinde facit, exemplum fanguinis aut menftrui, aut alioquin exuberantis, qui per uterum effluere prohibitus, facillime in fpacia aërea pulmonum regurgitat, minori- que cum periculo, quam quidem in viris folet, per hæmoptysin expurgatur *b*. Vias enim non ruptas, & unice dilatatas effe, fubfequens fanitatis reftitutio demonftrat.

Vafa exhalantia angulum cum vafe, in quod fanguis impellitur, obtufum facere Cl. *Swediauer*, cum reforbentque obtufus eft, nescio an ad naturam *b\**.

#### §. XXV. *In caveas majores.*

Exhalatio in caveas ampliores humani corporis eodem modo demonftratur, & perinde oftenditur ejus ex arteriis rubris exortus, uti de cellulofæ telæ fudore diximus. Omnes in corpore humano membranæ fudant utique de

---

*a* Opusc. pathol. obf. 14. fcriptores, citati in *Com-*  
*b* Pechlin L. I. obf. 43. *mentariis ad prælect. T. V. P.*  
*Huxham on fevers* p. 44. 191. II. p. 86.  
*Hippocrates Muliebr. L. I.* *b\** In difp. de thefaur. anat.  
 aliique magno numero n. 59.



invisibilibus poris vaporem, quem frequentissime, tot in canicidiis, vidi fumi modo surgere de duræ piæque membranæ cerebri, de cordis, pulmonis, hepatis, lienis, pancreatis, renum, intestinorum, ventriculi, vesicæ, omenti, mesenterii, pleuræ, peritonæi omni calente superficie c. Fætor ei vaporis inest, qui volatilem naturam animale cum dissoluto oleo subactam refert, in abdomine potissimum, nam in pectore minus virulentus exit d. Eum vaporem, in aquæ speciem collectum, post animalis mortem reperimus in caveis, quas nominavimus, cujus naturam, aut ab igne admoto, aut ab adfuso alcohole, coagulabilem dicemus, quando de lymphâ agetur e. Hic idem est penetrabilis liquor, cujus ope ancyloses f, & gravissimi alii morbi nonnunquam solvuntur, si in vivi spirantisque animalis viscera partem obstructam dimiserimus. Etiam post incisum vivi animalis ventrem absterfus redit, novisque guttulis membranas suas irrorat g. Facile autem ejus generationem imitamur, quoties in aortam animalis, hominisve, aut in mesentericam, & celiacam arteriam, vel aquam calentem h, vel ichthyocollam in frumenti spi-

c Conf. Kaaw de perspir. n. 539. 540. 542. 543. 544. 547. 549.

d Idem Vir Clar. ibid.

e Ruysch obs. rar. post tract. de valv. XIX. N. Ste-nonis de musc. & gland. p. 45. 46.

f Desports traité des armes à feu p. 258.

g Kaaw n. 541. 548. 557.

h Kaaw n. 546. 549. 550.

551. 552. 555. 556. 557. 562. 563. Conf. Comment. ad prælect. Boerhaav. T. I. p. 596. T. II. p. 625. C. A. a Ber-gen diss. de perspir. visc.

ritu solutam, vel oleum terebinthinæ, vel demum calentem etiam suillum adipem impellimus. Similes enim guttulæ undique de iisdem membranis exfudant, & receptacula replent, nulla particula læsa. Solum enim, in exemplo, oleum terebinthinæ exfudat, dum minimum in minimis vasculis residet, utique secuturum, si vascula rupta essent. Idem eventus est, si in venam portarum liquorem tenuem injeceris *i*. Pulchre sæpe vidi cœruleam gelatinam ventriculos cerebri, omentive caveam replevisse, ut etiam veram earum cavitatum figuram servaret.

Uti aquei & tenues humores, ita de sanguine nonnihil in eas vias non raro succedit, neque rarum est, in cadaveribus rubram aquam pericardii, rubrum abdominis laticem reperisse, in fetu vero humano etiam perpetuum *k*. Humor aqueus in fetu semper, sed & alias sæpe sanguineo colore est *l*. Hæmorrhagiæ narium de eo genere sunt, sanguis nempe vasa exhalantia narium non rumpit, sed dilatat. Eandem viam in morbis pectoris gelatina legit, quam dicemus de pulmone, & de corde sudare, mellis similem *m*. Hic vapor est, qui membranas *n* & viscera, quæ membranis con-

*i* Gunz de hepate n. 8.  
*Kaaw* n. 562.

*k* Santorini Istoria d'un fetto n. 51.

*l* Conf. Nuck defens. duct. aquos p. 25.

*m* Damianus Sinopens parrerg. medic. p. 38. 60. Senac essays de physique 1735. p. 544. Quesnay traité des supurations.

*n* Conf. Cl. Kaaw n. 635.



tinentur, liberas a concretione servat. Omne enim cavum, quod non coalescit, plenum est, sanum quidem spiritu, morbosum vero sanite. Verba sunt antiqui auctoris libri *de arte*, qui inter *Hippocraticos* exstat. Hunc solum principem locum decerpſi, plures habet *Abrahamus Kaaw Boerhaave*, cui plurimum hæc tota pars physiologiæ debet. Hæc est aquula, propter quam omnes in corpore animali membranæ udæ sunt, *Vesalio* monente *p*: eaque de membranis, dum separantur, tenuibus guttulis destillat *q*.

Vascula, ex quibus gignitur, brevia esse, & de arteriis oriri, demonstrat facillimus transitus liquorum, etiam crassiorum, & sanguinis demum ipsius exhalatio.

Cum hac perspiratione analogiam habet, sed ex villis sæpe magis evidentibus prodit, quæ in faciem internam *r* omnium cavitatum corporis humani perinde exsudat, in os, fauces, œsophagum, asperam arteriam, ventriculum, intestina, vesicam urinariam, bilariamque, capsulas renales, utrumque. Eam exhalationem etiam per vasa fieri, quæ ex arteriis rubris continuantur, demonstrat injectus liquor tenuis, qui ex arteriis in eas caveas exit, facillime vero in intestinorum & ventri-

*p* De fabric. corp. hum. p. 728. *r* Kaaw n. 112. 120. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 185.

*q* Helvetius lettre au sujet de la critique de M. Bessé p. 186. 191. 194. 195. 196. 201. 202. 204. 210. 213. 214. 562. 206. 207.

culi cavitatem, ut omnino nihil sit, quare venas liges *s*: nimis enim facile, nimisque abunde, eam viam aqua & oleum terebinthinæ, & dissoluta ichthyocola legit, & nonnunquam ipsa etiam cera *t*.

Deinde in eas omnes vias pariter sanguis, etiam omnibus integris, cumque bonis ægri rebus, sæpe effunditur, sive ex menstrua plethora retenta, sive ex febre, sive ex alia causa, quæ nova ostiola non facit, sed antiqua, & nativa, unice dilatat. Loco mensium sanguis in infulis calidioribus Americæ frequenter per alvum fluit *v*. Menses per vomitum absque incommodo rejecti sunt *x*. Periodicam per anum & per urinam hæmorrhagiam adnotavimus *y*. In ægroto per omnia fere corporis excernicula sanguis fluxit, de quo *Valisnerius* scripsit *z*, ex gingivis nempe, oculis, naso, auribus, per urinam alvumque, non infelici eventu. In juvene, diuturno morbo affecto, alternis vicibus sanguis per renes, pulmones, ventriculum, intestina erumpebat *a*. Eædem sanguinis effusiones peculiarem febris flavæ characterem constituunt. In lienosis san-

*s* Hartman de peritia anatom. veter. spec. Diff. I. n. 27. 28.

*t* Kaauw n. 186. 187. 196. 201. 213. de utero, vesica, ventriculo, intestinis. Sylvius de le Boe Disp. Med. VI. n. 53. de vesicula fellea.

*v* Towne de morbis Barbadosens. p. 115. Plurima exem-

pla vide in Comm. Boerb. T. V. P. II. p. 87.

*x* Stalpart. v. der Wiel Centur. II. c. 17.

*y* Philos. Transact. n. 471.

*z* Tom. III. oper. omn. p. 305.

*a* M. Alberti kleine Schriften p. 580.



guis ad decem libras per fecessum & vomitum cum levamine, aut omnino cum perfecta ægri restitutione prodiit *b*. Quinque ex alvo libræ absque malo egestæ *c*, & sex *d*. In icterico salubris sanguinis per anum egestio *e*. Quatuor & quinque sanguinis per anum libræ egestæ, & ea crisi sanata cephalæa *f*. Sanguinis floridi libræ duodecim & 14 egestæ intra vigesimam & quartam horam, cum bonis ægri rebus *g*. Maxima hæmorrhagia per alvum, sine malo, quam coagulum crassum & viscidum secutum est, a muco in sua vasa redeunte *h* coactum. Salutares diarrhœæ sanguinæ *i*, & etiam tunc absque vasorum ruptione, quando corpus inde contabescit *k*. Demum in utero menses præbent exemplum perpetuum sanguinis, per vasa tenui exhalationi dicata exfudantis.

Ipsam demum ceram, quam arteriis injece-  
rant, in villis ultimis hærentem præstantissimi  
viri viderunt, *Ruyschius l*, *B. Siegfried Albinus m*,  
& *Abraham Kaaui Boerhaave n*, & ego  
vidi, ut omnino in eos villos arteriarum ra-  
mulos produci, patuloque fine terminari mani-  
festum sit.

*b* Marcell. Donat. hist. me-  
dic. mir. L. IV. c. 9.

*c* Smetius in miscell.

*d* Diom. Cornarius obs. med.  
c. 26.

*e* Bartholin Centur. V. hist.  
41.

*f* Hildan. L. II. obs. 9.

*g* Spindler obs. 44.

*h* Jul. Ofrai obs. de prat.  
80.

*i* Rhod obs. 85. Centur. I.

*k* Glisson de hepat. p. 442.

*l* Epist. XI. &c.

*m* l. c. n. 112. 186. 187.

*n* Walther de intestinorum an-  
gustia n. 3.

*n* n. 113.

§. XXVI. *Cutanea.*

Alia porro exhalatio est, quæ fit per totum corporis humani exteriorem ambitum, perque cutis superficiem epidermidi obversam: quæ eadem dudum non sudoris solum, sed etiam insensibilis perspirationis nomine innotuit. Ea pariter arteriosa est, fitque ex vasculis cum arteriis cutaneis continuatis. Eum sudorem, neque difficulter, aqua imitatur o, in arterias artuum i aut in aortam, teneriorum inprimis puerorum, impulsæ. Ea enim undique de cutis superficie exsudat, & in vesicas colligitur, dum epidermidem in perviam elevat, qua in cadavere coercetur. Ichthyocolla dissoluta, & colore aliquo tincta, eandem viam sequitur, ut nimis sæpe vidi. Ceram rarius est per ea vascula, utique minus, quam villi interni sunt, laxa urgere, successit tamen etiam iste eventus p. Etiam hanc viam, tenuiori equidem liquori destinatam, satis frequenter sanguis legit. Jam *Aristoteles* sudoris sanguinei exempla citat q, quem alii, bene multi, scriptores secuti sunt r. A thermarum usu in rheumatismo cum bonis ægri rebus globuli sanguinei undi-

---

o Conf. *Kaam* n. 94. 96. VI. obs. 70. *Borell hist. p.*  
*p. Ruysch* apud *Boerh. fabric. gland.* p. 6. *Kaam* n. 96. 353. *Jetze von den weissen*  
*Husen* p. 14. *Binninger Cent.*  
IV. obs. 52. in variis infan-  
tibus. *Senac T. II. p. 669.*  
670. (frequentem esse in axil-  
lis.) Ex terrore sudor san-  
guinis *Musitanus*.  
q *De partib. anim. L. III.*  
c. 5.  
r *Marcell. Donat hist. med.*  
*mirab. p. 17. 30. Hild. L.*



que de cute exfudarunt: & in æstuoso Africæ aëre idem fudor collegæ nostro Cl. *Adanjonio* molestus erupit. Ex arnicæ usu fudor ruber pectoris *s.* Sanguinis per cutis foramina fudor *t.* In febribus acutis diapedesis fudoris cruenti specie, ut axillæ indusia tingerent *v.* In febre Jamaicensi salutare quidem hæmorrhagiæ, ex poris tamen cutis vix domabiles erumpunt *x.* iique cruenti sudores multos in insulis Antillis a Gallis *y* habitatis intra quartum quintumve diem enecuerunt. Menses per universam cutem capillatam capitis exfudarunt *z.* in non paucis exemplis, & per radicem unguis digiti *a.* aliaque loca cutanea *a\*.* Sudor sanguineus criticus *b.* Peculiari modo per poros aliquos cutis nonnunquam sanguis urgetur. Juvenis statim tempore sanguinem sudabat ex apice digitorum minorum, necessaria crisi, ut ea deficiente deterius haberet *c.* Sanguis in cephalæa sub alis & inter digitos pedis exsudabat, & in dorso manus *d.* Sanguis ex aure, digitorum pedis manusque apicibus, linguæ

*s* Diltthey obs. 2.

*t* Tulp. L. II. c. 31.

*v* Huxham of fevers p. 44.

*x* Williams of the yellow fever p. 13. In peste similia vidit Zacutus Lusitanus Prax. admirab. L. III. obs. 41.

*y* Helvetius des pertes du sang. p. 87. 88.

*z* Pechlin obs. med. III. L. I. & de apoplexia n. 15. Schenk exerc. anat. p. 175.

Kerkring obs. 86. Ruysch adv. anat. III. n. 3. Vide plures locos collectos in Comm. ad Boerb. T. V. P. II. p. 87.

*a* Ib. p. 87. 89.

*a\** C. a Reyes Camp. elys jucund. quæst. n. 93.

*b* Zacut Lusit. Prax. admirab. L. III. obs. 75.

*c* Hird of contag. diseases p. 34.

*d* Petzold obs. 46.

mucrone, umbilico, oculi angulo fluebat *e*.  
 Ex cute manus & genæ sanguinis exsudatio *f*.  
 Sudor sanguineus diuturnus in sano homine *g*.  
 Sanguinis copia maxima ex minimo digito *h*.  
 Hæmorrhoides, neque bene suppressæ, sup-  
 pletæ fuerunt a sanguine de interfemineo per  
 porum insensibilem effluente *i*. Ex minimo  
 poro pedis salubris sanguinis exsudatio *k*. San-  
 guis per poros, quasi acu terebratos, erupit ex  
 capite, humero, cubito, digitis, pede *l*. San-  
 guinem per porum faciei in formosa & docta  
 virgine exsiliisse novi, alii per digitorum, per-  
 que cutis capillatæ poros.

Scorbuticos sudores cruentos omittimus *m*,  
 qui possent ex vasis ruptis succedere, etiam si  
 viæ non conspicuæ fuerint. Sufficiunt, quæ  
 hic collegimus, ut constet, vasa exhalantia cu-  
 tis ab arteriis rubris oriri.

## §. XXVII. *Glandulosa.*

Ultimum genus exhalationis est, quod fit  
 in cryptas glandulasve veri nominis. De eo  
 genere fuse dicetur *o*. In eas enim glandu-

*e* Mesaportus *Phil. Transf.* 51.

p. 302.

*k* *Comm. Litt. Nor.* 1740.

*f* Bartholin *hist. anat.* XIII. hebdom. 26.

*l* *Phil. Transact.* n. 109.

*g* Binninger *Cent.* IV. obs.

*m* G. v. Swieten *Comment. in aphor. Boerb.* T. III. p.

53.

608.

*h* H. ab Heers *obs.* 23.

*i* Zacut. *Prax. Med.* obs.

*o* Libro VII. de secretion.



las, perinde ut in majores corporis humani caveas, ex arteriis rubris humor exsudat, quem ars anatomica imitatur, & in eas cavernulas & aquam, & nonnunquam ipsam ceram *p* urget: Natura vero, ab irritatione, aut ab alia causa, incitata perinde etiam, ut in prioribus perspirationis generibus, lympham nonnunquam coagulabilem, & sanguinem denique per easdem vias urget, ut in sinibus urethræ, post acres injectiones, non raro adparet.

§. XXVIII. IV. *In vasa minora.*

*Vas Lymphaticum.*

Ultimus finis, controversiis equidem obnoxius, arteriæ rubræ est, qui in vasculum minoris generis, & liquorem non rubrum vehens terminatur. A vena rubra hæc vascula liquore distant, quem vehunt; a ductu vero excretorio, quod minime venoso modo in osculum aliquod patulum suum liquorem convellant. Et primum certum est, sive absque medio ex arteriola minima rubra oriantur, sive aliquid alterius generis tubulosi intercedat, vasa lymphatica omnino, quæ vulgo eo cum nomine nota sunt, ex arteriis rubris oriri. Dumdum id compertum est, & jam *Caspar Bartho-*

---

*p* In glandulas intestinorum *Peyerianas Ruysch & Keuss*  
l. c. n. 255.

*linus Thomæ* filius in liene *q*, inque rene *r*, vasa lymphatica per arterias rubras replevit. Idem in liene præstitit *Borrichius s*, inflata arteria coeliaca, ut ipse ductus thoracicus intumesceret: in pulmone vero *t*, rene *v*, liene, & variis corporis humani partibus *Antonius Nuck*, princeps in horum vasorum historia auctor. In hepate *Comperus* eundem eventum vidit *x*, in rene *Aug. Fridericus Walther y*. Ex arteria mammaria aqua in vasa lymphatica transit *z*, & in vaccino utero ea vasa manifesto ex arteriis nasci, sunt qui scripserint *a*. Vena portarum plurimum de arteriosa natura habet, hinc per eam, neque unquam per cavam, vasa lymphatica hepatis replentur, in *Loqueti b*, aliorumque Clarorum virorum *c* periculis. Ex arteria spermatica liquor in vasa aquosa trajici apud *Sographum c\**.

Demum cum communis via sit chyli & lymphæ, & cum vasa lactea omnino lympham vehant, eo toto tempore, quo a chylo reformato feriantur; huc omnino pertinent ea experimenta, per quæ lac, argentum vivum,

- |   |  |
|---|--|
| <i>q</i> De diaphragmate p. 91.   | <i>x</i> Ad Bidloun T. 38.   |
| Alter finis arteriæ est in vas lymphaticum <i>Parent dialog.</i>        | <i>y</i> De secretionem p. 18. & <i>Phil. Ad. Boehmer Fascic. obs.</i>   |
| p. 55.  | <i>I. Præf.</i> p. 15.   |
| <i>r</i> p. 93.   | <i>z</i> <i>Manget Theatr. anat. T.</i>                                  |
| <i>s</i> Ad <i>Bartholinum</i> patrem                                   | <i>II.</i> p. 168.   |
| <i>Epist.</i> 17. <i>Centur.</i> IV.                                    | <i>a</i> <i>Ibid.</i> p. 204.  |
| <i>t</i> <i>Adenograph.</i> p. 52. <i>Defens. duct. aquosor.</i> p. 8.  | <i>b</i> De arter. hepatic. n. 7.  |
| <i>v</i> <i>Adenogr.</i> p. 48. 61. In funiculo spermatico <i>ibid.</i> | <i>c</i> <i>Winslow Cassebohm</i> in <i>M. S. codicc.</i> quos possideo. |
|   | <i>c*</i> <i>Theor. lymph.</i>   |



oleumque terebinthinæ ex arteriis mesenterii in lactea vasa *d* transiit, & quæ plurima olim in Anglia, nuper in Germania & Gallia facta sunt, & a nobis.

Mihi hæc experimenta sæpe de industria repetenti, & alias ne quærenti quidem, sponte se obtulerunt, in hepate potissimum, sed etiam in mesenterio. Neque, in meis certe experimentis, dici possit, in cellulosas prius cavernas injectum liquorem *f*, tunc vero demum in lymphatica vasa transiisse. Nam oleum terebinthinæ omnino vidi, rubro suo colore conservato, in vasa lymphatica venisse, cum nihil quidquam colorati in ulla cellulositate reperiatur. Neque possumus omnino cum Cl. viris sentire, qui per sua experimenta negarunt, vasa lymphatica per arterias repleri posse *g*, aut ea vasa, quæ in pulmone & liene per arterias repleta conspicua fiunt, vere lymphatica esse *h*.

Non ergo mirum est, sæpe rubere lympham, atque aliquid de sanguine in vasa lymphatica, & in ductum thoracicum transire, uti quidem perfrequenter vidi. Sed etiam *Antonius*

*d* Comper ad Bidloi anat. datis.  
 T. 39. f. 1. Edward. Tyson *f* Monroo de semine & te-  
 anat. of a pygmy p. 43. Wilh. stib. T. I. f. 4. 5. 6. T. II.  
 Stukeley of the spleen p. 18. f. 10. T. III. f. 5. T. IV.  
 P. v. Copello de fabric. glan- f. 2. 4.  
 dul. p. 32. Petrus Tarin in *g* Vieussens Traité des li-  
 epistola recusa in Tomo col- queurs. p. 252.  
 lectionis nostræ VII. III. *h* Hieronymus Sbaragli in  
 Mekelius in epistolis ad me scepsi II. p. 445.

*tonius Nuck* sæpe cruentam lympham reperit *i*, rufamque in vasis lymphaticis hominum strangulatorum sæpe adparere auctor est *Guilielmus Langley k*. Sanguineam lympham in vasis asinæ fuisse lego apud *Emanuelem Kænig l*. Rubram viderunt insignes scriptores, in homine *J. Nicolaus Pechlin m*, in cane *Peyerus junior n*, & in variis animalibus *J. Zeller o* & *J. C. Brunner p*. Cum flavedine mistum ruborem observavit *Sylvius de le Boe q*, & *J. Georgius Duvernoi r*.

Quare, si liquor injectus ex arteriis in vasa lymphatica transit, si lymphas sero sanguinis simillima est, si in eam lympham sæpe se arteriosus sanguis admiscet, omnino videtur absque errore recipi posse, ex arteriis lymphatica vasa continuari, atque hunc etiam exitum inter terminos arteriæ rubræ locum habere. Dudum Clari in arte Viri & similia docuerunt.

### §. XXIX. V. Arteria non rubra.

Verum longe diversum est, quod hic imprimis volumus. Nempe omissis venis per to-

- 
- |  |  |
|--|--|
| <i>i</i> Adenograph. p. 54.                  | <i>r</i> In I. Tomo Comment. Acad. Petrop.   |
| <i>k</i> Obs. 8.                             | <i>s</i> In sectione III, comparata cum Lib. VII.  |
| <i>l</i> Regn. animal. p. 107.               | <i>t</i> Nicolaus Stenonis filius de muscul. & glandul. C. Bartholinus Thomæ filius specim. histor. anat. p. 13. Martinus Lister de humoribus c. 22. |
| <i>m</i> Obs. 60. L. I.                      |  |
| <i>n</i> Obs. anat. 13.                      |  |
| <i>o</i> In diss. de administ. vasor. lymph. |  |
| <i>p</i> In lib. de pancreate.               |  |
| <i>q</i> Diss. med. VIII. n. 7.              |  |



tum corpus exfanguibus, quas *Empedocles* dixit, omisso *Aristotele*, omissis nimis obscuris illis fibris faniem continentibus, quas inter arteriam venamque medias intercedere vir insignis scripsit *v*, *Hermanni Boerhaave* celeberrimum inventum constituunt vasa arteriosa cylindrica, arctiora, quam sit rubri globuli diameter, & tenuiorem humorem vehentia. *Præceptor* eam laudem tribuo: qui anno 1703. *x* ea vasa descripserit, aliquotannis ante *Vieuſſenium*, quem inventorem nonnulli Galli laudant *y*. Ejus enim viri vasa *neurolymphatica*, orta ex arteriis, terminata in venas, & membranas corporis animalis constituentia *z*, demum anno 1705. dicta sunt. Deinde serius ductus arterioso lymphaticos dixit, natos ex arteriis, insertos carnosus ductibus, aut venis: ejusque ductus adiposi huc pertinent. Vasa enim minima sunt, vehentia partem sanguinis decolorem, quæ denuo rubra fit, quando se iterum adtraxit *a*. Verum is *Clar.* vir, neque solus *b*, satis manifesto cellulofam telam pro vasis minoribus descripsit *c*. Longe minus speciei est in ea laude, quam sibi, non certe recte, olim tribuebat *J. Cl. Adr. Helvetius d*, & ab

*v* *Histor. anim.* L. III. c. 6.

*x* *De usu rationii mechanici* p. 14. *Inst. Med.* n. 245.

*y* *Antonius Fixes de tumoribus* p. 10.

*z* *Nov. vasor. system.* p. 112.

*a* *Traité des liqueurs* p. 22, 129. &c.

*b* Eadem est de *B. Boschet* to non injusta suspicio de falsivatione p. 16.

*c* Confer descriptionem pancreaticis p. 212.

*d* *Histoir. de l'Acad. des sciences.* 1725.

aliis sibi adscriptam vidit *e*. Multis enim post innumerabiles fere editiones *Boerhaaviani* operis annis Vir Clar. demum suam œconomiam edidit *f*.

Ergo *Leeuwenhoeckii* microscopica experimenta, quibus varii ex ordine diminuti globuli in sanguine ostenduntur, conjunxit *Boerhaavius* cum *Ruyschianis* vasorum injectionibus, quibus fit, ut decolora & visum fugientia *g* vasa, colorato liquore repleta, nunc oculis conspicua se offerant. Inde, ut valebat ingenio, vir præstantissimus confecit, nasci ex arteriis rubris alias arteriolas minores, liquorem sanguine tenuiorem vehentes, pariter conicas, & ramosas, & per eas arteriolas ad partes a corde remotiores liquorem avehi. Evidentia exempla hujus fabricæ reperiēbat Vir eximius in arteriis tunicæ oculi conjunctivæ, quæ in sano homine pellucidæ & inconspicuae, ramosæ vero & conicæ adparent, quoties sanguis ab inflammatione in eas urgetur, &, cum pauca vascula rubra in recte habente oculo adpareant, in inflammato eodem numerosissima sint, eæ arteriolæ manifesto cum rubris arteriis continuantur, cum & sanguis in eas nunc subeat, & liquores colorati, in arterias rubras artificio anatomico impulsæ, pariter

*e* Le Tellier in *emmenologia* 1713. & 1720 Leidæ prodigiæ *Friendianæ* refutatione. sent.

P. 75.

*g* Confer Librum VI. de

*f* Anno 1722 cum *Institutiones rei medicæ a. 1707.* sanguine.



eas repleant *b*. Manifesto vero, aiebat vir Ill., adparent & vasa lymphatica tunicæ adnatæ dilatata, & sanguis, qui ea repleat *i*.

Sed etiam absque morbo, absque artis auxilio, arteriolas istas minores ostendi posse videtur. Nam in eodem oculo arteriæ ciliares rubro quidem sanguine turgent, videtur autem idem in spadiceis colorem utcunque degenerare, dum earum arteriolarum ramuli per choriodeam membranam incedunt. Deinde ex circulo uveæ circumposito, quem ex arteriolæ divaricatæ efficiunt, alias arteriolas nasci certum est, quæ radiorum more, serpentinoque ductu, inter utramque iridis laminam versus pupillam feruntur *k*. Nulla vero arteriarum dos ab his vasculis abest: habent enim ramos *l*, anastomoses, figuram conicam, & venas fodales; sed tenuius utique liquidum vehunt, nisi artificium accesserit. Facile enim eas oleo terebinthinæ rubente repleo. Ea vascula etiam in vulneribus adparere, & ichore stillare, inque fissis intestinis, alius Vir Clar. addidit *m*: & posses *Antonii v. Leeuwenhoekii* auctoritatem citare, qui & vasa rubentibus globu-

*b* Helvetius lettre au sujet de la lettre critique de M. Bessé p. 213.

*i* Prax. medic. T. I. p. 269. conf. G. v. Swieten T. I. p. 640.

*k* Confer interim Comment. ad prælect. Boerhaav. T. 4.

*u*. 521. p. 150.

*l* Helvetius hist. de l'Acad. des scienc. p. 215. Hæc vascula pro veris vasis tenuioribus etiam a Cl. Ferrein descripta sunt. Verum de ea

lite alias dicemus.

*m* Helvetius l. c.

lis minora vidit *n*, & alia demum, quæ ducen-  
ties millies pilo minora essent *o*.

Verum latius omnino arteriarum minorum  
imperium patere, etsi non ubique adeo mani-  
festis experimentis demonstrantur, addere utique  
oportet. Nullam enim in corpore humano parti-  
culam esse, pergebat Vir Ill. in qua vel ex  
inflammatione, vel ab artificiosa injectione hu-  
morum coloratorum, non pariter vascula con-  
spicua reddantur, quæ, ante eas causas, ocu-  
lum fugiebant, & quæ nunc, sebo colorato  
farta, omnes arteriarum dotes ostendunt. In-  
testina, dura cerebri membrana, & pia, &  
omnia fere corporis animalis velamenta, perin-  
de novis & innumeris vasculis pinguntur,  
quando arte Ruyschiana arteriosi trunci perite re-  
pleti fuerunt. Neque difficulter ea experimen-  
ta imitatus sum. Novæ enim earum membra-  
narum arteriolæ facillime oleo terebinthinæ  
minio tincto replentur.

Sed etiam morbi in universo corpore hu-  
mano eadem vascula conspicua reddunt. In  
cornea membrana oculi nemo mortalium un-  
quam sanguineum globulum vidit: in ea ta-  
men rubentia vasa inflammatio ostendit, si fi-  
des Claris viris est *Sketono* *o*\*, *Brambille* *o*\*\*,  
aliis. Huc cutis, membranæ thoracis, abdominis,  
inflammatæ. Cerebrum vasis rubris in peste

---

*n* *Arcan. natur. detect.* p.  
15.

*o* p. 16.

*o*\* *De ophthalm.*

*o*\*\* *De phlegmone* p. 13.



pingitur *p*, quæ in sano homine visum fugiunt. Ipsa corda hominum a febre maligna enectorum rubicundissima adparent *q*. Sed ejusmodi experimenta innumerabilia existant.

Quare, uti humores sanguine tenuiores dantur, aiebat *Præceptor*, ita pariter pro quoque humore vasa propria natura fecit, & arterias, rubris continuas, aque rubræ arteriæ minimæ furculo, tamquam ab aorta sua, humores tenues ad destinata loca laturas; & venulas, quæ ab iis arteriis in sanguinis massam id revehant, quod utile superest.

Maximo plausu hæc theoria recepta fuit, & paucissimi per Europam physiologi, ab annis fere quadraginta, fuerunt, qui aliter senserint. Principum virorum adseclarum Boerhaavianæ opinionis nomina aliqua adjeci *r*, plura suppressi.

*p* Senac traité de la peste p. 248. 450.

*q* Struthius de arte sphygmica.

*r* Franciscus Nicholls in Compend. Anat. Econ. p. 3. Clifton Wintringham major de podagra p. 26. 36. J. Fridericus Schreiber Element. med. phys. Math. L. II. c. 2. &c. Aug. Fridericus Walther diss. de inflamm. n. XI. J. Cl. Adrianus Helvetius Oeconom. animal. p. 6. 132. &c. & in Histoire de l'Acad. des scienc.

1725. &c. Petrus Senac in Essay de physique p. 154. & in Tr. du cœur T. II. p. 61. 62. Franciscus Quesnay de la suppuration p. 266. 273. & in nova editione de l'usage de la saignée p. 61. G. v. Swieten in diss. inaug. n. 6. & in commentariis ad aphor. Pract. ubique. Antonius Valisneri Operum T. II. p. 51. 52. Brambilla (cum arterias nempe lymphaticas receperit.) Jac. Ben. Winslow expos. anat. T. IV. n. 600.

§. XXX. *Error loci.*

Pari vero consensu medicorum s deductam ex his principiis inflammationum theoriam receperunt. *Error loci* vocabat *Præceptor* t optimus, sanguinis in vasa rubris minora transitum. Ea enim vascula, quæ conica sint, osculorum fuorum maximo globulum impulsu equidem admittere docebat, progressuro autem utique resistere, eo magis, quo profundius in tenuius vasculum globulus transierit: lumina enim vasorum minorum eo minora fieri, quo longius ab origine sua recedunt, quæ in arteria rubra est: hinc maiorem perpetuo vim parietibus eorum vasorum inferri, & maiorem adeo resistantiam globulo dilatanti opponi. Interim a tergo vim cordis sequi, quæ sanguinem urgeat, globulumque impactum in angustias conici vasculi propellat. Ergo, nisi aut retroPELLATUR globulus, aut in minores moleculas diffiliat, utique demum vascula ab impulsis globulis dirumpi necesse esse, cum ii aditum

---

s Aliquos cito, qui errorem loci *Boerhaavianum* adoptarunt, J. Cl. *Adrianum Helvetium* in *œconom. anim.* p. 44. 78. non satis quidem indicato fonte, ex quo hauserat, dudum monente *Johanne Besse* (in *replique* p. 73.) Porro *Raymundum Vieussens* nov. *vasor. system.* p. 109. 110. *Sylvam de la saignée* T. I. p. 281. *Thomam Schwenke hæmatolog.* p. 52. 98. *Joh. de Gorter de perspirat.* p. 47. G. v. *Swieten Comment.* T. I. p. 178. 640. 641. 646. &c. *Georgium Erhardum Hamberger* in *theoria inflammationis.* *Clifton Wintringham Inquiry* p. 219. J. *Huxham of fevers* p. 3. t *Aphorism. de cognoscend. & curand. morb.* n. 118. 378. *Prax. Medic.* T. I. p. 269.



inveniant, exitus eorum nullus sit. Cæterum ab impulsis globulis vasa, quæ pellucida & inconspicua fuerunt, nunc rubescere, & inde esse ruborem partis inflammatae. Posse tamen etiam fieri, ut laxata vasa minora, absque impetus augmento, sanguinem in languida vita recipiant *v*. Poterat illa theoria cum *Erasistrati* & theoria comparari, qui inflammationis causam in particulis sanguineis posuit, quæ in fines vasculorum spiritui soli patentium inactæ, in exitu hæreant.

Sed neque hic requievit ferax inventorum ingenium magni *Præceptoris*. Ex *Leeuwenhoekianis* enim experimentis *y* non in sex solum globulos flavescences ruber globulus diffilit, neque adeo tenuiores humores solis moleculis sexies rubra sphaerula minoribus constant. Verum uti flavi humoris vascula ex rubris nascuntur, ita alia vascula dari poscebat *Auctor* eximius, quæ humorem flavo tenuiorem vehant *z*, dari enim moleculas, quæ flava sphaerula sexies, rubra trigesies & sexies minores sint. Sed ne hos quidem globulos satis tenues esse pergebat, aut respondere subtilitati ultimorum vasculorum cerebri: dari ergo procul dubio alios etiam vasculorum ordines, perpetuo diminutos, quorum prior ex tertio genere arteriolarum, pel-

*v* *Prax. med.* T. I. p. 314. n. 29. *Celsum* in præfat.

*x* Apud *Galenum* in *method.* L. I.

*med.* L. II. VII. *Plutarchum*  
de placitis philosoph. L. V.

*y* *Conf.* Lib. VI.

*z* *Instit. rei Med.* n. 245.

246.

lucidam lympham vehente nascatur, ex eo vero quintam aliam arteriolarum classem prodire, iterum subtiliori humori destinata, neque finem progressionis reperiri, aut ultimum vasculorum genus cognitum esse.

Novos adeo errores loci, & inflammationes non rubras nasci, quoties flavus humor *a* arteriolarum ferofarum, in vascula pellucida inpingat, atque in eorum angustiiis retineatur, quale fere sit flavum illud erysipelas *b*, qualia flava fila sint in lingua malo præfagio *c* visa, quorum nuper triste exemplum vidi, cum in dysenterica femina tota lingua croci colorem referret. Sed etiam mensium croceorum exempla reperiuntur *d*.

### §. XXXI. *Animadversiones.*

Sequitur, ut exploremus, quid in hac adeo elegante, & adeo gratiosa theoria firmi sit. Et vasa quidem rubris minora utique nemo rejecerit. In oculorum fabrica plura exempla sunt. Nam & iridis pellucida vascula nota sunt, & pariter decolora, quæ in ove minime obscura de retina in vitreum humorem abeunt *e*, & demum vascula crystallinæ lentis, ru-

*a* Aphorism. de cognos. § 644.

curand. morb. n. 379. 380.

Prax. med. T. II. p. 25. 407.

Stephan. Hales hæmæstat. p.

169.

*b* G. v. Swieten T. I. p. 519.

*c* Viridet du bon chile p.

*d* Lanzoni animadvers. 75.

*e* Prim. lin. physiolog. n.



brum succum vehere probabile fit, cujuscunque demum originis ea fuerint. Neque enim rubros globulos, etiam solitarios, pellucidissima hæc organa subire speres, quorum tota utilitas in diaphana puritate ponitur. Sed neque corticis cerebri vascula, quæ liquorem nerveum fecernunt, rubros globulos recipere autumo, cum ex ejusmodi crasso humore subito omnium tenuissimum generari veri non simile videatur. Verum penitissima etiam liquoris injectio, qui facillime in venas transit, sinusque cerebri replet, & facile adeo angustias arteriolarum unius globuli capacium superat, minimam tamen partem corticis cerebri replet, ut omnino, quod ejus reliquum est, fiat vasculis tenuioribus, quam ea sunt, in quibus ruber sanguis circumvehitur. Id enim, quod non repletum superest, non confusam molem, sed pariter vasculosum esse, vel inde ostenditur *f*, quod obiter repletis arteriis parvissima corticis cerebri portio rubrum colorem admittat, eo plura vero colorata vascula nascantur, quo profundius & felicius injectus humor penetravit. Quivis enim veri unice amans judex facile perspiciet, ex eo experimento sequi, minora & minora semper in cerebri cortice vascula esse, quorum prima & crassiora modice felix anatomicus, ultima demum summa peritia, penetrabili usa liquore, distendat. Possent etiam Cl.

---

*f* n. 359. *Comment. Boerb. T. II. n. 265. not. a.*

viri *Antonii Ferrein* alba vascula g hic adduci, quibus pleraque viscera constare ostendit, & quæ nullo unquam liquore colorato replentur.

His aliisque argumentis collectis. persuadeor utique, dari minora vascula, ex arteriis rubris orta, sed diaphana, nullius vitri ope conspicua, quæ globulis sanguineis inperuvia tenuius liquidum vehant: atque adeo erunt & ista vascula inter terminos arteriæ rubræ.

De errore loci utique non perinde liquet. Certum est enim, præcipuum argumentum, quo is error confirmatur, vero robore destitui. Quoties enim vasa, quæ pellucida fuerunt, visumque fugerunt, a sanguine aut a tincto liquore impulsio, rubescunt & conspicua redduntur, utique non ideo ea vasa prius globulis rubris inperuvia, aut alterius a rubris generis fuerunt. Dudum *Henricus Power* monuit, minima vascula pellucere, etiam si sanguinem vexerint, & merito, cum sanguinei globuli plerumque pallidi h sint, quando solitarii incedunt. Eo argumento usi sunt viri *Clar. J. Besse i*, *Petrus Senac k*, & *Franciscus Quesnay l*, & anonymus alius scriptor m, atque oculi, aut aliarum membranarum vasa, quæ ab inflammatione aut ab anatomica injectione quasi novi-

g In *Comment. Acad. scient.* 1749. descripta.

h *Microscopical experiments* p. 59.

i *Lettre à M. Helvetius* p. 190.

k *Traité du cœur* T. II. p. 667. seqq.

l *Traité de la saignée* edit. noviss. p. 354. de la suppuration p. 266. 279.

m *Lettre sur le nouveau système de la voix.* p. 55.



ter nascuntur, pro arteriis habuerunt, uni-  
seriei globulorum perviis, hinc pellucidis & in-  
conspicuis. Et ego quidem ejusmodi arteriolas  
& venulas utique in vivo animale visum fuge-  
re constanter reperio *n*, ut in area mesente-  
rii, quæ nuda & absque vasculis apparebat,  
microscopio demum adhibito canaliculos unius  
globuli diametro conspicias. Deinde cum in  
piscibus, inque cephalo facilius, vasorum pul-  
cherrimorum rete contemplerer, quod vitre-  
um corpus ambit, manifesto vidi, nudo oculo  
inconspicuum, idem tamen microscopio adhi-  
bito non solum facile distingui, aque trunculo  
centralis retinæ arteriæ per utramque vitreæ mem-  
branæ convexitatem numerosissimis ramis spargi :  
sed veris rubris vasis fieri, quæ pallent,  
& tamen rubros omnino globulos vehunt. Qua-  
re omnino nullo errore loci opus est, ubi vasa  
pene pellucida oculum fugiebant, ut nunc rubra  
vasa sint: sufficit aut acriorem oculum adhibere,  
aut sanguinis aliquanto plus in ea vasa urgere,  
quæ dudum sed parcum sanguinem vehebant.

Porro pleræque certo *o*, & omnes forte, in-  
flammationes non ejus sunt generis, quarum  
in tactus sanguis in integris vasis hæret. Si ru-  
borem inflammati digiti, aut inflammatae mem-  
branæ inspexeris, non ita ea pars vasculis pin-  
gitur, ut spatia decolora intercedant, uti qui-  
dem in oculo fit. Totus rubet inflammatus

---

*n* Premier Memoire sur le  
mouvement du sang. p. 14. 15.

*o* Opuscul. patholog. obs. 43.

digitus, totus rubet circulus ruber morbillorum, aut areola pustulæ variolosæ. Quæ ventriculi inflammationes dicuntur, manifesto sunt sanguine in cellulofam internam effuso. Verum ea ex prioribus repeti possunt, dudum exposita *q*. Adde nunc eventus inflammationis, resorbtionem sanguinis effusi, aut puris in cellulosa tela generationem, aut gangrænam, quæ pariter a sanguine fit, in spatia cavernosa effuso, aut scirrhum, cujus succus non in vasculis, sed in omnibus cellulosis spatiolis partis induratae cogitur, probabile fiet utique, inflammationes, pleraque certe, non a sanguine in vasis in tacto, sed ab eodem in circumjectam cellulofam telam exsudante fieri. Hæc est antiquissima inflammationis theoria, quam *Galenus* *r* proposuit, & ad errorem loci, paulum aliter deflexis Pergameni senis verbis, retulit *Gerardus* *v*. *Swieten* *s*.

Addi potest, ut in re gravi & seria paululum morari liceat, inflammationem eo modo, quem *Vir* olim *Summus* descripsit, omnino non nasci. Obstructioni cum vinculo hætenus convenit, quod humoris per vasa nostra liberum iter, intercipiat. Et vinculum vero, & obstructio, nunquam inflammationem ciet. Et vinculum quidem maximis arteriis injectum, umbilicalibus in fetu modo nato, carotidi, aliisque

---

*q* L. I. p. 37. 38.

*r* *Method. Medend.* L. X.

Sanguinem effundi in ampla spatia, quæ inter vasa sunt.

*s* *Comment.* T. I. p. 178.



truncis in vivo animale, nihil producit inflammationi simile. Post aliquot pulsus, & tumorem subito natum, sed parum omnino crescentem  $\alpha$ , sanguis a vinculo averfus in vasa vicina libera se recipit, plus nunc datura sanguinis, si incideris  $\gamma$ : proprium vero truncum inanem, & cum paucis residuo sanguine coaliturum relinquit. In exiguis & pellucidis vasculis, in quibus microscopium, quid agatur, detegit, perinde vinculum adhibitum penitus contraria facit eorum, quæ ex recepta sententia fiunt. Tantum enim abest a distentione canalium ligamentorum, ut sanguis vinculum, ramumve impervium, fugiat, inque communicantes arterias se recipiat, donec is, quem vinxisti ramus, omnino inanis supersit  $\zeta$ .

Obstructionem etiam sæpe in vivo animale vidi. Aliquando sanguis in ipsis arteriis cogitur, globulis in unam quasi massam confusis  $a$ . Eam massam sæpe sanguinis vis superstes liberat, & per vulnus aliquod arteriæ venæve apertum expellit. Id nisi factum fuerit, quiescit ad eam sedem sanguis, & ad coagulatum cruorem tamquam adtractus colligitur. Iterum veram obstructionem sæpe vidi, quoties albus humor arteriam venamque incisam circa vulnus plurimus obfarerat. Nunquam tunc in eam

$\alpha$  Sauvages theor. pulsus p. 26. patholog. method. p. 125. 126.

$\gamma$  Ferrein apud Cl. Salmon in diss. de utero. p. 27.

$\zeta$  Second Memoire sur le mouvement du sang. Exp. 54. 93. Remus in exper. ad circ. cul. sang. p. 50.

$a$  Exp. 93.

obstructionem quidquam natura molitur, neque sanguis versus eam sedem acceleratur, sed aut vias, præter coagulum, liberas percurrit *b*, aut omnino in toto eo trunco quiescit. Vulgare etiam est, sanguinem in arteriis immotum stagnare. Tunc, qui novus a corde succedit, adeo non arietat contra hoc obstaculum, ut repulsus ad cor redeat *c*, neque obstructam arteriam dilatet. Denuo, cum materies viscida carotidem alteram obstruxisset, neque diameter ejus arteriæ sub eo coagulo major fuit, neque rubor ullus, signumve inflammationis *d* adparuit.

Quare inflammationis causa omnino alia ab obstructione est: sive nunc a stimulo aliquo fiat, ut multa & potissimum in oculo irritato phænomena conspicua suadere videntur *e*, sive venas potius claudi putes, ut refluxus sanguinis inhibeatur, dum a corde acriter sanguis per arteriam urgetur, sive omnino hujus mali natura nondum penitus innotuit.

Denique vasculorum continuo decrescantium multos, sibique succedentes, ordines omnino etiam nunc multa vetant admittere, quæ dudum obposui *f*. Et primum æquum est, per arteriam rubram expeditissime venam sanguineam repleri, quæ globulis rubris recipien-

*b* Exp. 180.

*c* Exp. 92. 93. 187.

*d* Opuscul. patholog. obs. 19.

*e* Whytt physiolog. Essays p. 67.

*f* Prælect. ad Boerh. T. II. n. 245. not. c.



dis nata, atque adeo omnibus minorum generum arteriolis amplior sit. Deinde oportet, liquorem coloratum paulo difficilius, quam in venam rubram, facilius vero, quam in alia vascula minorum generum, in arteriam flavam transire, ut quæ minorum amplissima sit. Inde arteriola lymphatica, aut pellucidi humoris, difficilius liquorem impulsam admittet: in eam enim non poterit is liquor penetrare, nisi integram viam & per rubram, & per flavam, arteriam percurrerit: & ea difficultas & ex angustia hujus arteriolæ augebitur, & ex retardatione, quam in vasis flavis, conicis atque ramosis, impulsus humor patietur. Si vero de sanguinis globulis, & eorum per vasa minora itinere, sermo fuerit, globulus certe ruber difficillime, & rarissime, poterit totam longitudinem flavæ arteriolæ percurrere, cujus latissimum lumen eo globulo minus sit, angustissimus vero & ultimus finis non possit non globulo rubro multoties angustior esse, cum flavum vasculum conicum sit, ejusque lumen perpetuo decrescat. Quare vix unquam credibile est, tantam fore aut globuli rubri impacti vim, aut tincti liquoris celeritatem, ut per canalem conicum, adeo diu convergentem, adeo multo eo crasso globulo angustiolem, in pellucida vasa usque penetret.

Verum experimenta nihil simile docent. Nam aqua, ichthyocolla in frumenti spiritu dissoluta, oleum terebinthinæ, sebum, cera, facillime in vasa pellucida subeunt, & æque facile, quam in rubram venam, aut in arterio-  
las

las flavas, sanguineis conterminas, si quæ fuerint. Non dudum ostendimus, omnes eos liquores, quos diximus, expeditissime transire in cellulas adiposas *g*, & facilius fere, quam in venas: proxima facilitas est exhalationis intestinalis *h*, ventricularis, & ejus, quæ in cavas pleuræ *i*, pericardii, cerebri effunditur. Omnia hæc pellucida vasa æque facile, & facilius, quam venæ rubræ, per arterias replentur, cum tamen eorum plurima liquorem flavo sero multo tenuiorem vehant, neque adeo, ex hypothesi, ex arteriis rubris, sed ex flavis, aut demum ex aliis, a rubris etiam remotioribus, vasculorum generibus nascantur.

Valentius argumentum est, quod a sanguine fumitur. Eum æquum est, secundum eam hypothesin, quæ series sibi succedentes vasculorum statuit, difficillime in vasa pellucida venire, qui ne prima quidem & flava flava sine illata violentia subire posset. Et tamen vulgare est & innoxium, perque exempla a nobis proposita abunde confirmatum, sanguinem frequenter, & facile, per integra vasa, non rupta neque violata, intestinorum *k*, renum *l*, uteri *m*, cutisque *n* penetrare; facilem ergo & propinquam viam a rubris arteriis in ductus excretorios pellucidos fere universi corporis ducere; non ergo videri, ea vasa intercedente

*g* L. I. p. 37. 38. L. II. p. 102.

*h* L. II. p. 104.

*i* L. II. p. 103.

Tom. I.

*k* p. 105.

*l* p. 100. 101.

*m* Mensium exemplo.

*n* p. 106.



aliqua conicarum arteriarum serie a rubris arteriis distare.

Huic ratiocinio, quod Claris Viris *o* placuisse video, aliqua obposuit Ill. *Senacus p*, non quidem *Præceptoris* theoriam aut ordines succedentes valde defensusurus. Tenuissima vascula ex rubris arteriis prodire posse negat, cum in ea hypothese periculum summum sit, ne rumperentur, si impetum sanguinis paterentur, quæ tenerrima sint.

Adeo tenera non esse facile ostenditur, quod impetum vehementem incisoris per siphonem argentum vivum, sebum, ceramque, sanguine nempe & crassiores liquores, & ponderosiores, toto conatu suorum muscutorum pondereque innitentis corporis urgente, facile & absque ruptura ferant.

Cum præterea *Præceptor* arteriolam rubram minimam habeat pro aorta *q* arteriæ flavæ, hujusque ramum ultimum pro aorta arteriolæ lymphaticæ: cum omnes istæ arteriæ ramosæ sint & conicæ, atque iisdem in velocitate suorum humorum decrementis obnoxia sint, quæ ex natura conica atque ramosa in rubris arteriis nascuntur: cum in ipsa demum ultima arteriola rubra lente omnino, in ea hypothese *r*, humor fluat, sequitur, maximam fore tarditatem humorum pellucidorum, qui multis or-

*o* C. A. a Bergen diff. de  
inflamm. sanguin.

*p* T. II. p. 64.

*q* Vide J. R. M. n. CCLXI.  
& Prælectiones ad eum locum.

*r* Ibid. & alibi passim. ut  
n. CCXXII. CCCCLXXIX.

dinibus vasorum interjectis ab arteriis rubris separantur. Pone retardationem esse in qualibet serie arteriarum eandem; pone retardationem, quæ fit in arteria minima, esse saltem ejusmodi, ut sanguis ex ultimo ejus ramulo fluat cum vigesima parte *s* velocitatis, qua ex corde prodit; fluet adeo per arteriolam decimi ordinis ea celeritate, quæ erit ad velocitatem sanguinis in nascente aorta, uti unitas ad decimam potentiam numeri viginti: quare ea velocitas erit ad aortæ velocitatem ut 1. ad 10, 240, 000, 000, 000. Itaque, si in aorta sanguis percurrit in minuto primo pedes 150, percurrent in

ea arteriola minima fere  $\frac{1}{68,000,000,000,000,000}$

unius pedis. Pone fere quamcumque aliam rationem, in qua velocitas a corde accepta decreascit, notum est, etiam minimorum numerum vigesimas dignitates maximas esse.

Nunc nihil fit hujusmodi, & tenuissimorum vasculorum, quæ nobis nota fuerint, itinera celerrima sunt, æque velocia ac quidem sanguinis ipsius, aut omnino celeriora: exemplo perspirationis Sanctorianæ, exemplo *t* imprimis liquidi, quod nervos perfuit, & sensuum impressiones ad cerebrum perfert *v*.

Reponit iterum Illustris Senacus *x*,

*s* Vide ibid. & in *Comment.* iatromathematicis positæ fuerunt. Conf. p. 150.  
 p. 305. tum T. III. *Comm.* *t* *Prim. lin.* n. 440.  
 ad n. 479. Posui vero rationem 20. ad 1. tamquam earum minimam, quæ a variis *v* Ibid. n. 393.  
*x* l. c.



liquida tenuiora non valde retardari. Verum ea retardatio, quæ fit a ramorum aucto lumine, & ea, quæ fit a rami conici convergentis dilatatione, indeque nata frictione, ea inquam decrementsa eadem sunt, quamcunque tenuitatem, & quodcunque pondus specificum fluidorum, posueris.

## S E C T I O II. V E N Æ.

### §. I. *Venæ in universum.*

**H**ÆC classis vasorum in universum apud veteres arteriis notior fuit, magisque exculta. Cum enim & morborum sedes in venis *y* ponerent, & eas frequentissime inciderent, multo certe, quam arterias, audacius, cumque in earum sectionum loco magnum in efficacia discrimen quærerent, uti hæc aliave vena cum venis loci adfecti continuaretur, aut conjungeretur, factum est, ut contrario fere instituto, quam quidem nostro tempore fieri solet, venæ primo loco describerentur, arteriarum historia tamquam adpendix aliqua subjiceretur. Ita *Galenus* *z*, ita *Vesalius* *a*: & non exigui ex

*y* Februm sedes in vena acut. L. II. c. i.  
*cava* *Praxagoras* apud *Rufum* *z* In lib. de venarum &  
*de appellat.* L. I. p. 41. A arteriarum dissectione.  
*vena cava mortifera sanguinis rejectio* *Aretæus* curat. B. *a* *Vesal.* L. III. p. 484. o.

hac majori in venas adfectione errores orti sunt. Cum enim, in exemplo, ad mesocolon transversum, quod omenti posterius folium veteres vocarunt, ex eo trunco, qui a liene ad portas it, venam magnam deduceret, continuo arteriam comitem pariter a lienali eo *Vesalius* deduxit *b*: ita nata est arteria epiploica sinistra, ex lienalieducta, qualem quidem exiguum trunculum arteria lienis ad omentum mittit, ad mesocolon vero transversum, quod veterum tempore nomen omenti gessit, omnino præter minimos ramulos nihil quidquam dat. Ita pariter natæ sunt arteriæ, quas in sinus cerebri *Vesalius* deduxit *c*\*: indeque porro, multiplicatis erroribus, pulsus his sinibus adtributus est, quem utrumque errorem etiam hoc ævo vix de animis scriptorum anatomicorum evellas.

Cæterum in homine quidem, & in animalibus sanguineis, venæ alterum genus vasorum constituunt, in universum arteriarum comes & simile, & pariter a corde exoriens. In nereide & magna arteria, & eadem in venam reflexa, adest cum suis ramis venosis *c*\*\*, in aliis classibus animalium clari Viri etiam venas reppererunt, ut in cochlea, etiam marina *c*\*\*\*, loligine *d*, millepede aquatico *d*\*, astaco. Mi-

---

*b* *Vesal.* L. VII. c. 12. *c*\*\*\* *Lister de buccinis.*  
*c*\* L. V. f. 4. x. conf. *d* *Ejusd. de conchis bival-*  
*Fasc. II. Iconum anat. T. vibus, p. XXXII.*  
 II. cæliac. not. b. *d*\* *Baker employment for*  
*c*\*\* *Pallas miscell. p. 130. the microscope, Tom. II. p.*  
*Mullerus venam & arteriam 352. Vas nempe avehens &*  
*habet Wasserwürmer p. 126. revehens.*



nus tamen late patere venarum imperium crediderim, quam quidem arteriarum, si omnino nobis licet in fabrica insectorum arterias nobis fumere *d\*\**. Erucæ arteriam habent, pulsantem nempe canalem, ejusque ramos *e*: venæ vero nondum in ea classe visæ sunt. Etiam in humano monstro, cum cor deesset, venæ nullæ fuerunt *f*.

Ab arteriis venæ in universum physiologico imprimis discrimine & sanguinis itinere separantur. Nam tenuitas illa major non videtur perpetua esse, si vere *Harveius* vidit *g*, eandem esse arteriarum venarumque crassitiem in iis animalibus, quorum ventriculi cordis leves sunt. Ranis tamen & bufonibus venæ utique, quam arteriæ, tenuiores sunt *h*, fere ut homini.

## §. II. Trunci venosi,

Truncos venarum vulgo, ut arteriarum, duos numerant, pulmonalem venam, de qua nunc nondum agemus, & cavam, uti duæ omnino arteriæ ex corde prodeunt. Minutius tamen si rem rimeris, sex trunci venosi erunt, qui nusquam conveniunt, nisi ad utrumque cordis atrium; pulmonales nempe venæ quatuor, & cavæ duæ. Ad cor cæterum utique

*d\*\** p. 106.

*e* *Malpighius de bombyce* p.

19.

*f* *Memoir. de l'Acad. Roy. des Scienc.* 1739. p. 590.

*g* *Exerc. de motu cordis* p.

171. conf. *Proem.* p. 11.

*h* *Memoire sur le mouve-*

*ment du sang*, c. 1. p. 10.

omnes venæ grandissimæ sunt, & recedendo, pariter, ut arteriæ, gracilescunt. Rectius ergo omnino vetustissimi scriptores venas ex corde nasci scripserunt, *Aristoteles* primum *i*, tum *Erasistratus*, & inter nuperos ante *Harveium* *Vesalius* *k*, aliique *l* non plurimi. Auctor Libri *de alimentom*, & *Galenus* *n*, aliter hujus originis naturam consideravit, eamque ab ea parte derivavit, a qua sanguinem venæ haberent, nempe, ut putabant, hepar: eum *Aretæus* *o*, *Fallopins* *p* & alii secuti sunt. Mira cum acrimonia hæc lis agitata fuit, quam nunc æque favens utrique opinioni oblivio sepelivit: & *Caspar* quidem *Hofmannus* *q* nihilo minori animi contentione ante hos centum annos *Aristotelem* defendit, quam olim pro patria *Brutus*, aut pro Trojæ penatibus *Hector* pugnavit. Qui volet, de hac ingente olim lite *Georgium Segerum* *s* audire poterit, aut *Thomam Bartholinum* *t*.

Venam portarum omittimus, hætenus equi-

*i* Venarum principium Cor de generat. anim. L. II. c. 4. de partib. animal. L. III. c. 4. Somn. & vigil.

*k* De fabric. corp. hum. L. IV. c. 6. de radice Chinæ p. 263.

*l* Andreas Cæsalpinus in quæstionibus peripateticis L. V. c. 3. Cæsar Cremoninus proprio libello. Post *Harveium* imprimis *Franciscus Glisson* de hepate c. 36.

*m* n. 8. p. 29. edit. *Lallamantii*.

*n* De Hippocr. & Platon. decret. L. VI. &c.

*o* Hepar venarum radicatio Curat. acut. L. II. c. 7. & porro ibid. cap. 6. & de diut. curat. n. 1.

*p* De partib. similaribus c. 14.

*q* Oddus de Oddis in apologia pro Galeno L. II.

*s* In triumpho cordis Francos. 1654. 4. edito.

*t* Anat. tert. renovat. p. 584. seqq.



dem ab aliis venæ cavæ ramis diversam, quod sanguinem suum ad truncum communem non unico canali revehat, sed in plurimos ramos, omnino arterioso more distributa, per numerosissimos alios furculos, sensim ad venarum modum collectos, demum ad cavam venam referat. Et si aliquantum adeo de arteriosa fabrica participat, cum venis tamen fabrica, & ultimo sanguinis itinere conjuncta, in historia demum hepatis dicitur.

*Cava vena*, aortæ sodalis, quam priori sectione contemplati sumus, antiquissimis temporibus, & suo cum nomine, cognita fuit. Eodem nomine *Hippocratico* auctori dicta est v. Sed eo tempore omnes grandes venæ cavarum nomine ventitabant x, etiam ea, quæ nunc sine pare dicitur y, Paulatim obtinuit, ut cava non diceretur, nisi ea, quæ ab hepate ad renes apophyses mittit z. Vena cava in medio renum spinam dorsualem præterit, apud *Aristotelem* a, & posterior aorta est b, ut recte dudum idem adnotat. Cavam dixit *Praxagoras* c. Cava vena ab hepate sanguinem cordi ministrat, in spina arteriæ crassæ coextensa, apud *Areteum* d. Semibarbari ad græcorum recentiorum pronunciationem ejus nomen *Kili*

v L. de carnibus p. 250.  
edit Linden.

x Rufus appellat. part. corp.  
hum. L. I. p. 41.

y Loc. secund. hom. n. 8.

z Rufus ibid.

a Hist. animal. L. I. c. 17.

b Ibid. L. III. c. 4.

c Apud Rufum l. c.

d De curat. morb. acut. L.  
II. c. 7.

vel *Chili* scripserunt, unde suavi risu dignus ille error *J. Baptista Bianchi* e natus est, qui *Mundino* inventum ductum thoracicum, chyli nempe venam tribuit, cum bonus ille *Mundinus* de cava vena sermonem fecisset.

A cavis venis ramos suos omnes in corpore humano partes habent, pulmone excepto.

### §. III. Conica Figura.

Conicæ & ipsæ venæ sunt, eodem sensu quo arteriæ. Nam utraque cava ad aurem dextram amplissima est, superior quidem omnibus capitis, & artuum superiorum furculis latior, inferior omnibus abdominis, & artuum inferiorum truncis. Inde in universum rami eundo gracilescunt, donec ultimæ venulæ pariter, iterum ut arteriæ, cylindricæ sint *f*. Unicum enim certissime globulum vehunt, ut in rete venoso mesenterii ranæ & bufonis manifestissime vidi *f*<sup>\*</sup>, uti *Spalanzanus* pariter vidit. Unicum autem cum globulum transmittant, fieri non potest, ut in progressu minus humorum contineant, quam in ortu, ut adeo lumen diminuatur. Cylindricas ergo necesse est, quarum constans mensura globulus sit *g*. Longe cylindricæ sunt venæ potissimum cu-

*e* Orat. cum hist. hepatica  
edit. I. p. 18.

*f* Schvænke hæmatolog. p.  
II.

*f*<sup>\*</sup> De mot. sang. 15.

*g* Second Memoire sur le  
mouv. du sang. Exp. 119,  
120, 122, 124, 125, 126,  
127, 128, 132, 138, 143,  
145.



taneæ quæ magnum spatium absque ramis emetiuntur, saphenæ, cephalicæ, hepaticæ exemplo.

Inconstantior tamen venis, quam arteriis diameter est, ut contra quam natura conica ferret, passim dilatentur. Ita vena cava continuo sub septo transverso perampla est *b*: vena jugularis bulbosam suam, latiore, sub capite caveam habet *i*: In poplitea vena, inter femoris condylos, latitudinem majorem reperit idoneus testis *Morgagnus k*. Variabiles diametros in venis ranarum sæpe vidi *l*, & venam cavam faccis alternis intumescentem *J. Adamus Kulmus m*.

Etiam hanc legem venæ cum arteriis communem habent, ut duorum ramorum lumina conjuncta lumine trunci sui ampliora sint. Quare, uti aortæ lumen cum summa luminum ramorum suorum comparatum, ea insigniter minus est, ita idem de venæ cavæ lumine vere pronunciatur, si cum conjunctis omnium venarum luminibus comparetur.

*Color* alius ab arteriis est: ob tenuitatem enim parietum suorum, atque sanguinem frequentissime in caveam venosam congestum, cæruleæ videntur, qui color ex alba cute, & ex sanguinea purpura componitur. Raro ita peni-

*b* *J. Adam Kulmus in tabulis anat. germanice editis,*

*p. 88. edit. 1741.*

*i* *Comper Philos. Transact. 1718. Mens. Febr.*

*n. 280.*

*k* *Epist. anat. XVI. p. 161.*

*l* *l. c. Exp. 126.*

*m* *Breslauer Sammlungen*

tus inaniuntur, quin sanguinis vestigium aliquod retineant.

Fabrica interior, quam arteriis, simplicior est, & satis insigniter diversa. Abest a venis solida illa tendinea compages, quæ arteriarum præcipuam membranam efficit *n*. Absunt omnino fibræ musculosæ transversæ, quæ in arteriis adeo evidenter adparent. Dudum *Vesalius* ingenue fassus est, cum eas fibras discipulis demonstrare vellet, non invenisse, quod ostenderet *o*, & similia *Fallopium* *p*, aliorumque clarorum virorum *q* testimonia exstant.

#### §. V. *Membrana intima.*

*Intima*, nam perinde est, unde sermonem ordiamur, membrana venarum satis similis arteriosæ, levis, lubrica, flexilior quam in arteriis est. Neque fibras in ea reperio, neque poros, inferorum nempe vasorum lymphaticorum oscula *r*. Tubus internus venarum perinde, ut in arteriis levis est, si a valvulis recesseris. Nam trabeculæ internæ, quales in popliteæ venæ tumore Ill. *Morgagnus* *s* vidit, ad singularem & raram fabricam pertinent: & rete fibrosum in venis axillaribus testudinum, a Claro olim

*n* Sect. I. p. 59.

*o* *Examen observ. Fallop. ni* T. I. p. 339. & alibi.

p. 81.

*p* *Observ. anat.* p. 146. *b* 117.

editionis I. Venetæ.

*q* *Petit ad anatomen Palfy-*

*Nov. vasor. system.* p.

*s* *Loeo modo citato.*



chirurgus *Johanne Mery* t depictum, ab humana fabrica recedit, & ad confirmandas forte hujus animalis venas pertinet, quæ in diuturna illa, sub aquis, in venis cordi vicinis sanguinis congestione, vehementer turgent & distenduntur v.

### § VI. *Media.*

*Media* venarum membrana obscurior est, neque oportet ejus fabricam a vena cava ejusque parte cordi proxima mutuari. Nam ea quidem hujus venæ sedes manifesto, & in omnibus animalibus mihi notis, musculosa est x, ut etiam pulset, & conspicua contractione sanguinem in aurem dextram compellat y. Inde, in nuperioribus experimentis, etiam in vena pulmonali contractionem vidi, quæ cum diastole alternas vices fervaret.

In nulla alia vena aut sponte aut per irritationem, excitatum motum vidi, tot in experimentis. Qui vidit, ab irritatione natum, in jugulari aliisque venis *Cl. Verschuur*, fatetur sæpe tamen sibi nullam apparuisse. Quare memor me fibras carneas in vena nullas reperire, nondum ausim motum aliquem insitum in

t *Memoir. de l'Acad. Roy. metu animal. L. II. Propos. des scienc. 1703. f. 9.*

v Dicetur in Lib. IX. quo y *Second Memoire sur les de respiratione agetur. part. irrit. Exp. 473. 475.*

x Fibras circulares descripsit J. *Alphonfus Borellus* de 479. 480. 482. 526. 530. 531. 532. 543. 548. 549. 553. 554.

venis recipere. In animalibus frigidis nulla demum venarum vis est contractilis, si a cava recedas. A veneno quidem chemico tactæ utique constringuntur: verum ea contractio non pertinet ad motum vitalem & musculosum, qui perinde integris a vera morte diebus elapsis excitatur, dum vena humecta sit.

In divisionibus venarum tendineas, five ex callosa cellulosa tela factas fibras, & in concavo angulo venarum, & in convexo Ill. *Senacus* expressit *a*: deinde tendineum in ipsa vena tuberculum, sub angulo concavo in fibris longitudinem sequentibus positum *b*. Ejusmodi duriusculum tuberculum *c* in venæ cavæ divisione, quo loco in iliacas discedit, *Morganus* descripsit. Id tuberculum & in vena vidi, & similem, callosam duramque sedem, neque infrequenter, in eadem aortæ sede.

### §. VII. Cellulosa.

Huic iterum extimæ membranæ, perinde ut in arteriis, cellulosa tela *d* circumjacet, sed tenuis, neque in similem crassitiem stipata. Magnæ venæ alicui membranæ incumbunt, ut pleuræ, pericardio, peritonæo: ea membrana pariter, uti de arteriis dictum est, inconstantem exteriorem membranam quibusdam venarum truncis sup-

*a* Ibid. T. IV. f. 3. e. f.

*b* Ibid. B.

*c* *Epist. anat.* XV. ad finem.

*d* Conf. Ill. *Senac.* p. 254.



peditat, continuo venam deserturam *e*, quando ea muscolum adiit aut viscus. Sed ea melius singulatim dicentur. Cellulosa est, quam glandulis vesiculosis *Vieussenius* instruxit *f*. Difficile vero est *Willisium* intelligere, qui extimæ membranæ fibras longas, duabus mediis tunicis vasa, mistasque vasis glandulas, intimæ perinde, ut in arteriis, circulares fibras tribuit *g*. Eum *Bidlous* imitatur *h*.

Cæterum in cellulosa tela venosi trunci suas etiam arteriolas suasque venulas habent *i*. In trunco venæ cavæ supra pericardium plurimi furculi a venâ phrenica superiori, & a thymica nati ludunt *k*. Nervos etiam in venis adesse, posses ex analogia deducere, neque enim experimenta certa exstant. Ligatæ & conpunctæ venæ non videntur dolorem excitare *l*.

### §. VIII. Venarum firmitas.

*Robur*, quo venæ suæ ruptioni resistunt, majus est, quam primo adspectu videtur. Tenuës enim sunt, & præ arteriis multo majores.

*e* Bartholin anat. tert. renov. p. 593. Vesal l. c. p. 638. Senac. p. 235. de pericardio.

*f* Nov. vasor. system p. 117.

*g* Pharmaceut. rational. P. 11. T. VI, f. 1. 2. 3. 4. infer.

*h* In magno opere T. XXIII. f. 1. 2. 3.

*i* In vena portarum descripsit Kerkringius spicil. observ. 26.

*k* Conf. Fascic. icon. anat. III. Tab. anter. pect.

*l* Second Memoire sur les parties sensibles & irritables p. 217.

rem sui luminis ad membranas rationem habent. Craffities venæ cavæ descendentes ad aortam secundum *Jacobum Keilium* fuit uti 97. ad 510. *q*, subquintupla adeo & paulo minus. Accurate *Clifton Wintringham* in viro eam rationem fecit, uti 9, ad 154. in vitulo uti 11. ad 158. *r* & in verre uti 16. ad 262, quæ ratio multo adhuc minor est, subquatuordecupla, subfedecupla & subseptemdecupla.

Iterum fluidi ad solidum ratio in vena cava prope renalium originem fuit uti 1000. ad 4594. *s*, & in vena renali uti 100. ad 2702. cum in arteria esset uti 1000. 2027. Quare venæ renalis membranæ craffitiem habent, ad fluidum comparatam, quæ ad craffitiem solidæ partis arteriarum, ad suum paritet fluidum comparata, in ea ratione est, quæ est 2027. ad 27020, quæ ratio est iterum fere subtredecupla. In vena portarum fluidi ad solidum ratio est in ove uti 2286. ad 100. in cane uti 17. ad 1. *t*, quod quidem minime respondet affirmationi, venæ portarum membranam adeo crassam & quasi arteriosam esse *n*.

Porro venarum solida substantia videtur deorsum increfcere. Solidi enim ad fluidum ratio in iliaca vena, est ad eandem rationem in vena renali, uti 552. ad 100. *x*, & ad eandem rationem in vena splenica uti 556.

*q* De quantitate sanguinis v Pecquet dissert. anat. 1. p. 112.  
*r* Exp. 5. p. 32.  
*s* Id. p. 173. 202. x Clifton Wintringham 1. c. p. 147.  
*t* p. 203.



100. *y*, & solidi venæ cavæ prope renales ratio ad suum fluidum est, ad eandem rationem in vena cava superiori, ut 7566. ad 1000. *z*.

Iterum ergo in universum venæ quidem arteriis fere quindecuplo & ultra tenuiores tunicas habent, ita tamen, ut earum tunicarum crassities eundem incrementum, neque possit ulla constans ratio dari, quæ sit inter solida arteriarum venarumque. Ex tenuitate vero parietum fit, ut venæ sibi relictæ, a pondere aëris & a suo compressæ, collabantur, nisi, quod in utero fit & hepate, a circumductis undique filis cellulosis firmentur.

Adeo tenues cum sint, venæ tamen insigniter densæ sunt, atque earum solida pars pondus specificum aliquanto majus habet, quam quidem membranæ arteriarum. Nam in vena cava hominis juvenis pondus specificum venæ cavæ fuit, ad pondus specificum aortæ, uti 26. ad 25. *a*. In sene eadem rationes sunt uti 140. ad 139. *b*; in vitulo uti 28. ad 27. *c*: in vetulo bove uti 1101. ad 1000. *d*: in verre juniori uti 519. ad 500. *e*: in verre vetulo uti 53. ad 52. *f*; in cane juniori uti 27. ad 26. *g*: in cane vetulo uti 158. ad 157. *h*: in agno uti 259. ad 250. *i*.

*y* p. 175.

*z* p. 150.

*a* Exper. 1.

*b* Exper. 6.

*c* Exper. 2.

*d* Exper. 7.

*e* Exper. 4.

*f* Exper. 8.

*g* Exper. 9.

*h* Exper. 10.

*i* Exper. 3.

Hæc experimenta confirmant, in universum venarum solidam partem aliquanto densiorem esse, quam sunt membranæ arteriarum: eam vero rationem per ætatem diminui, & animalium juniorum venas densitate sua majori ratione arterias superare, quam animalium vetulorum venæ. Unde sequitur, per ætatem arteriarum densitates increfcere *k*, venarum non item. Cæterum hæc densitates in arteria aorta sunt in viro ad aquam uti 106. ad 100. in vena cava uti 110. ad 100. & intra hos numeros 105. & 110. ad 100. hæc ratio solidorum vasorum ad aquam fere continetur.

Adparuit, venarum densitatem superare densitatem arteriarum. Verum etiam venarum robora, arteriarum robora plerumque superant, sive quod eodem redit, majorem distentionem venæ absque ruptione ferunt, quam quidem arteriæ. Facilius enim cedunt, & magis dilatantur arteriis, non solum certe in ratione quadrupla *l*, sed longe majori. Incredibile est, in quantum saccum vena jugularis aut cera, aut mercurio distendi possit, & quam ampla vel minimarum venularum retia fiant, quando cera replentur, cujus rei nihil simile in arteriis fit, quas, si paulo vehementius distenderis, facile rumpas. Facillime certe aorta sub transverso septo a cera impulsæ crepat. Minus etiam credibiles sunt illæ lente factæ dilatationes

*k* Exper. 10.

*l* Sauvages Theor. pulsus:  
p. 10.



venarum; quæ a morbis fiunt, & alicui vulnere aut obstructioni medentur. Venam spermaticam omnem sanguinem cavæ venæ revexisse, & pollicis æquale lumen adtigisse vidi *m*, centuplo se ipsa auctiorem. Varix in cubito capite humano æqualis *m*\*. Venæ gravidarum ut mutantur, sinuumque similes fiant, alibi dicitur. Sed accuratius vidit *Stephanus Hales*, venam jugularem sustinuisse pressionem columnæ aqueæ 175 pedum *n*, neque ruptam fuisse, cum arteriam carotidem pressio columnæ aqueæ 190 pedum utique rumpere *o*, quæ tamen arteria tanto crassiores membranas nacta sit.

Verum longe magis sollicitè hæc exposuit *Ill.* quem modo citavimus, *Clifton Wintringham*.

Vena cava prope originem venarum renalium arietis non prius rupta est, quam a pondere librarum 176. cum quarta libræ parte *p*. Cum vero arteria ejusdem sedis rumpatur a pondere 158 l. II. unc. habetur robur ejus venæ ad arteriam sodalem, in ratione 1110. ad 1000. *q*.

In eodem animali, sed inferius, ad originem ramorum iliacorum, vena cava adhuc robustior est: cum enim tanto tenuior esset, tamen tulit pondus 87. librarum cum parte quarta, & robustior fuit sodali arteria, in ratione 1053. ad 1000. *r*.

*m* Opuscul. patholog. obs.

20

*m*\* Med. obs. and enquir.

*n* Hæmastatiks. p. 159.

*o* Ibid. p. 155.

*p* Exper. 21.

*q* Ibid.

*r* Exper. 27.

In ove venæ cavæ robur prope originem ramorum renalium fuit ad robur arteriæ ad eandem sedem, uti 1179. ad 1000. *s*.

In ramis perinde robur venarum majus fuit. Venæ iliacæ robur, in femina, fuit ad robur sodalis arteriæ uti 1034. ad 1000. *t*, & alias uti 1077. ad 1000. *v*.

In vena portarum, quæ in ove quinque pene atmosphærarum pressione tulit, robur fuit ad aortam uti 1414. ad 1000. *x*, & in cane ea ratio fuit 1407. ad 1000. *y*. Venæ pedis reliquis robustiores sunt *z*.

Neque tamen hæc constantia, aut absque exceptione sunt. Nam primo quidem in vasis secretoriis alia ratio obtinere videtur, & arteriæ ad viscera euntes venas suas comites plerumque robore superare. Ea roboris ratio in venis renalibus ad sodales arterias est uti 1000. ad 4088. *a*, in vena lienali ad arteriam cognominem, uti 1000. ad 4336. *b* & uti 1000. ad 4812. *c*.

Deinde robora venarum per ætatem decrescunt, uti nuper diximus, cum interim arteriarum robora augeantur. Hinc in cane vetulo venæ cavæ robur minus quam robur aortæ fuit, in ratione 1000. ad 1097. *d*.

*s* Exper. 23.

*t* Exper. 23. p. 100.

*v* Exper. 31.

*x* Exper. 41.

*y* Exper. 44.

*z* Cheselden anat. Edit. VI. p. 201.

*a* Wintringham Exper. 39.

*b* Exper. 35.

*c* Exper. 37.



§. IX. *Sæpe rumpuntur.*

Utcunque hæc se habeant, certum est tamen vivo animale, & in homine potissimum, venas longe frequentius, quam arterias, & intumescere & rumpi, ut videatur certè, densitas illa major venarum ad pericula dilatationum & ruptionum, valde necessaria esse. Varices, & hæmorrhoidum similes tumores, multo, quam arteriarum aneurysmata, frequentiores sunt. Arteriæ perraro rumpuntur, nisi longo tritu, quando in aneurysma intumuerunt, tunc enim sensim debilitatæ membranæ, tandem in convexitate sua divelluntur. Venarum ruptiones, & levi quidem de causa, aliquas citabo *e*. Feminarum gravidarum varices frequenter, etiam cum bonis mulierum rebus *f*, rumpuntur, aliquando vero minus utique feliciter *g*, & cum periculosa hæmorrhagia, ut nuper in domestica femina vidi. A retentis mensibus vena saphena *g*<sup>\*</sup>, poplitea, & cutaneæ venæ, & aliæ, etiam cum bonis ægræ rebus rumpuntur. Frequenter satis reperi, venam

*d* Exper. 43.

*e* Similia habent *Nov. lit. Storch Hebammen Unterricht* mar. *Balth. p. 49. Act. Morgunt. p. 531. Bausch in præf. ad L. de hæmatite*, hic quidem cum gravi hæmorrhagia.

*f* *Histor. morbör. Vratislaviens. p. 78. Vena malleoli sponte rupta in feminis varicosis Eph. Nat. Cur. Dec. 1. ann. 3. obs. 54.*

*g* Funesto cum eventu *Storch Hebammen Unterricht* p. 229. *Eph. Nat. Cur. Dec. 1. ann. 3. obs. 204. Brevi tempore funesta ruptio varicis, cum miro sanguinis saltu Fallop de ulceribus p. 58. Conf. Petit in Mercure de France 1733. Nov.*

*g*<sup>\*</sup> *Fabric. Sciagraph. Butisbac. p. 16. Wepfer apoplex. p. 26.*

cavam in pericardio *g\*\**, & alibi & supra hepar, tum saphenas, iliacas, venam portarum diffusisse. *Carolus XI.* cum amico ab urso periclitanti subvenire properaret, venam rupit *g\*\*\**. Ex rupta vena mors inter choreas, sanguine in abdomen effuso *g\*\*\*\**. Vena in temporibus præ verecundia amanti diffusit *h*, & a morte demum *i* crepuit. A vena jugulari sponte rupta mors *k*. Sic a vena cava *k\**, saphena *k\*\**, iliaca *k\*\*\**. In hydropico rupta basilica, sanguis ea vi profiliit, ut vix potuerit compesci *l*. In fene ex salvatella vena rupta, sanguis effusus *m*. Vena cava superior varicosa, funesto eventu rupta *n*. Ex glaciei usu vena sub hepate sponte aperta, & sanguis in abdomen effusus *o*. Vena poplitis sponte aperta, cum multa cruoris jactura *p*. In gravida diffusit vena cruralis *q*, talique vena *r*, & in puerpera

*g\*\** Salzmann in disp.  
*g\*\*\** Robinson p. 238.  
*g\*\*\*\** Smet miscell. L. X. p.  
*h* Diomedes Cornax in enchiridio p. 26.  
*i* Hagedorn Centur. III. Hist. 45.  
*k* Breslauer Sammlungen 1726. M. August. p. 254.  
*k\** Petrus Orteschi giorn di medic. II. p. 217. sub diaphragmate. Huen XI. p. 2.  
*k\*\** Journ. med. 1762.  
*k\*\*\** Targioni obs. p. 45.  
*l* Hoechstetter Cas. 7. Dec.

*m* Pechlin obs. 9. L. II. Conf. Bartholin Centur. V. hist. 19.  
*n* Fantoni ad Morgagnum Eoist. VIII. Lancisi obs. V. post lib. de mortibus subitaneis.  
*o* Louise Bourgeois observ. sur la sterilité &c. L. I. p. 221.  
*p* Helwig obs. 153.  
*q* Harder apiar. obs. 85.  
*r* Detharding diss. de ventriculi hæmorrhag. funesto event.

II.



vena dorsi pedis s. Sublingualis vena in dolore capitis sponte sanguinem fudit *t*.

Multis aliis exemplis hanc collectionem facile augerem. Verum suffecerit ostendisse, non nimis posse venarum robori tribui, neque tantam esse earum firmitatem, ut, ad vim, quæ sanguinem impellit, ea se habeat uti 27. ad 1. *u*. Neque enim ulla cum veri specie videtur fingi posse, in his, quos recensui, casibus, vim morbi sanguinem adeo incitasse, ut vis venam distendens fuerit, ad vim naturalem sanguinis in venam agentis, uti 27. ad 1. Aliqua enim horum exemplorum ex sanissimis hominibus sumpta sunt, alia manifesto ex restagnatione potius, quam ex novo aliquo impetu nata. Minorem equidem, quam arteriæ, vim patiuntur, cum non pulsant, si a paucis earum truncis, aut a morbis recesseris. Verum de eo venarum pulsu alias dicetur *x*.

#### §. X. *Diametrorum ratio ad arterias socias.*

Diametro venas arteriis superiores esse, dudum notum est, unico exemplo pulmonalis venæ excepto. Lumen reliquarum venarum ubique lumine arteriarum majus est, contenta vero sunt uti lumina, cum longitudines utrinque pares sint. Olim *Job. Alphonsus Borellus*

*s* Select. Francofurtens. T. *v* Hales hæmæstatiks. p. 158.  
 II. p. 7. *x* L. V. de sanguinis per  
*t* Eph. Nat. Cur. Dec. I. arter. & venas motu.  
 ann. 3. obs. 54.

y aream venosam totam ad totam aream arteriosam æstimavit, uti 4. ad 1. & *Bartholomeus de Moor* 2 lumina arteriarum, venosorum luminum fecit subquadrupla, si recte vocem *duplo majorem* ex icone interpreteror. Sesequialteram rationem luminum venosorum ad arteriosa recepit *Thomas Schwenke a*, potius nimis parvam. *Franciscus de Sauvages* ea lumina facit, uti 9. ad 4. b.

Mihi arteria aorta superiori cava vena in homine potius major visa est, & in diversis exemplis fuit aorta 52. vena cava 57. aorta 15. vena cava 25. vena cava 56. aorta 41. Ill. *Boissier* etiam diametrum aortæ ad eam venam fecit 23. 8. ad 23. c, superiorem enim venam cavam *adscendentem* vocat, siquidem eam minorem facit. In ariete vena cava superior superat, in ratione 1865. 1000. d, & in ove, in ratione 1737. ad 1000. e, secundum *Cliftoni Wintringhami* calculos, qui a meis non valde differunt. Nam Vir Cl. tunicarum crassitiem detraxit, qua aorta superat, ego exteriores diametros sumsi, quibus tunicæ una continentur. Inferior vena cava in homine manifesto quam aorta major est, & rationem luminum reperi 16. ad 9. alias cum parva esset 55. ad

y de motu animal. L. II. Prop. 68.

z Instaurat. Med. T. I. p. 42.

a Sanguin. histor. p. 21.

b Theor. pulsus p. 9.

c p. 4.

d Exp. 33. Diameter aortæ adscendentis est o. 41. descendens o. 55. Diameter venæ cavæ superioris o. 56. descendens o. 71.

e Ibid. p. 144.



§2. *Cliftono* eadem vasa sunt, in ariete quidem uti 1713 ad 1000. *f*, in ove uti 1715. ad 1000. *g*, quæ rationes a meis parum differunt; a sexu vero pendere videtur, quod aorta inferior pro portione venæ sodalis in feminis major sit. *F. Boissier* hanc rationem fecit 22. 8. ad 30. aortæ vero ad utramque venam cavam uti 100. ad 214. *h*.

Prope renalium arteriarum originem jam major venæ cavæ ad aortam ratio est, forte, quod multum interim ex azyga sanguinem hauserit, quem rami dudum ab aorta emissi eo deduxerant. Ergo eam rationem *Cliftonus* facit in ariete uti 4694. ad 1000. *i*, & in vetulo cane uti 437. ad 100. *k*,

Supra iliacas, venæ cavæ ad aortam rationem fecit *Idem Vir Cel.* 191. ad 100. *l*, enormiter majorem. Sed etiam *Jacobus Keilius* duorum magnorum truncorum, infra renalium vasorum originem, rationem fecit 324. ad 441. *m*, quæ ratio valde parva est.

Multo major ratio est in umbilicalibus vasis: arterias enim dimensus reperi ad venam se habere, uti 392 ad 900. *o*.

*f* Ibid. p. 143.

*g* Ibid. p. 144.

*h* Ibid. p. 4.

*i* Exp. 22. p. 100.

*k* Exp. 46. p. 201.

*l* Exp. 28. p. 100.

*m* *De secret. animal.* p. 93.

*o* *Conf. Comment. ad Boerhaav. T. V. P. II. p. 303.*

Splenicam venam ad arteriam facit *Cliftonus* uti 836. 100. *p*, quæ enormis ratio vix posset admitti, nisi ponas, in Cl. viri exemplo, venam hæmorrhoidalem, sive inferiorem mesentericam, in splenicam venam se immisisse, & hujus rationem auxisse. Ego reperi splenicam venam ad sodalem arteriam, uti 676. 156. & alias diam & 103. ut 33. ad 14.

Venæ renalis sinistræ ad arteriam suam rationem etiam hac ratione majorem reperit Cl. *Cliftonus*, omnino nempe 1156. ad 100. *q* & 1176. ad 100. *r*. Id tribuo insertæ in eam venam venæ spermaticæ, azygæ sinistræ, capsularis, & lumbalis, quæ venæ utique renalem venam sinistram sanguine suo augment, quem comes arteria non advexit, atque adeo merito hæc arteria, quam vena sodalis minor, est. Ego rationem arteriarum renalium ad venas reperi 614. ad 1590. & 731. ad 2056. quæ abeunt in rationem 1488. ad 3556. satis similem rationis, quæ ubique inter utrumque vasorum genus obtinet.

Mesentericas arterias ad venas suas facit *Keilius* uti 9. ad 25. *s*, ego uti 9. 16. uti 22. ad 35. uti 529. 1089. & uti 109. 361. quæ rationes fere cum aliarum venarum ad suas arterias rationibus conveniunt. *Keiliana* mihi nimia videtur.

Iliaca arteriæ ad suam venam rationem

*p* Exp. 39. p. 171,  
*q* Ibid.

*r* Exp. 46. p. 201,  
*s* l. *s*.



*Cliftonus* fecit 100. ad 164. *t*, valde parvam; sed etiam ego ea vasa reperi se habere uti 3844. ad 7396. vel uti 4. ad 9. iterum magis in ratione communi vasorum utriusque generis.

Cruralis arteriæ ad suam venam sectionem *Franciscus Boissier* facit 100. 217. *v*, distentis vero vasis, quod mirum, 87. 131. vel 2. 3. ex qua ratione sequeretur, venam minus, quam arteria, distentioni obsecutam esse.

Subclaviæ venæ rationem ad suam arteriam reperio 196. ad 81. venæ jugularis demum ad carotidem 441 ad 196. quæ ratio inter majores est.

Ex his omnibus, sumto quodam medio numero, habetur ratio non multum abluens a ratione 4. ad 9. inter arteriarum venarumque lumina.

Arteria spermatica cum venis in plexu pampiniformi comprehensis comparata, incredibili ratione angustior est. In minimis vasis continuo utrumque genus ex venarum majori crassitie distinguas. Venarum choriodearum, quæ vasa vorticosa vocantur, trunculi arteriolis ciliaribus mire majores sunt, sic venulæ intestinorum sodalibus arteriis. Arteriosi venosique retis comparisonem ex icone *Cheseldenii* non male institueris *x*. Optime vero apparet, quantum venæ superent, si & arteriam

*t* p. 100.  
*v* l. c.

*x* Tab. 30. edit. 6. *anatom.*  
*of hum. body.*

& venam cera repleveris, tunc in eadem corporis parte, ut in intestino, utrumque genus comparaveris. Certe ea arte arteriæ fere evanescere solent, obrutæ a mole & a numero venarum, ruberque earum, & validior, color a cæruleo venoso obtegitur.

Minimæ venæ arteriis non majores sunt, neque potuerunt, cum arteriolæ & venulæ, ut certo vidi, unicum globulum transmittant.

### §. XI. Numerus.

Non solum diametris, sed pariter numero venæ superant, observante dudum *Johanne van Horne y*, ut venas arteriis triplo numerosiores fecerit *Leonhardus Tassin z.* Ita area, sive lumen conjunctum omnium venarum, multo major fit conjuncto omnium arteriarum lumine, siquidem venæ sodalibus arteriis & majores sunt, & numero superant. Nam ingentia retia venosa plurima reperias, quibus ægre quidquam arteriosi admistum fuerit. Ejusmodi sub cute retia frequentia sunt, ut in collo illud, dudum ab *Eustachio a* depictum, in brachio supino, in dorso manus, digitorum cute, femoris parte inferiori, qua saphena utraque irretitur, sede malleolorum, tarsique *b.* Etiam interni plexus venosi passim repe-

*y* Multas venas esse absque arteriis fociis *de ductib. salival. diff. II.*

*z* *Administr. anat. p. 94.*

*a* T. XXVII. f. 5. 6. 7.

*b* Conf. *Hebenstreit de venis communicantibus. Cheselden l.*

*c. p. 191.*



riuntur, quos arteriæ paucissimæ comitantur, ut pampiniformis ille venarum spermaticarum plexus, & in urinaria vesica rete *c*, & plexus venosi pelvis multiplices, qui circa partes generationi dicatas ponuntur *d*, & pterygoideus ille, a *Santorino* dictus, & tonsillaris. Demum retia minima, soli microscopio accessæ, absque arteriis, certe conspicuis, in mesenteriiis animalium frigidorum reperio *e*.

Est ubi æquus sit arteriarum numerus, ut per intestina, ex summi viri testimonio *f*.

Est, ubi duo trunci arteriosi uni venoso respondent, in funiculo umbilicali, pene, clitoride, cystide fellea. Plures etiam arteriæ capsulares, plures renales, ad unicam utrinque venam plerumque reperiuntur. In iis exemplis venarum major diameter numerum compensat.

Sæpe reperio, uti dudum monui *f*<sup>\*</sup>, profundas arterias grandes esse, & minorem, & demum minimam aliquam venam comitem habere, exemplo vertebralis arteriæ, & lumbalis: venas vero sub cute multo, quam arteriæ, & majores esse, & numero superare, & minimos comites arteriosos accipere. Omnibus computatis, facile crediderim eandem causam,

*c* Eustach. T. XII. f. 1. T, mouvement du sang. exp. 119. XIII. 122. &c.

*d* Comment. ad Boerhaav. f B. Siegfried Albinus de T. V. P. I. p. 300. 418- 419. vasis intestinor.

*e* Second Memoire sur le f<sup>\*</sup> pag. 75. 76.

quæ fecit, ut *Natura* majores venas faceret, etiam fecisse, ut fingeret numerosiores.

### §. XII. *Locus.*

Loco venæ ab arteriis partim differunt, partim conveniunt. Plerisque locis sodales incedunt, ut in visceribus, cerebro excepto: & magni trunci artuum collique, pariter per cellulosa aliarum partium corporis intervalla migrant. Alibi se deferunt, ob varias rationes. Vena sine pari solitaria, absque arteria sui simili nata est, quod in tota illa longitudine, quæ pericardio, & hepatis fulco mensuratur, locus non fuerit, venæ in quo intercostales in cavam venam sanguinem suum reddere non possent. Itaque proprius truncus pro iis venis factus est, qui & supra pericardium, & infra hepatis adhæSIONem, in venam cavam earum sanguinem referat. In cerebro sinus alienis ab arteriis locis, secundum futuras ossiumve sulcos positi sunt. Cæteris locis ea lex est, quam alio loco tetigimus g, ut venæ musculis cutique interponantur, arteriæ quam profundissimo & tutissimo loco secundum ossa incedant. Unicum contrarium venæ cavæ exemplum est. Verum ea in abdomine tot visceribus protegitur, ut nulla violentia ad eam pervenire queat, quæ alioquin mortem non inferat. Divisiones, ut in arteriis, & retia ul-



timo perinde faciunt, quæ, nescio an satis firmiter ab arteriosis differre, atque rotundiora esse, Cl. *Hales* scripsit *b*. Venosum rete in ranarum mesenterio adprime acutangulum est.

### §. XIII. *Anastomoses.*

Inter truncos venosos majores, quam inter arteriosos, anastomoses reperiuntur, & consensus multo evidentior est, & sæpe magnas per venas vicini trunci uniuntur, quo loco arteriarum anastomoses per minutissimos furculos perficiuntur. Ita inter venam jugularem facialem, quæ ab interna est, & inter temporalem, externæ jugularis propaginem, insignis secundum maxillæ inferioris oram communicans truncus intercedit. Inter profundam brachii venam, & cephalicam, basilicam, & interosseam, miri circa flexum cubiti plexus dudum descripti sunt *i*. Vena sine pare cum utraque vena cava conjungitur. Venæ cerebrales plurimis locis per emissaria cum venis extra cranii cavam sitis uniuntur *k*. Vertebralem & temporalem magni rami colligant. Sinuum medullam spinalem comitantium artificiosissimi & numerosissimi arcus sunt, quibus cum venis extra ejus medullæ specum positis consentiunt *l*. Venarum vesicalium & clitori-

*b* *Hæmastatiks* p. 151.

*i* *Eustach.* Tab. VIII. f. 1.  
2. 3. 4.

*k* Vide passim in tab. bascos cranii, quæ est in *primæ iconum fasciculo.*

*l* *Prim. lin.* n. 227.

dearum, aut penis venarum, cum venis extra pelvim exeuntibus, adque genitalia vasa redeuntibus, miri plexus, & ægre exponendi intercedunt *m*. Vena faciei cum sinu cavernoso per ophthalmicam venam communicat.

#### §. XIV. *Alia discrimina*

In universum venæ mihi minus, quam arteriæ flexuosæ videntur. Facilis comparatio est in arteria venaque grandi faciei, in arteria & vena splenis, arteriis venisque ciliaribus. Inter divisiones, ramorum origines, & numerum multo plus, quam in arteriis, varietatis reperi: atque tanta hic naturæ inconstantia est, ut neque ego, cum arterias minute per plerasque corporis humani partes prosequer, unquam eum laborem adgredi sustinerim, qui ex simili venarum descriptione nasceretur. Tot enim descriptiones fieri necesse foret, quot fere cadavera sunt. Ita nempe in artubus, facie, externo capite, subcutaneis regionibus res se habet, nam in visceribus simplices, & satis arteriarum similes sunt. Venarum trunci perinde lumen lumine ramorum minus habent: & perinde vena cava proportionem ramorum suorum conjunctorum potest pro vertice coni haberi, cujus basis in omnibus venis minimis totius corporis ponitur. Neque hic rationes luminum valde diversas

---

*m* Dicentur in Tomo hujus V. P. I. p. 412. 413. 415. operis VII. Vide interim *Comment. in Boerb. prælect. T.* 416.



reperi ab iis rationibus, quæ in arteriis obtinent.

§. XV. *Valvularum in universum historia.*

Insigne discrimen arterias inter venasque *valvulae* faciunt, quarum historiam prius persequemur, quam de finibus venarum dicemus. Cavea nempe in arteriis, si a cordis proxima vicinia recesseris, undique libera est & pura. In venis, certè plerisque, in ea cavea propriæ, motum sanguinis regentes, membranulæ reperiuntur, omnibus animalibus calidi sanguinis communes.

Veteribus parum de his valvulis innotuit. *Dionysius Oxymachi* f. *n* dixit de *epanthismis* venarum, distinctis & adventitiis venarum receptaculis, obscure locutus, ut quid voluerit, haud facile sit dictu: ad valvulas certe aliqui eorum scriptorum traxerunt, quibus id præcipuum studium fuit, ut omnia recentiorum inventa ad antiquitatem transferrent.

*Fundam* venæ furalis, ad valvulas refert *Salomon Alberti* *p*, & *Theodorus Janson* ab *Almeloveen* *q*: mihi videtur curvatæ venæ hamulum ea voce intellexisse auctor libelli *de venis*, qui inter Hippocraticos *r* est.

*Theodo-*

*n* Apud *Rufum Ephesium* p. 170.  
*appellat. corp. hum. L. I. p.* *q* *Novantiqua* p. 228. *Ha-*  
 42. edit. *Clinchianæ.* *bet etiam Riolanus.*  
*p* *Histor. part. corp. hum.* *r* *De venis* n. 24.

*Theodoretus*, quem gloriæ valvularum de-  
tectarum participem esse voluit *J. Zacharias*  
*Petsche s*, *Galenum* unice secutus est, & de  
valvulis cordis egit.

Manifestius *Carolus Stephanus t* apophyses  
membranaceas dixit, quæ faciant, ne sanguis  
in hepar regurgitet, quæ eundem diutius in eo  
viscere morari cogant, & valvularum cordis  
similes sint.

Iterum evidentius *Jacobus Sylvius v* & ad  
hepar, & in vena sine pari, & in jugularibus,  
brachialibus & cruralibus, venis membranaceas  
epiphyfes posuit, quarum eadem cum mem-  
brana foraminis ovalis utilitas esset. Verum  
is vir Cl. potuit, quando hæc scripsit, de *Jo-*  
*hanne Baptista Canano* inaudivisse.

Nempe is incisor, ejus unicum &  
rarissimum opus superest, nihil quidem de val-  
vulis scripsit: sed ejus experimenta *Vesa-*  
*lius* refert *x*. Retulerat vesacco *Cananus*,  
in venæ azygæ initio *l*, venarum re-  
nes adeuntium. & venarum juxta elatiorem  
ossis sacri partem occurrentium, se membra-  
nas reperire, quales in ostio arteriarum ad cor  
sunt.

Præsente etiam *Canano*, & proculdubio  
demonstrante, *Amatus Lusitanus y*, alioquin

*s* In diss. a nobis recusa in T. VI. disput. anatom. n. 83.

56.

*t* De dissect. corp. hum. p. 183. 357.

*v* *Isagog. anat. L. I. c. 4* p. 22. *b*.

*x* *Exam. observ. Fallop. p.*

*y* *Centur. I. curat. §2. in*  
scholio. In duodecim cada-  
veribus hæc se vidisse adfir-  
mat.



non inter anatomicos recensendus homo, vidit anno 1547. ostiola in venæ sine pari principio, quæ intercederent, ne sanguis in eam venam receptus in cavam venam redeat: additque, ne aërem quidem impulsam ex vena sine pari in cavam redire, mendaci omnino experimento usus. Eadem ostiola, nihil ex vena sine pari in cavam admissura, idem hebræus homo repetit *z*.

In hoc etiam invento adparuit, quam iniquum imperium in eruditissimos etiam viros præjudicatæ opiniones exerceant. Valvulæ venæ sine pari, etiam Neapoli experimento confirmatæ, applausum non invenerunt, cum summis viris displicerent *a*. *Vesalius*, minime superstitiosus veterum cultor, in priori opere valvulas illas novas eminentem venarum corporis substantiam esse dixerat, quam comparabat cum iis membranis, quæ sunt in aortæ ostio *b*. Idem in posteriori libro *c* venæ crassitiem protuberantem se reperire, non valvulas, diserte scripsit. *Gabriel Fallopius*, eximius certe dissector, ostiola venæ sine pari neque in animalibus, neque in homine admisit *d*: *Bartholomæus Eustachius* etiam cum aliqua acerbitate easdem valvulas rejecit *e*. *Hippolytus*

*z* Centur. V. Cusat. 70.

*a* *Salvius Sclanus* in comment. ad aphorism. Hippocrat. 21. lib. I.

*b* *De fabric. corp. hum.* ed. 1555. p. 443.

*c* *Exam. obs. Fallop.* p. 83.

*d* *Observ. anat.* p. 118. *b*. de venis obs. 4.

*e* *De vena sine pari anti-* gramm. XI.

*Boscus* negat se reperisse. *J. Baptista Carcanus* nullas aut in ostio, aut in reliqua venæ sine pari longitudine, valvulas reperit, aëremque, id quidem vere, ex ea vena in cavam libere ire vidit & redire *f.* Ita *Canani*, veri valvularum inventoris, laus oppressa est.

In partem laudis cæterum *Bartholomæus Eustachius* venit, ob inventam valvulam coronariæ venæ, aliamque, cum qua ejus viri nomen conjungi solet, in aditu auriculæ dextræ positam.

Successit in gloriâ inventi discipulus *Fallopium Hieronymus Fabricius* ab *Aquapendente*, & anno 1574 g primum visas venarum valvulas, plurimis demum elapsis annis splendido opere depictas & descriptas edidit *h.* Neminem cæterum priorum citavit, in universum parum aut legere solitus, aut nuperos scriptores nominare. Post eum virum *Salomon Alberti* anno 1579. *i* valvulas venarum demonstravit, neque post ea tempora rara earum memoria fuit. Anno 1582. sibi visas esse *Henricus Smetius*. Citat etiam nuper inventas *Andreas Laurentius k.*

Cum adeo dudum ante tempora *Fratriis Pauli Sarpi* de valvulis venosis lites inter anatomicos agitatae fuerint, & cum is aliis laudi-

*f* *Anatomes* L. I.

tav. 1603. fol.

*g* Teste ipso *Fabricio*, & *C. Bauhino*, qui anno 1577. Patavium adiit.

*i* Post orationes p. 173. & in *historia plerarumque partium* ed. 1601. p. 153. seqq.

*h* De venarum ostiis Pa-

*k* *Hist. anat.* p. 128.



bus utique ornatissimus monachus diversissimis omnino negotiis vitam impenderit, non erat, cur ipsi hoc inventum tribueretur. Factum est tamen a P. *Fulgentio*, scriptore vitæ Cl. hujus viri *l*; a *Riolano m*, paucorum incisorum laudatore, quibuscum vixit, a *Johanne Walæo n* & a *Petro Antonio Molinetti o*. Confer hæc refutantem, dignissimum sui antecessoris vindicem, *J. Baptistam Morgagnum p*.

Sequitur, ut eamus per singula. Ultimis vitæ meæ academicæ temporibus plurimum in valvulis venarum constituendis & ipse laboravi, & excitatus a me discipulus *Petrus Castell*, qui etiam icones integrorum systematum per aquam fluitantium paravit, quæ mihi valvularum & videndarum & depingendarum melior ratio visa est. Nunc invenio, fîsum me diligentiae hujus juvenis, & alias occupatissimum, parcius, quam oportuerat, quæ mihi observata fuerant, in adversaria retulisse. Quid de iconibus factum, non rescivi. Quæ supersunt, cum aliorum auctorum laboribus conjuncta dabo.

*l* Addit honorificum certe modum, quo invenerit. Cum nempe ex theoria sanguinem in venas necessario relabi reperiret, cogitavit de valvulis, quæ relapsum impedirent, easque invenit apud *Gualtherum Charlton third lecture p. 19.*

*m* *Anthropograph. p. 346.*  
*Animadvers. in Walæum p. 613.*  
*n* Apud *Bartholinum in epistol. p. 774.*  
*o* *Disquisit. anat. patholog. p. 243.*  
*p* *Epist. anatom. XV. n. 68. &c.*

§. XVI. *Fabrica.*

Valvulæ venosæ in universum fiunt a membrana venarum intima, levi, quæ ex parte venæ a corde remotiori sursum, versus cor, & introrsum, in ipsam venæ caveam producitur, & ex margine lunato, in aciem extenuato, reflexa, in se ipsam redit, & deorsum, ad partem a corde remotiorem, contra se ipsam sibi que parallela, in membranam venæ intimam revertitur. Ita duo foliola, duæve laminæ, nascuntur, adscendens prima versus cor, eademque iterum descendens; figura pares, quas inter cellulosa tela intercedit. Directio fere est, qualem dixi, faciunt tamen ramorum venosorum suis cum truncis diversi anguli, ne situs valvularum constans esse possit. Dantur adeo inclinatæ valvulæ, quarum arcus cordi obversus cornu aliud superius habet, aliud inferius, dantur etiam inversæ, quarum cornua deorsum respiciunt. Cornua vero vocamus, marginis fluitantis liberique valvulæ fines acutos, cum pariete venæ connexos, aliquanto longiores eo margine, qui valvulæ finem superiorem late terminat. Ea cornua modo longiora sunt, modo breviora. Ab ea marginis liberi figura, cum antiquiori littera C. comparata, *Sigmoideas* valvulas *Albertus* dixit *q*. Aliquanto, quam reliqua valvula, is margo valentior est *r*.

*q* l. c. p. 163.*r* *Senac traité du cœur* T. II. p. 678.



In universum valvulæ tenues sunt, quæ ex membrana interna venarum tenuissima factæ sint: robur tamen aliquod habent, & splendidi aliquid, quasi tendinei, *Fabricio* jam observante. Utcunque vero robustæ sint, frequenter tamen reperio, a modico illo venosi sanguinis fluente lacerari eas, & mediis foraminibus, inter reticulatas fibras patere: ejusmodi valvulas laceras non in solo coronariæ venæ ostio, aut auris dextræ, sed per totum corpus passim vidi.

Imæ parti valvulæ, quæ cum vena cohæret, robustior s, & sæpe durior & callosa fere natura est, aggerem dixit *Morgagnus* t, Ill. *Senacus* *ux bourlet* v. Ejus convexitas aliquanto acutior est, & pars minoris circuli, quam in arteriarum valvulis, quæ cordi committuntur.

Figura in universum parabolæ est, cujus apex convexus deorsum respicit, sive a corde remotior est; latera sive duæ medietates discedentes, in tubum venæ sursum versus cor producuntur: atque adeo, valvulam inter & venæ parietem cavi quid intercipient, digitabuli simile x, quod nonnulli *finum* vocant, qui cæra repletus conum parabolicum refert. Verum ea parabola alias longior est, brevior alias. Rarum est non longiorem esse semicirculo: vidit tamen ejusmodi brevem valvulam Ill. *Se-*

s *Senac* ibid.

t l. c. n. 39.

v l. c.

x *Fabricius* l. c. T. II. f.

3.

nac y. In truncis cæterum majoribus parabola brevior esse solet, longior contra in ostiis ramorum minorum, quales valvulas *piriformes* novo nomine *Ruyschius* dixit z, & *Kerkringius* a, qui plurimum artifice *Ruyschii* manus usus est. Hi sunt tubuli digiti longitudine, ex venæ substantia conflati, quos in vena crurali *Riolanus* vidit b. Easdem valvulas *turbinatas* vocat *Theodulus Kemper* c, neque neglexit Cl. *Senac* d.

Is sinus est, in quo varix nascitur, quoties sanguis cum replevit & restagnat: perpetua augmenta capturus, ab ipso sanguinis pondere, qui deorsum nixus valvulæ longitudinem auget.

§. XVII. Numerus.

Numerus valvularum, quas natura conjugavit, non idem est ubique. In majoribus venis, quæ nullum ramum recipiunt, binatas fere reperio. Duæ sunt ad venæ jugularis internæ in venam subclaviam ingressum, duæ in iliacarum principio, duæ in cruris & brachii truncis ramisque majoribus, duæ in vena azyga. Duas etiam fere ubique vidit *Fabricius* e,

y Ibid. p. 677.

z De valvul. lymphatic. p. 10.

a Spicileg. observ. n. 4. f. 7. 8.

b Anthropograph. p. 347.

sed ea longitudo nimia est.

c In diff. de valvularum natura Jenæ edita ann. 1683. & recusa T. II. nostræ col. lectionis.

d l. c. T. I. p. 257.

e Conf. p. 4.



neque diffident, de majoribus certe ramis, *Salomon Alberti f*, *Claudius Perrault g* & *Petrus Senac b*. Sed neque in minoribus ramis nunquam conjugatas reperiās. Quoties duæ sunt, æquales esse solent, seque, quando extenduntur, totæ contingere, ut spatium venæ inane undique occupent. *Kerkringius i* inæquales vidit, ut earum altera duas tertias venæ occuparet, altera minor reliquum trientem teneret.

Tres valvulæ rarius mihi occurrerunt, in crurali tamen vena ternatas vidi, & in jugulari vena *Ill. Morgagnus k*, priorque *Theodorus Kerkring l*. Ternatas etiam *Perraultus m* pinxit, & *Bidlous n*. Etiam hæ caveam venæ suæ exquisitè claudunt. Quadrigeminas, aut quinquinas etiam rariores esse crediderim, neque unquam ipse vidi, neque credit *J. Adolphus Wedel o* venam rectè claudere: pro singulari adeo observatione habeo, quas *Kerkringius p* vidit, aut pinxit *Bidlous p\**.

Solitariae sunt, in minoribus primo ramis, ut in manus pedisque venis *q*, frequenter certe, unaque longiores; in spermatica etiam vena

*f* l. c. p. 171. & post orationes.

*g* *Essays de physique* T. III. p. 255.

*b* l. c. T. I. p. 257. T. II. p. 680.

*i* l. c. p. 13.

*k* l. c. n. 39.

*l* l. c. f. 1. 4.

*m* l. c. f. 1.

*n* T. XXIII. f. 8. etiam in jugulari.

*o* In progr. de valvulis semilunariis animalium.

*p* *Kerkring* l. c. f. 2. 3.

*p\** l. c. f. g.

*q* *Fabricius* l. c. p. 4. *Salomon Alberti* p. 171. *Perrault* l. c.

solitarias vidi, & in vena sine pari, sed etiam in jugulari solitariam dixit *Fabricius* *r*, & solitaria est, quæ ad ostium venæ coronariæ ponitur, & denique omnium valvularum maxima, quæ ab *Eustachio* nomen habet. Et ipsæ non raro, in artubus imprimis, totam venæ caveam tenent.

Alternum aliquem ordinem *s*, ut sedem deficientis valvulæ altera proxima excipiat, non reperi, neque *Senacus* *t*, neque credo cum naturæ his in rebus libertate hanc adfectionem consistere posse.

Aliquando valvulæ solitariae absque ramo in venis reperiuntur *v*: alii rami absque præposita valvula ex trunco prodeunt: alias ramus exeuns valvulam suam generat, cum ejus membrana intima, in trunci caveam producta, ipsa pro valvula sit *x*, cujus fabricæ evidentissimum exemplum est in cerebri sinubus. Alias loco valvulæ eminens, ut in arteriarum orientibus ramis, margo se effert. Vidi etiam in crurali vena loco valvularum, pontem ex intima membrana factum, transversum, dextro & sinistro sine emarginatum, per venam ivisse.

### §. XVIII. *Amplitudo.*

Sed minime dissimulasse oportet, omnino sæpe valvulas suum canalem non claudere;

*r* l. c. p. 3. aut gemellas. *v* Consentit Ill. *Senacus* l.

*s* Ut *Fabricio* visum p. 5. c. p. 679.

& *Salomoni Alberto* l. c. *x* Etiam hic eadem est Cl.

*t* T. II. p. 680. *viri* observatio ibid.



quod olim de geminis valvulis *Fabricius* *y*, ejusque discipulus *z*, de valvulis autem ad originem ramorum positis *Ill. Archiattrorum Gallicorum comes* refert *a*. *Harveius*, cujus ex re erat, ut fidelem custodiam tenerent, valvulas geminas credebatur accurate venam claudere, de solitariis fatebatur, sanguinem non satis exquisitè ab iis retineri *b*. Hinc minime rarum est, ceram contra iter a valvulis definitum, artus replere. Verum de ea contra circuitum sanguinis mota objectione, proprius dicendi locus erit.

#### §. XIX. Unde absint.

Sed per singula eundem est, & valvulas venosas hic enarrare oportet, ne frequentes repetitiones lectori molestæ sint. Valvulam ostio venarum coronariarum præpositam, alteramque *Eustachianam* interim omitto, suo loco de iis ostiolis dicturus. Infra eam, quam continuo dixi, membranulam, ad venas usque iliacas nullam certe valvulam admitto, nimis sæpe expertus, in vena cava aperta, inque aqua pura natante. Consentientes habeo viros clarissimos, quos honoris causa cito *g*.

Ergo rejicienda erit valvula, quam hepar inter & diaphragma vir cæterum suis meritis

*y* l. c. p. 4.

*z* *Salomon Alberti* l. c. p. 163.

*a* l. c. p. 679. 680.

*b* l. c. p. 120. 121.

*g* *J. Ernestus Hohenstreit de venis communicantibus.* J. B.

*Senac* T. I. p. 258.

illustris J. Fridericus Cassebohm *h* descripsit, nisi forte Eustachianam illam voluit.

Rugas sive valvulas ad ostia venarum hepaticarum proposuit olim Jacobus Sylvius *i*, tum ipse Vesalius *k*, alique *l* nuperi etiam anatomici, ipse certe Winslowus *m* & Wintringhamius *n*. Procurrentes utcunque margines non refutavero, quales ad majores ramos, oblique in truncum insertos, superne fere nascuntur. Valvulas veras, aut quidquam earum simile non reperio, neque reppererunt clarissimi viri J. Riolanus *o* & Petrus Senac *p*, & ante omnes Fabricius *q*. Neque valvulam ad utrumque ductus venosi ostium nuper etiam repetitam *r* video, neque multum ei tribuit Ill. Tremius *s*.

Sed neque Theoduli Kemper *t* valvulas ad insertionem venarum phrenicarum, adiposarum, aut lumbalium positas reperi, neque Petruccianam *v* aliam ad ingressum venæ capsularis positam,

*h* De sectione viscerum p. 61.

*i* l. c.

*k* Icon. XIII. L. III. c. 5.

*l* Fabricius l. c. T. III. R.

S. in explicatione tamen melius mentem declarat, neque valvulas admittit. Thomas

Bartholinus in anat. tert. renov. p. 137. H. Meibomius

de venarum valvulis in capreolo. Salomon Reisel Eph.

nat. cur. dec. I. ann. IX. X.

obs. 141. etiam icone addita.

*m* Exposit. anat. T. IV. n. 109.

*n* l. c. p. 221.

*o* Anthropograph. p. 346.

*p* l. c.

*q* Explic. tab. III. l. c.

*r* Huybert in disp. de valvulis intest. & venar. n. 14. Leid. 1744.

*s* De differ. inter homin. nat. & non nat. p. 44. sed de iis valvulis alibi dicetur.

*t* l. c. p. 29.

*v* Spicileg. anatom. T. I. f. 2. 3.



aut similem a *Glissonio* dictam x, dudumque rejectam y.

Quas ad ostia emulgentium venarum numerosi, & clari, viri dixerunt z, aut in renalibus ipsis a alii, eas neque ego reperi, neque iidem, quos non dudum laudavi viri b, aut ipse dudum *Fabricius* c.

In cavæ venæ trunco, circa renum sedem, olim valvulas descripsit *Salomon Albertus* d. Eas, mihi ignotas, refutavit inventor *Fabricius* e, alique f.

In renali vero vena, ad ingressum seminalis venæ, ostiolum repertum fuisse g, contra egregios viros minime negavero. Etsi enim non eo loco, tamen in seminalibus vasis unam alteramque valvulam, aut par unum alterumve utique reperi, tum alii clari viri, & nuper industrius & optimæ spei juvenis *Alexander*

x l. c. p. 436.

y A. Schelhammero in programm. valedictor. n. 28.

z *Salomon Albertus* l. c. p. 159. & post orationes p. 172.

J. Riolanus animadvers. ad C. Baubinum p. 693. Isbr. v.

Diemerbroeck p. 493. Th. Kemper l. c. Cl. Wintringham l. c.

a J. Riolan anthropograph. p. 347. C. Baubin in theatr. anat. p. 75. Adr. Spigel anat. p. 244. Highmor disquisit. anat. p. 75. T. X. f. i. G. Harvei l. c. p. 121. Isbr. v. Diemerbroeck.

b J. E. Hebenstreit, Senac l. c.

c Negat. in venæ cavæ trunco valvulas reperiri. Expl. T. III.

d Histor. part. plerarumque corp. p. 159. post orationes p. 172.

e l. c. p. 3.

f Thomas Bartholinus p. 595.

g Guern. Rolfinck disput. anat. p. 941. Isbr. v. Diemerbroeck anat. p. 494. Bloemesteyn de administr. anat. p. 16. J. E. Hebenstreit l. c. J. Fr. Casselobm. Alex. Monroa l. eod.

*Monroo*, *Alexandri* Filius. Unam habet *Plaz-*  
*zonus* *h*, unam alteramve *Highmorus* *i* & *J.*  
*Zacharias* *Petsche* *k*, multas alii *l*. In viris  
 unice, sed duo, quinque & sex demum paria  
 vidit *Monrous* *m*: rejecit, forte aliis cadaveri-  
 bus, & muliebribus usus, *Cl. Hebenstreit*. In  
 bestiis quadrupedibus frequentiores adfunt *n*.

In universo systemate venæ portarum hu-  
 mano nulla unquam valvula reperta est, quæ  
 adnotatio non nova est, & a clarissimis viris  
 occupata o. In animalibus vero quadrupedi-  
 bus utique, & quidem in mesentericis & hæ-  
 morrhoideis, gemellæ ad ortum ramorum re-  
 periuntur, ut in equo *p*, cujus etiam in lienalibus  
 vasis ejusdem animalis *Entius* *q*, aliique  
*r* valvulas reppererunt.

In vasis equidem brevibus, quæ ex ventri-  
 culo ad venam lienalem veniunt, valvulas di-  
 xit magnus auctor *Harveius* *s*, cujus auctori-

- |   |   |
|---|---|
| <i>h</i> De part. genit. mulier.            | <i>n</i> <i>Monroo</i> p. 15.               |
| p. 100.                                     | <i>o</i> <i>J. E. Hebenstreit</i> l. c.     |
| <i>i</i> <i>Disquisit. anat.</i> T. X. f.   | <i>Senac.</i> T. I. p. 258.                 |
| 1.  | <i>p</i> <i>Ruyfch. advers. anat.</i> ll.   |
| <i>k</i> <i>Observ. miscellan.</i> n. 64.   | <i>n. 1. Riolan anthropograph.</i>          |
| 65: recus. in T. VI. collect.               | p. 347. <i>G. Harvei</i> l. c. p.           |
| nostr.                                      | 121. <i>Bartholinus</i> l. c. p. 595.       |
| <i>l</i> <i>Regner de Graaf de organ.</i>   | <i>Leonh. Tassin</i> l. c. p. 177.          |
| genit. viril. p. 21. <i>J. Fan-</i>         | <i>Bourgelat hippiatrice</i> T. ll.         |
| <i>tonus diss. anat.</i> p. 163. <i>Ad-</i> | p. 356.                                     |
| <i>de Dionis Cours d'anat.</i> p.           | <i>q</i> <i>Oper omn.</i> p. 101.           |
| 257. <i>Welsch tab. VI. anat.</i>           | <i>r</i> <i>Joh. a Muralto vademec.</i>     |
| 51. <i>Molinet.</i> l. c. p. 314.           | <i>anat.</i> p. 219. <i>C. Bauhin</i> l. c. |
| <i>m</i> <i>De semin. &amp; test.</i> T. I. | p. 75. <i>Phil. Jac. Hartmann</i>           |
| f. 1. 2. Pingit autem duo                   | <i>de bile c. 1. n. 9.</i>                  |
| paria, l. c.                                | <i>s</i> <i>Exerc.</i> ll. p. 182.          |



tas etiam alios impulit *t*. In lienalibus vasis iconē expressit *Nathanael Highmor v*. Verum de mesentericis venis recte negat *Schraderus x*, de lienalibus *Dominicus de Marchettis y*. In nulla enim ad portas pertinente vena in homine aut incisione facta valvula adparet, aut ex renixu ægrius ex trunco in ramos relabentis liquoris adgnoscas, quem injeceris.

Uterinæ venæ totæ absque valvulis sunt *z*, ut ipsæ connexæ cum uterinis feminales venæ mulierum, per ea quæ modo diximus *a*. In umbilicalibus venis, quando per funiculum decurrunt, rugas aliquas reperimus, non satis valvularum nomine dignas *b*, & quæ iter aëris aut sebi impulsæ ex funiculo in fetum omnino non morentur. In placenta rami earum venarum extra valvularum suspicionem ponuntur. Sed etiam pulmonalis vena absque valvulis est *c*, & interiores venæ cerebri, in homine nempe, nam in cane *d* & ove valvulas in pulmonis venis alii *Cl. viri* dixerunt *e*. Neque in venis coronariis cordis, præter ostiola, valvu-

*t* R. Lower de corde p. 217. edit. Leid.

*v* Disquisit. anat. T. VI. p. 61.

*x* Obs. anat. 6. Dec. I.

*y* Compend anat. p. 29. edit. Patav.

*z* Hebenstreit l. c.

*a* Monroo l. c. Conf. interrim. Comment. ad Boerhaav. T. V. P. II. p. 305.

*b* Prim. lin. physiolog. n.

53. Senac T. II. p. 677. Willis Pharmac. ration. T.

II. n. 9.

*c* Lancis. de corde & aneurysm. p. 67. Kemper l. c. p. 31.

*d* Ita dudum ipse Fabricius monuit p. 3. tum Salomon Albertus p. 171. & Johannes Swammerdam post disput. de respiratione corollar. 13.

*e* Prim. lin. physiol. p. 11.

las reperio. A vasis minoribus per totum corpus humanum ubique absunt, neque fere reperiuntur in venis, quarum diameter linea minor sit *f*. In animalibus frigidi sanguinis nullas reperi *g*, neque in rana *Johannes Swammerdam g\**, & *Antonius de Heide h*.

§. XX. Ubi reperiantur. In cava inferioris ramis.

Diximus, ubi nullæ sint valvulæ, superest ut dicamus, ubi reperiantur. Ergo, ut inferioris venæ cavæ ramos sequamur, initium valvularum in iliatis venis est. Eæ & in sua ex divisa vena cava origine nonnunquam gemina ostiola nactæ sunt, & alias geminatas, variis incertisque sedibus inter eum ortum, fulcumque osseum, per quem in femur exeunt, valvulas. Vidi enim superius, quam hypogastricæ origo est, vidi prope eam originem, vidi in ipso ortu hujus insignis propaginis, & vidit olim *Guilielmus Harveius k*, si eum virum recte intelligo. Propius inguen valvularum jugum *Fabricius* depinxit *l*. Non tamen valde numerosa paria sunt, quæ iliatis venis continentur.

In hypogastricarum venarum propaginibus, quæ neque uterum adeunt, neque vesicam; maxime vero in penis *m* aut clitoridis venis,

*f* Centur. obs. exp. 9. 10.

*k* l. c. p. 121.

*g* F. Boissier de Sauvages in hamast. p. 63.

*l* l. c. T. V. M. O.

*g\** De respirat. coroll. 13.

*m* Cooper myolog. reformat. fig. 10. Hebenstreit l. c.

*h* Hebenstreit l. c.



numerofæ valvulæ funt. Eas ego, perinde ut in reliquo corpore humano, ita difpofitas femper reperi, ut fua cornua cordi, convexam radicem peni obvertant: neque fatis intelligo, quid Cl. viro J. *Wilhelmo Albrecht* n impofuerit, ut contra notiffimum valvularum officium, lunata cornua peni, fundum cordi obvertere fcripferit.

In vena crurali, priufquam inde faphena prodeat, numerofæ valvulæ funt, & geminæ o, & folitariae, & ramis præfectæ, & abfque ramo media in vena pofitæ. In ipfo faphenæ oftio duas valvulas p vidi, quæ id oftium totum occuparent, & expansæ clauderent.

Deinde in vena crurali, infra faphenæ exortum, iterum, & frequentiores conjugatas q, & folitarias video, tum in trunco venæ, tum in ramorum originibus, quas longo ordine in commentarios retuli, hic vero, ut rem tædii plenam, neque constantem, repetere fuperfedeo. Multi rami, non parvi foli, fed ex majoribus, abfque valvula funt; funt alii, qui in finum valvulæ alicujus trunco venæ cruralis proprium fe immittant, & præterea fuam propriam valvulam habeant, quæ in directione fui rami pergat, inque eum, quem dixi, finum producat: atque in iis exemplis fanguis

n *Obferv. anat.* VII.

o Binatas pingit *Fabricius*  
T. V.

p *Idem ibid.* N. O.

q *Fabricius ibid.* O. O.

guis ejus rami videtur trunci sanguinem repellere. Etiam triplicem, quam citavi, valvulam in vena crurali reperi.

Sic in poplitea vena se res habet. In ostio venæ saphenæ minoris valvulam grandem vidi, & in reliquo trunco parvas cum parvis ramis valvulas, ramosque absque valvulis, paulo aliter, quam Vir Ill. *r* qui in hac vena nonnunquam paucissimas valvulas vidit. Quoad hanc venam persecutus sum, fere ad imam tibiā, pleræque valvulæ conjugatæ fuerunt. Ita *Fabricius* duas omnino solitarias *s* in crurali vena ad mediam tibiā usque valvulas habet, reliquas conjugatas. Geminam in poplite valvulam pinxit *Salomon Albertus t*, & de geminis fere in crurali vena loquitur *v*.

Saphenæ venæ valvulas in commentariis meis non reperio. *Fabricius* supra genu geminatas *x* fere, & unicam solitariam *y*, in tibia semper geminas; inde ad extremum pedem usque simplices *z* magno numero delineat, etiam *Alberto* consentiente *z\**, ut in ea sede raro simplices intercurrent. Ramos etiam aliquos cutaneos femoris & tibiæ; idem Patavinus Doctor *a* iconibus exprimit, in quibus pleræque valvulæ solitariae, aliquæ geminae sunt. Donec, ut in minoribus venis per totum corpus humanum,

*r* J. B. Morgagnus epist.  
XV. p. 162. n. 70.  
*s* Tab. VIII,  
*t* l. c. p. 172. 173.  
*v* p. 171.

*x* T. V. VI.  
*y* T. VI.  
*z* T. VI. VII.  
*z\** l. c. p. 171.  
*a* T. IV.



ita in pede, valvulæ evanescant, uti alibi monuimus.

§. XXI. *In vena cava superiori.*

Hæc ad inferiorem cavam pertinent. Inter ramos superioris venæ cavæ prima se offert, quæ sine pare est. De ejus trunci ostiolis prima controversia fuit. Et omnino quidem pro *Fallopio* & *Eustachio* b aliisque claris viris c dici potest, constanter, nullo certe contrario eventu, quem mihi vidisse contigerit, liquorem venæ cavæ injectum facillime totam venæ sine paris longitudinem relegere, omnesque ejus ramos replere. Ut minus mirum sit, eos viros valvulas ab ea vena jussisse exulare.

Cum vero non repertarum partium, ad tollendam fidem earum, quæ repertæ sunt, parva omnino vis sit, omnino præstitisset ita sua experimenta retulisse, ut alienis non fuisset derogatum. Quatuor alias in vena sine pari valvulas reperit *Job. Riolanus* d, alias primam in confluyente cum cava vena, duas in medio caudice, tum in venis intercostalibus aliquas: alias unicam vidit e. Ejus viri fere verba repetiit *Guern. Rolpink* f. Aliquas etiam ejus ve-

b *Antigramm.* IX.

c *Salom. Albertum* post orationes p. 171. *Andream Laurentium hist. anat.* p. 126. 463. *C. Bartholinum Instit. anat.* p. 359. *Cl. Kicsewetter de calculo renis sinistri fre-*

quentiori n. 13. Citat autem *Cassebohnmium.*

d *Anthropograph.* p. 346. *Enchirid. anat.* p. 230.

e *Idem ibid.* p. 222.

f *Diff. anat.* p. 972.

nae valvulas habent P. A. *Molinettus* g & *Thomas Bartholinus* h. Et in ostio & in reliquo decursu ostiola ponit *Theodulus Kemper* i. *Lancisius* k membranofum fornicem ostio venæ sine pari præfectum, musculofo semicirculo muniri scripsit post *Vesalium* k\*. Prope ostium *Petrus Senac* valvulas reperit l, & ad orificia ramorum azygæ *Casimirus Christophorus Schmiedel* m. Et in ostio, quo in cavam patet, & ad fines intercostalium ramorum valvulas vidit Cl. *Hebenstreit* n, adque eos fines *Henricus Albertus Nicolai* o.

Plurimum in valvulis ejus venæ laboris posuit J. B. *Morgagnus*. Et sphincterem quidem verum non vidit p, crassiolem aliquanto marginem admisit. In vena ipsa modo nullas valvulas vidit, modo aliquas, ostio superiori vel propiores, vel eo ab remotiores, frequentius tamen aliquas p reperit. Earum cornua fursum respiciunt.

Ego in ostio quidem, quod in venam cavam patet, nullam unquam valvulam vidi, passim autem aliquas, qua parte per vertebra thoracis decurrit. Videtur adeo libertatem hic aliquam natura sibi indulgisse, neque constan-

g l. c. p. 243.

h *Anat. tert. renov.* p. 637. 20.

i l. c. p. 30.

k In epist. de vena sine part.

k\* *Exam. obs. Fallop.* T. 34.

ll. p. 795. Ed. Leid.

l l. c. T. ll. p. 679.

m *De varietat. vasor.* n.

n l. c.

o *De direct. vasor.* p. 92.

p Vide *Epist. anat.* XV. n.

q Ibid. n. 35.



tem fabricam sibi præscripsisse. In venis intercostalibus non memini me valvulam vidisse.

Proximæ sunt maximæ illæ geminæ valvulæ, quæ in ostio venæ jugularis internæ, aut in ejus venæ, si malueris, a vena cava recessu ponuntur, facile enim, & facilius in dextro latere, jugularis interna potest pro cavæ venæ trunco haberi. In eo ergo confluyente duæ valvulæ sunt, quas recte *Fabricius* *r* olim, deinde *Ruyfchius* *s* constituit. Earum anterior alia est, & posterior altera *t*, non sine aggeribus *v* utraque, qui sanguinem in cor admittant, resistent a corde reversuro. Non tamen solent injectos liquores sebumve morari, neque in equo solo *x*, sed nec in homine. Sanguinem enim a corde refluum in omnibus animalibus *y*, quæ eum in finem aperui, vidi per venam jugularem, dum exspirabat animal, sursum refluere, ut ipsum demum cerebrum cogat intumescere. Cum vero ea vena super omnes alias dilatabilis sit, videtur a natura parata esse, ut sanguinis pars, quoties per pulmonales viam minus libera est, in eo quasi receptaculo finem hujus moræ expectare possit *z*, quales sinus in animalibus amphibis, caput diu sub aquam mergentibus, alias describemus. Ita in adfectu animi tristi, in nixu, in pectoris in-

*r* T. I. A.

*s* Thes. anat. VII. n. 69.

*t* Morgagn. l. c. n. 39.

*v* Ibid.

*x* Hales hæmæstat. p. 14.

*y* Second Memoire sur les parties irritables & sensibles Section IV. Exp. 96. ad 112.

*z* Conf. J. Zachariam Pet-sche l. c. n. 57.

Inflammationibus, dum facies tumet, & sanguine suffunditur, custodiam harum valvularum minus fidelem esse, suspicio est vero proxima. In fetu officium eorum ostiolorum magis necessarium videtur, quando caput cernuum præit, atque adeo proprii sui ponderis vi sanguis in collum & caput relabitur *a*.

In sinistra vena jugulari interna, inque sinu valvulæ posterioris, alia celebrata valvula ponitur, quæ ostio ductus chyli ferri præest: & quam possis pro anulo hymeni simili, aut pro duabus lunatis valvulis habere, quando in aqua natat. Commune videtur huic ostiolo cum aliis valvulis officium esse, cavere, ne sanguis in ductum thoracicum relabatur. Proprius autem huic valvulæ describendæ locus dabitur.

In reliqua venæ jugularis internæ longitudine video, *Riolanum b* valvulas sibi inventas tribuere, alios autem claros viros, & ante *c Riolanum*, & post eum *d*, easdem recipere, & in cerva binata ostiolorum juga *Parisinos* describere *e*. Ego quidem aliquid simile me vidisse, aut nodulos in ea vena tumidos reperisse, non memini; neque in vena jugulari cerebri, aut ejus ramis valvulæ sunt:

*a* Idem ibid.

*b* *Anthropograph.* p. 346. *animadvers. in Bartholinum* p. 787.

*c* Ut ipse *Fabricius*.

*d* *Thomas Bartholinus* l. c.

p. 595. *Hebenstreit* l. c.

*e* *Memoires pour servir à l'histoire des animaux.*



neque in vertebrali, sinubusque spinalis medullæ.

Contra, in externa jugulari valvulas negavit se invenire *Riolanus f*: admisit autem aliquas, ad magnorum ramorum insertionem positas, nuperus Vir Clarus *g*. Unam, & non sine suo stupore, corniculis suis deorsum spectantem, vidit *J. Rudolphus Salzmannus h*, veri itineris sanguinis ignarus.

In ramis facialibus, lingualibus, tonsillariibus, aliisque venæ jugularis internæ ramis, qui extra cranium manent, utique, & numerosæ, valvulæ sunt, obstaculo futuræ, ne aut liquor, aut sebum, ex vena jugulari in linguæ, faucium, aliasque exteriores capitis venas, facile subeat.

In subclavio trunco haud raro duas reperi; unam tamen haud longe a jugularis venæ exitu inventor *Fabricius* depinxit *i*: deinde solitarias aliquas, tum in trunco *k*, tum in ramo cephalico *l*. Sed ego quidem in toto brachii systemate frequentissime geminas valvulas vidi, & in brachio aut cera repleto, aut in vivo homine, post injectum vinculum sanguine turgente, facile juga nodorum conspiciuntur. In trunco basilicæ inter originem profundæ venæ, & cubiti flexum, quatuor fere paria reperi,

*f* l. c. p. 787.

*g* *Hebenstreit* l. c.

*h* *Observ.* p. 49.

*i* *Fabricius* I. II.

*k* *N. O. P. Q.*

*l* *L. M.*

totidem etiam in vena profunda conjugationes. Mediana absque valvulis est, tum quæ cephalicam spectat, tum quæ basilicam.

In minoribus brachii venis plexuque cubitali toto valvulæ numerosæ sunt. Earum pleræque geminæ, aut in ramorum originibus sedent, aut ab ostiis ramorum remotæ per truncum sparguntur. Solitarias paucas reperio. Robustæ fere sunt, uti perinde valvulas venarum pedis firmas reperio.

### §. XXII. *Quas sedes teneant.*

His omnibus collectis adparet, utique in venis ad perpendicularum positis, brachii, pedis, penis, feminales, jugulares, & sine pari, pleraque valvulas reperiri, ut sagax sensit *Georgius Cheyne m*: inter transversas tamen in vena subclavia. Deinde pleraque utique valvulas artus occupare *n*, & corporis superficiem cuti viciniorem, ut in profundis vasis, vasive viscerum, vix ullæ reperiantur. De illis monuit *Guilielmus Harvey o*, de istis *P. Senac p*: ut tamen hic memor sis valvularum venosarum cordis, Eustachianæ & coronariæ. Quadrupeda animalia vivipara plures, quam homines, valvulas nacta esse videntur. De officio nondum potest dici, cum id itineri sanguinis

*m Philosophical princip. of relig. p. 350.*      *o De motu cord. & sang. diff. II. p. 182.*

*n Conf. III. Senac. T. I. p. 257.*      *p l. c. T. II. p. 679.*



regendo destinatum sit, & de eo itinere nondum sermo fieri possit.

§. XXIII. *Venarum fines. Ex arteriis. Ex tela cellulosa.*

Unice superest, ut de finibus venarum dicamus. Alter, notissimus, finis est ad auris sinusque dextri cordis confinia, & ad sinum sinistrum. Sed alter finis multiplex, neque undique perspectus est.

Ex arteriis quidem rubris, rubras pariter venas continuari, dictum est. A ductubus excretoriis nasci non videtur probabile, etsi passim aliqui eorum ductuum per venas inflari possunt, & imprimis ut sæpe vidi, ureter *q*, qui vicissim impulsos liquores ad venas reddit; deinde ductus hepaticus *r*, & ductus galactophori mammarum. Verum, cum ductus excretorii suum liquorem non ad sanguinem, sed ad destinatam aliquam caveam vehant, non est veri simile, eos humorem, frustra a sanguine excretorio separatum, continuo in sanguinem venosum reddituros esse. Videtur, ostiola venosa & urinifera ampla esse, ut ex uretere per arteriam in venam, non inde longe natam, aer aut impulsus liquor transeat. Venosum tamen ostium utique latius esse necesse est.

*q* Conf. *Comper ad Bidloo sens de la structure des visceres.* Addit in arteriam non

*r* Per venam cavam, perque venam portarum *Vieuss-*

Sed altera princeps origo venarum est ex caveis, in quas arteriæ aliquid exhalarunt. Aliquæ harum venarum sanguinem ipsum reducunt, exemplo venarum penis, clitoridis, corporis cavernosi papillæ muliebris, cellulosæ telæ, quæ sub cute nonnullorum animalium est s, quibus cristæ, aut palaria rubent.

Aliæ humorem a sanguine diversum revolvunt. Uti vero exhalatio multiplex dicta est, ita totidem sunt resorptionis venosæ genera, ex universo cutis ambitu, ex cellulosa tela subcutanea & pulmonali, ex magnis corporis humani caveis, ex ipsis vesiculis feminalibus s\*, ex viis aëris, alimenti, urinæ, feminis, ex folliculis variis & cryptis glandulosis. Cum his omnibus caveis venas connecti per experimenta ostendemus. Video nimium hæc argumenta evictura, nempe non solum earum venarum ad eas caveas patula utcunque ostia, sed itineris præterea directionem, quam potueram tamdiu reservasse, donec circuitus sanguinis descriptus esset. Verum cum omnino idem experimentum, & venarum cum iis caveis consensum, & una humorum iter ostendat, non potui, quæ natura conjunxit, separare.

Inhalationem, sive humoris per cutem resorptionem, proprio loco ostendemus t. Sed

s De iis resorptionibus suo lymph.  
loco dicitur.

t Conf. interim Comment.

s\* Mekel obs. nov. de vas. ad Boerb. T. III. n. 416.



etiam ex cellulosa tela undique venæ reſorbent. Primum enim a venis in eam cellulofam telam via liberrima eſt, in quas impulſa aqua facillime, tamen etiam ſebum calidum, adeps porcinus, hydargyrus, gluten piſcium, aër de- mum viam ſibi aperiat *t*\*.

Eam autem viam a cellulis in venas ducere, natura ipſa venæ demonſtrat, quam alibi evincemus, & quæ a corporis ambitu ad cor, non unquam contrario ductu humoribus vehendis patet. Deinde ſanguis non reſorbetur ſolum ex cellulosa tela, ſed in ſanguinis viam redit, quæ certe per venas ſolas ducit. Ex cellulosa tela pulmonis humorem in venas ſanguinemque redire, pariter ſuo loco evincemus *v*. Primum etiam alii liquores in ea ſpatia effuſi in ſanguinem redeunt, aër effuſus, aqua hydropica, humores artificio aliquo ſub cutem impulſi, denique ſanguis ipſe reſorbetur, qui per adipoſas cellulas ſtagnavit, quando primum in ſeri flavi tenuitatem reſolutus fuit. Vidi enormem vim ſanguinis, ex lapſu, effuſi primum cellulofam telam cuti capillatæ capitis ſubjecta inundaffe, ut tumor ſex uncias longus, & quatuor altus eſſet: verum paulatim proprio pondere deſcendens per cellulosa ſpatia ſanguis ſe in palpebras, & ſuperiorem faciei partem diffudit, ut æger æthiopis fere colorem referret. Ita intra paucos dies, fomentis calentibus, venæ ſeſtione, & purgantibus me-

*t*\* p. 40. 44.

*v* Conf. interim prim. lín. phyſiolog n. 272.

dicamentis adhibitis, is omnis sanguis evanuit: quem, cum cutis non emisit, in sanguinem resorbtum fuisse nemo dubitaverit *y*. Sanguis in tunicam cellulofam testis effusus, sponte resorbtus *z* est. Alia habet *Boerhaavius a*. Deinde in sanguinis massam resorbtum humorem recipi adparet, cum ab universali fustigatione sanguis cum tussi, vomitu, fæcibus & urina egestus sit, & tamen æger convalescit *b*.

Sic hydropis absque manifesta evacuatione sanati exempla existant, cujus aquas in sanguinem resumtas fuisse necesse est *c*. Oedema vomitu sanatum fuisse *d*: & aquam inter cutem, quæ totos artus monstrifice distenderat, per purgationes validas subsidere, notissimum est. Aer, qui emphysema fecit, post aliquot dies evanescit, si æger convalescit, procul dubio cum vaporibus cellulosæ telæ mistus, & in iis, ut in aqua solet, dissolutus, perque easdem venulas resorbtus. Opii solutio in canibus sub cutem infusa, vehementissima symptomata excitavit, convulsiones, soporem, & canem denique, cum totius corporis rigore, enecavit *e*, ei adeo opii resorbta.

Tunicæ vaginalis cavea de natura cellulosa

*y* Facile fieri *Schwenke* l. c. 314.

p. 99.

*z* *T. II.* p. 73.

*a* *Prax. Med.* T. I. p.

*c* *Rich. Mead monita medic.* p. 154.

*d* *Spindler obs.* 82.

544.

*e* *Lorry apud Vandermonde*

*Wepfer de apoplex.* p. 313. *Journ. de Medic.* 1756. n. 1.



est. Ex ea aqua per venas, ut in aliis ventribus, inhalat *f*.

§. XXIV. *Ex magnis caveis.*

Vaporem in majores & minores corporis humani caveas effusum resorberi, perque venas in sanguinem redire, ipsa, absque experimento, ratio suadet. Si enim per arterias perpetuo aliquid exhalat *g*, ut lentam eam exhalationem facias, tamen tanta moles paulatim fiet, ut animal obruat, nisi via sit, per quam humor exhalans de iis caveis exeat. Deinde non lentam esse exhalationem vel ipsa celeritas, nimis invisa, medentibus, evincit, qua reparuntur, hydropicæ aquæ aut per vehementia medicamenta purgantia exhaustæ aut per paracentesin.

Verum alia experimenta sunt, quæ resorptionem venosam naturalem, eamque expeditam, & velocem, demonstrant. Copiosam aquam in vivi canis thoracem inpulit Cl. *Musgrave* *h*, evanuit eadem, postquam spiritum difficilem fecerat. Mulsam pectori impulsam per lotium prodiisse *Sanctorius* auctor est. In abdomen canis *Antonius Nuck* *i*, *J. Ludovicus Petit* *k* & *Tanaron*, & nuper Cl. *Krazenstein* *l* Hafniensis professor, aquam injecerunt: ejus ad sex us-

*f* Id suo loco ostendetur, quando de partibus virorum genitalibus sermo erit.

*g* Sect. I. p. 103. seqq.

*h* *Philos. Transact.* n. 240.

*i* *Sialograph.* C. II. p. 27.

*k* *Traité des maladies des os* T. I. p. 355-

*l* *De diabete Exp.* I.

que uncias post aliquot horas resorbtas evanuisse viderunt, per lotium inprimis, cujus copia aquam injectam eam viam tenuisse ostendat.

Artem natura imitatur: & pus in abdomen, inque pectus effusum, & aquæ hydropicæ abdominis evanescunt, hæ quidem, non ignorante jam *Celio Aureliano m*, per intestina, perque vesicam.

Hinc mel resorbtum, & vinum in thoracis caveam injectum, per tussim redditur *n*. Hinc mulsa in eam cavitatem impulsæ, per os excreatur *o*: hinc amarus sapor medicamentorum liquorum, eo per siphonem intrusorum, in ore percipitur *p*. Nam alia iterum & mea & aliena pericula ostendunt, ubique in corpore humano, sed inprimis, ut in exemplo maneamus, de tota facie interna peritonæi, externa hepatis *q*, intestinorum *r*, vesicæ *s*, ventriculi *t*, mesenterii *v*, lienis *x*, renum *y*, & uteri *z* sudare eam aquam, quam in venam cavam aliasve cuique visceri proprias venas infuderis.

*m* *Chronicor.* L. V. c. 10.

*n* *Mezger* in *disp. de sanguinis in circulum motu* p. 15.

*o* *Galenus* in *method. medend.* L. V.

*p* *Pareus* *traité des arquebuses* p. 77. *oper. omnium* L. IX. c. 31.

*q* *Kaauw* *perspirat.* *Hipp.* n. 623.

*r* *Ibid.* n. 618.

*s* *Ibid.* n. 621. *Reaumur*

*Memoir. de l'Acad. des scienc.* 1714. p. 61.

*t* *Kaauw* n. 617. *Wolf.* *nuzliche Versuche* T. III. n. 70.

*v* *Kaauw* n. 618.

*x* *Idem* n. 619.

*y* *Idem* n. 620.

*z* *Idem* n. 621.



Sic in pectore quidem, quæ in venam cavam injicitur aqua, ex pleuræ interna facie *a*, & pulmonis *b*, & cordis *c*, & pericardii *d* interiori superficie fudat, neque raro vidi, cæruleam ichthyocollam, quæ de venis exhalaverat, pericardii figuram expressisse.

Idem in dura membrana cerebri *e*, & pia *f*, & cerebri ventriculis *g*, & in narium cavea *h* ejusdem experimenti eventus est: & iterum figuram ventriculorum cerebri glutine piscium per venas impulsæ non semel conservatam vidi, ut manifestum sit, a venis in eas omnes caveas liberum iter esse.

Rupta vero vasa esse, quæ aquam injectam sinant transfudare, quæ *Hewsoni* est conjectura, omnino non possum admittere. Centies post injectam aquam ceraceum ego liquamen in vasa exhalantia urssi, neque eam viam unquam secutum est, neque in magnas caveas exiit, quo exivisset utique, si aqua, ruptis vasis, ei viam aperuisset.

Nempe non subito per poros aliquos membranarum vesicæ ac intestinorum aquam hydropicam se in eas caveas penetrare, sed utique sanguini prius per venas reddi, multa suadent, alibi ornatius repetenda: peritonæum renibus & vesicæ impositum: curatio

*a* Petit l. c.

*b* Kaauw n. 616.

*c* Kaauw n. 706. Conf. L. IV.

*d* Kaauw n. 703.

*e* Kaauw n. 611. non quidem per experimentum.

*f* Idem n. 612.

*g* Idem n. 614. perinde non quidem per experimenta.

*h* Hales hæmastat. p. 117.

hydropis per sudores, in arenationibus illis veterum & recentiorum familiares *i*: phthisis & sanguinis corruptio ex pure in quamcunque corporis caveam effuso nata: tabes ex mercurialibus, aut venenatis injectionibus in urethram factis *k* orta, alia similia numerosa exempla.

Hinc, quoties causa aliqua venas comprimit, quæcunque demum ea fuerit, tamen ut vapor non reforbutur, hydropes certo nascuntur, in iis caveis, quarum venæ impeditæ fuerunt. Hydrops & inter cutem, & ascites, ex ligata vena cava, intra paucas horas natus *Lowero* dictus *l* est, & aliis *m*, & caput hydropicum a vinctis venis jugularibus *n*. Eo quidem hoc experimento uti nolum, quod neque *Cl. Hewson* nuper successerit, neque mihi, ut omnino nihil a ligata jugulari vena in cane superstitite evenisse viderim. Certa vero sunt, quæ nunc dico. Oedema pedis ex vena crurali ligata *o*. Oedemata variarum partium corporis humani a tumoribus variis *p* venas comprimantibus. A tumoribus

*i* *Dampier new voyage round the world* T. I. p. 276.

*k* *Allies malad. de l'urethre* p. 54.

*l* *De corde* C. II. p. 82.

apud *Birch history of the Royal Society* T. II. p. 202. 209.

*m* *Peyer parerg. anat.* III. p. 160. C. *Bontekoe* apud *Blancardum Jaarregister* C. VII. n. 35.

*n* *Willis pharmac. ration.* T. II. p. 125. *Pechlin observ.*

61. L. I. *Lower* ibid. & apud *Birch*.

*o* *F. Hofmann de elasticit. fibr.* p. 17.

*p* *Ant. Deidier des tumeurs* p. 180. in variis corporis partibus. *Schaarschmid* *Berlin. Sammlungen* T. IV. p. 408. a tumore venam cavam comprimente,



imi ventris hydrops ascites *q*. Ex scirrho mesenterii tumor scroti *q*\*. A steatomate pes tumidus *r*. A scirrho sub axilla œdema brachii *s*. Tumor comprimebat venas, in fractura femoris, inde enorme œdema; sublato tumore idem evanuit *t*. Hydrocephalus natus est, quod unica vena duræ membranæ duabus arteriis responderet, neque omnis humor redire posset *v*. Polypum cordis cum hydrope frequentissime conjungi reperi.

Ex polypo, iter utique venosum per cor impediens, cachexia  $\propto$  œdema, & hydrops anasarca pedis *y*. In hydropica venæ polyposis concretionibus plenæ & dextrum cor *y*\*.

Sed etiam absque ejusmodi externis causis hydrops nasci videtur, quoties debilitas aliqua, undecunque nata, iter venosum tardat. Facile enim intelligitur, in universum diutius sanguinis per arterias motum superesse, quem cor proximum urgeat, priorem vero motum venarum quiescere. Ergo si arteriæ exhalare pergunt, venæ resorbere cessant, collectus vapor in hydropem abibit *z*.

Si

*q* Willis l. c.

*q*\* Bekoste T. II. p. 309.

*r* Bartholin histor. 23. Centur. I.

*s* Hildan Cent. IV. obs. 73.

*t* Bogutski disp. de anatom. ad chirurg. necess. p. 23.

*v* Torres memoir. présentés T. I. p. 145.

$\propto$  Felice dissert. p. 128. 129.

*y* Klainig. nosocom. obs. 22.

Barrere observ. anat. edit. alt. p. 109. seqq.

*y*\* Philos. Transact. n. 308.

*z* Kaauw l. c. n. 748.

Ruyssch advers. anat. II. p. 24.

Deidier physiolog. p. 94. 95.

Boerhaave inst. rei med. n. 769.

Si quis vero *Glissonium* secutus *a*, & nuper juniorem *Hunterum*, a venis hanc resorbtionem totam ad vasa lymphatica transferre tentaverit, non absque faventibus experimentis, quæ proxima sectione dicemus, respondebimus interim, multo amplius resorbtionem patere, quam venarum lymphaticarum imperium: & ibi peragi, ubi nunquam certa fide ejusmodi vasa ostensa sunt, ut in cerebro, & oculo.

Cæterum hæc ex caveis humani corporis resorbtio est, quam perspicax, antè facta experimenta, vidit *Hippocrates b*, & quam plurimis periculis illustravit *Abraham Kaauw Boerhaave*: quorum plurima & simillima in tot venarum repletionibus feci.

#### §. XXV. Ex minoribus caveis.

Resorbtionem internæ faciei ventriculi & intestinorum, vesicæ urinariæ *c* & felleæ, uteri *d*, & aquei humoris oculi alias demonstrare præstiterit, quam, ut hoc unum addam, aqua ex venis in eas caveas penetrans ostendit, & spissitudo, quæ retentis humoribus supervenit. De glandulis & folliculis etiam suo loco dicemus. Oleum terebinthinæ ex vesiculis seminalibus resorbetur in venas rubras *d\**, in venas lymphaticas nequaquam.

*a* De hepate p. 457.

*b* Epidemior L. IV. sect. VI.

*c* Kaauw n. 492.

*d* n. 495.

*d\** Meckel Obs. nov. de vas. lymph.



§. XXVI. *Ex venis tenuioribus.*

A venis minoribus *e*, tenuius liquidus vehentibus, rubras venas radículas accipere, & hætenus oriri, ostenditur in oculo: pellucidæ enim uveæ membranæ venæ *f*, & magis pellucidæ venæ vitrei humoris & crystallini, utique in venas rubras oculi redeunt, cum eos humores, uti generantur, ita resorberi necesse sit, nulla vero in orbita vasa lymphatica reperiantur, ad quæ suum humorem reducant.

An etiam ex lymphaticis vasis minimæ venæ rubræ prodeunt? Certe passim per venas rubras lymphaticæ aëre repleri possunt, facillime vero in vitulino liene *g*, cujus venam si inflaveris, continuo numerosissima vascula lymphatici generis sub tota membrana lienis apparent: vetus autem experimentum est, a me aliquoties repetitum. Eadem ratione etiam in rene *h* lymphatica vasa liquore per venam aëre aut impulsio demonstrantur, & in pulmone *i*. In spermaticis venis experimentum existat

*e* Habet Cl. J. F. Schreiber *Elem. nied. mathem.* p. 338.

*f* Cl. Zinnius venulas iridis habet p. 241. Ex vero tenuiorem humorem vehunt.

*g* J. B. Morgagni *advers. anat.* II. p. 88. Cowper ad Bidloo T. 36. f. 1. Nuck *defens. duct. aquos. Sographi lymph.* p. XII.

*h* Cowper ad Bidloo T. 43.

f. 5. *Vienfens nov. system. vas.* p. 147. siquidem lymphatica, qualia vulgo intelliguntur, vir Cl. designat. Porro

*Aug. Frid. Walthers de secret.* p. 18. *Ant. Nuck adenograph.* p. 61. J. Conrad Brunner de

*gland. duodeni c.* 7. J. Gottfr. Berger de *natur. hum.* p. 78.

Bartholin de *diaphragm.* p. 93.

*i* Nuck *defens. duct. aquos.*

*Antonii Nuckii k*: aliique Cl. viri, quando modum docent, quo lymphatica vasa conspicua reddantur, aërem per venas jubent inflare *l*. Neque hæ communicationes ruptis vasis imputari possunt. Hydrargyrus enim, qui ex venis in lactea vasa transit, omnino nunquam in ea vascula penetrasset, si quidquam ruptum invenisset, quem certum sit, ut cogor repetere quæ comperi, quoties aliquid in vasis violatum est, quæ replet, certissime in maximas guttas effundi. Et omnino lympham ex sanguine venoso alii deduxerunt *m*.

An ut tenuiores arteriæ, ita venæ dantur seriferæ aliæ? Ita non solus *Boerhaavius*, sed difficilis cæterum in controversis admit- tendis *Albinus m\**.

---

*k* 1. c. p. 53. *Sograph. p. XI. 466.*  
*XIV. facilius qui per arterias. in Vioussens traité des li-*  
 In teste *Coxper* 1. c. T. 46. *queurs p. 197. Deidier de tu-*  
*f. 4. in pene Idem T. 36. mor. p. 38.*  
*f. I. m\* Nat. hom. p. 29. Pro-*  
*l Senac du cœur T. I. p. babile videri.*





## SECTION III.

## VASA LYMPHATICA.

§. I. *Historia.*

**H**OC nomine apud recentiores anatomicos veniunt venæ, pellucidæ aut rubellæ, teneræ, valvulis numerosissimis, certe plerisque locis, interceptæ, hinc nodosæ, ex minutis radiculis in trunculos majores, inque ductum thoracicum, eo majoribus confluentes truncis, quo huic ductui propiores sunt. Ejusmodi venæ reperiuntur in homine, in animalibus quadrupedibus viviparis, in amphibis *n* piscibusque calidi sanguinis. Sed etiam in avibus, etsi nuper hæc historia constituta est, series harum venularum olim reperta est, ut in struthio-camelo *o*, in gallo *p* denique: & in ea quidem ave absque valvulis, analogum tamen vero valvuloso ramulo lymphatico, vasculum nuper *q* ostensum est. Demum in hepate piscis orbis *r*, qui frigidi sanguinis est, vasa lymphatica vidit, quæ aliquandiu pro lacteis

*n* In phoca Eph. Nat. Cur. Vol. I. ann. 1727. p. 24.

*o* Credit se vidisse Antonius Valisneri notomia d'un struzzo p. 245.

*p* Monro de semine & testib. p. 54.

*q* Idem p. 50. 53. 48. 49.

*r* Lact. thoracic. p. 48. anat. renov. p. 133.

habuit, alter inventorum *Thomas Bartholinus*. *Swammerdamius* in Gallinæ abdomine vas lymphaticum vidit. In mustela fluviatili s unum utrinque vasculum lymphaticum tot interstinctum valvulis, quot sunt interstitia musculorum, dudum descriptum est. Verum id vasorum genus alii ad muciferos canales referent. In anguillis ductus albos per intestina, arteriarum & venarum focios, citatos lego t, cui quidem pisces argentea, peculiaris splendoris, vascula sunt, quæ tamen neque valvulas habent, neque lymphaticorum fatis similia sunt. Demum in bombyce v ex insectorum genere, lymphatica vascula dicta fuerunt, e quibus glutinosa lympa in sericum abitura ducitur. Sed & hic laxius hoc nomen sumitur.

Verum nuper demum vasa lymphatica, vasa lactea, quæ ad eam classem pertinent, & ductus thoracicus in avibus, in testudine, ut animale oviparo frigido, demum in piscibus frigidis, asellis etiam potissimum, ostensa sunt, & delineata. De gloria nobilis inventi lis est *Morroum* inter juniorem & *Guilielmum Hewson*, quorum ille vasa aquosa jam a. 1758. in avibus, & a. 1760. in raja pisce vidit: iste in utraque classe plene descripta dedit x.

Antiquitas tenuia quædam vasorum hujus

s *Eph. Nat. Cur. Dec. II.*  
ann. I. obs. 46.

t *Franc. satyr.* 8. 148.

v *Eph. Nat. Cur. Dec. II.*  
ann. II. obs. 28.

x *Exper. inquir.* T. II. 1774. 8.



generis vestigia reliquit. In libro, qui inter *Hippocraticos* est, spurio tamen, aliqua leguntur de glandularum sanguine albo, & pituitæ simili x: & alibi dicitur, glandulas pressas oleosum humorem reddere y. Eas voces huc trahit Vir Doctissimus *Phil. Jacobus Hartmann*. Sed etiam *Aristoteles* fibras dicit inter arterias venasque mediam naturam habentes, in quarum nonnullis sanies sit z, quæ certe voces ad lymphatica, aut tenuiorum generum vascula, pertinere videntur. Lacteorum vasorum antiquitates omitto, etsi ea omnino de lymphatico grege sunt.

Inter recentiores anatomicos *Nicolaus Massa* anno 1532, semel omnino, in humano cadavere poros vidit, qui ab arteria emulgenti veniunt cum poro uritide, neque in omnibus corporibus adparent a, quæ quidem verba utique apte ad lymphatica vasa, in ea sede frequentia, *Georgius Martine* retulit. Idem apud *Bartholomæum Eustachium* b, alioquin primum ductus thoracici auctorem, pictum in sinu lienis vasculum alterne sinuatum, ad lymphaticum genus refert c, cum eam sedem in brutis animalibus utique ferosa vasa tenere soleant.

Manifestius *Gabriel Faloppia*, quem *Fallopium* vulgo vocant, meatus flavo liquore ple-

x De glandul. c. i. n. 13.

y Ibid. n. 4.

z *Hist. animal.* L. III. c. 6.

a *Anatomie liber introductor.* p. 32. b.

b Tab. XI. f. 7.

c In commentario ad hanc *Eustachii* tabulam.

nos vidit, qui ab hepate ad pancreas tenderent *d*. Lymphaticum plexum portarum hic non possumus non agnoscere.

Iterum propius ad verum accessit *Caspar Asellius*, qui eundem plexum *e* in portis positum, omnino repetito vidit, & iconibus expressit, etsi in eo erravit, quod ea vasa cum lacteis continuari putaverit.

Antiquior & ipse *Bartholino Nathanael Highmor* eadem vascula, quæ *Asellius*, descripsit & delineavit *f*. *Cæcilius* vero *Folius* hactenus ab eodem viro dissenfit, quod vasa lactea unico trunco *g* ad hepar venire scripserit: quæ quidem voces ad ductum thoracicum satis commodè referuntur.

*Adrianus Spigelius*, quando chylum rubrum sibi visum refert *h*, omnino de lymphâ dixisse videtur, quæ sæpe rubet, etsi vir optimus rubro vino eum colorem tribuit.

Uberius *Johannes Veslingius*, anno 1649, multos meatus lacteorum æmulos ostendit, qua parte ventriculus lieni adhæret: & alibi de eodem, ut puto, invento locutus, die 18 Januarii lactea vasa vidit, qua parte pancreas lieni cohæret *i*, & qua parte ventriculus lieni incumbit. Iterum tertio Martii die

*d* Observationes de venis n.

3. *e* De lacteis T. III. IV.

*f* Disquisit. anatom. p. 40.

41. T. III. Prodiit is liber anno 1650.

*g* Sanguinis a dextro in sinistrum cordis ventriculum fluentis reperta via Venetiis 1639. 4.

*h* Anatom. L. V. c. 3:

*i* Epist. VIII.



plexum lacteorum vaforum super hepatis lobum versus septum transversum reperit *k*. In utraque epistola omnino vera vasa lymphatica sibi visa, ante *Bartholinum* & ejus æmulos, descripsit. Cum præterea ad *Bartholinum* posthuma scripta Clari viri pervenerint, & hi ipsi loci a *Bartholino* editi sint, summe probabile fit, hunc scriptorem vestigia *Veslingii* secutum, ostensam sagaci viro prædam, majori felicitate adtigisse.

*Johannes Walæus l*, *Bartholini* alter præceptor, vasa lactea dicit, in venam portarum, inque venam cavam prope renales venas inserta: iterum de lymphaticis vasculis locutus, quæ viderat, etsi ipse, ex præjudicata opinione, lactea vasa ad solum hepar ire docuerat *m*.

*Johannes van Horne*, egregius, & laude, quam consecutus est, major incisor *n*, ramos a glandula *Asellii* ad hepar euntes vidit *o*: & lacteos ductus venam portarum cingentes, inque chyli ductum venientes *p*, & duos ramos ad divisionem aortæ prope crurales truncos dixit *q*. His vocibus nihil, nisi ipsa vasa

*k* Apud *Joh. Rhodium* in vinum conservatas miris laudantissima anatom. n. 31.      dibus solebat commendare

*l* Apud *Bartholinum* in lacteis thoracicis p. 48.      possessor Comes de *Thoms*.

*m* Epist. de motu chyli & sanguinis ann. 1641. dat. p. 387. Etiam hanc *Bartholinus* edidit.      *o* In historia ductus chyliferi Leidæ 1652. 4. edita, p. 8.

*p* Ibid. p. 14.

*q* Apud *T. Bartholinum* in lacteis thoracicis C, VI. p. 21.      *n* Ut ex posthumis tabulis adparet, quas apud *Boerhaav-*

lymphatica designasse potuit, etsi, qua singulari fuit modestia, ea vasa primum ab *Olao Rudbekio* sibi ostensa fuisse, sponte fassus est *r*.

*Hermannus Conringius*, Vir eruditione quidem, ex libris collecta, quam ex manus solertia celebrior, tamen vasa aliqua per venam cavam sparsa vidit, quæ ad lymphatica, nondum publicata, pertinere videntur.

Addo ad hos annos Cl. viros, qui vel sibi laudem detectorum vasorum pellucidorum ipsi vindicarunt vel ab aliis in se collatam obtinuerunt. Ita Cl. *Jolyffe* Anglus medicus, quem vulgo *Jolivium* vocant, nihil quidem scriptum reliquit. Plurimi tamen ejusdem gentis scriptores, huic viro gloriam felici casu anno 1650. inyentorum lymphaticorum vasorum, unanimi testimonio s tribuerunt.

Inde *Franciscus Sylvius de le Boë*, in cadaveribus hominum morbis extinctorum indefessus profector, anno 1660. *t* scripsit, sibi ante hos viginti annos, atque adeo anno 1640, vasa lymphatica hepatis, flavo colore tincta visa esse. Possis in Cl. viri testimonio desiderare, quod tanti inventi, per annos duodecim, nemo in frequentissima academia meminerit,

*r* Rudbek *insid. struct. ductibus hepatis aquosis* p. 147. *story of Oxfordshire* p. 315.  
*s* Thomas Wharton *adenograph. C. II. p. 98.* *T. Wotton of antient and modern learning, p. 229.* Rob.  
*Franciscus Glisson de hepate c. 31. p. 266.* Boyle *de utilit. philos. exper. p. 98. edit. Lindaw.*  
*Gualther Charleton in exercit de lymphæ ductibus.* *t* In *diff. VII. de bile & hepate* eo anno edita.  
*Robertus Plott in natural hi-*



& ea vasa ipse *Johanni v. Horne*, *Sylvii* collegæ, a *Rudbekio* demum ostensa innotuerint.

*Conradus Victor Schneider*, Vir immensæ lectionis, neque alienus ab animalium dissectionibus, & ipse quindecim ante *Bartholinum* integris annis, anno nempe ejus seculi trigesimo octavo, vasa lymphatica se vidisse, absque quidem alio teste, scriptum reliquit v.

Verum circa annum 1650. demum nova hæc vasorum classis propius investigari cepit. Et quidem *Olaus Rudbek*, suecus, eo tempore quidem studiosus, ut vocant, medicinæ, *Leidæ* vivebat, olim per suas de *Atlantide* hypotheses, perque ingentes, quos in re botanica, totaque naturali historia suscepit labores, celebris futurus. Huic ergo juveni anno 1650 in vitulo, circa jugulum effusum lactis serum occasionem dedit, ut ductum thoracicum & chyli cisternam detegeret. Idem anno sequente ex ligatis vasis lacteis, & chyliifero ductu, peritior, anno 1652. M. Aprili ea vasa Regi-  
næ *Christinæ* x, in res physicas & variam eruditionem ardenti tunc virgini, & una ductus suos novos aquosos, eorumque delineationem demonstravit, præsentē *Bourdelotio*. Monitus eo tempore, ut properaret y, tamen novum

v *L. de catharris specialiss.* p. 523.

x *In insidiis structis ductibus hepatis aquosis* p. 5. Non tamen omittere oportet, Cl. virum in libro *de ductibus hepatis aquosis* anno 1653. Aro-

fiæ edito, folius ductus thoracici meminisse, quem annis 1650. 1651. & 1652. viderit, in nuperioribus vero *insidiis* huic ductui vasa lymphatica addidisse.

y *Insidiar.* p. 9.

inventum nondum publicavit, tabulas vero curavit z, quarum duas cum descriptione anno 1653 Arosiæ edidit a, undecim alias anno 1654 cum *Hemsterhusio* communicatas *Messi Aureæ* adjecit. Ad annum etiam 1650 novum *Rudbekii* inventum refert successor Clari viri *Laurentius Roberg* b. Neque auctori *entretiens en forme de préface* multum tribuas, qui *Bourdeloto* lymphatica vasa tribuit, inventa quum lactea quæreret ut *Rudbekius* tres post menses postquam a *Bourdeloto* audierat b\* ea viderit.

Circa eadem omnino tempora *Thomas Bartholinus Caspari Filius*, Danus, vir doctissimus, ex peregrinatione multorum annorum, exque perpetuo literarum cum fere omnibus doctis Europæ viris commercio, novorum inventorum gnarus, eadem vasa, *lymphaticorum* nomine imposito, descripta dedit. Ultima stamina historiæ inventi novi generis vasorum ipse refert ad 15 diem decembris anni 1651. c, quo quidem tempore ne ipse quidem fatis certus fuit, quid vidisset. Inde in lacteis thoracicis pridie Kal. Maii editis, manifestius ostendit, innotuisse sibi vasa pellucida, quæ lactea etiamnum vocabat, ramos spargentia ad arteriam venamque emulgentem d. In cane de-

z Ibid. p. 6.

b\* Galloys p. 51. 52.

a *Nova experimenta anatomica exhibentia duciū hepatis aquosos & vasa glandularum serosa.*

c *Bogdan apolog. p. 16. Bartholin histor. anat. 48. Centur. II. & in anat. renovat. p. 621.*

b *De recentiorum inventis anatomicis.*

d *Bogdan p. 20.*



num ductus lacteorum simillimos, seroso vero liquore turgidos, a mesenterio ad hepar per portas, & ad renes per emulgentes venas, & per cavam ad ilia, deorsum tumentes *e* vidit: idemque ramos a ductu thoracico ad œsophagum *f* tendentes detexit. Ex alio cane ad pedes serosa vasa, pellucida *g*, ex orbe pisce lactea ad hepar euntia descripsit *h*: addidit hæc ad hepar euntia lactea vasa subinde serosa *i* videri, & septima a pastu hora oculis suis se obtulisse *k*.

His suis experimentis paulatim confirmatus, Kalendis Maii anni 1653 *vasa lymphatica nuper in animalibus inventa* & hepatis exsequias edidit, cum eorum vasorum icone, ex cane desumpta. Sola vero hepatis & pelvis vasa pellucida depicta dedit, & gloriam inventorum vasorum cum *Michaele Lysero* profectore suo communicavit, unde postea voces illæ invidiosæ natæ sunt, nihil sine *Lysero* suo *Bartholinum* posse *l*. Anno vero sequente 1654 *vasa lymphatica nuper in homine*, Mense Januario circa mesentericos & splenicos *n* truncos inventa subjecit.

Ingens inde duos inter inventores, alioquin inimicarum eo seculo gentium cives, lis exarsit, cum *Martinus Bogdanus*, Polonus, sed

*e* p. 21.

*f* p. 36.

*g* p. 38.

*h* p. 49.

*i* p. 57.

*k* p. 58. 59.

*l* Rudbek *insid. struct. ductibus aquosis* p. 105.

*m* *Vasa lymphat. Barthol.*

p. 23.

*n* p. 16.

in civitatem Bernensem receptus, proprio libro o *Rudbekio* eam gloriam ereptum iret, non absque luculenta suspicione, ipsum præceptorum *Martini* calamum rexisse. Respondit *Rudbekius* p, iteravit suas accusationes *Bogdanus* q, & rationes conviciis miscuit.

Cum vero *Bartholinus* cum plerisque per Europam medicis amicitiam coleret, subinde novos libros ederet, discipulos plurimos, & artis anatomicæ peritissimos haberet, *Rudbekius* vero junior esset, & amicis fere destitueretur, & eloquentia minus valeret, & præter exiguos rarosque libellos nihil scriberet, factum est, ut tota gens medica in *Bartholinum* laudem detectorum vasorum pellucidorum retulerit.

Aliquid contra *Rudbekium* ea inconstantia facit, quam citavimus r. Multo tamen plura sunt, quæ pro *Rudbekio* adferri possunt. Et primum *Johannes* van *Horne*, amicus cæterum *Bartholini*, idem ductus chyli ferri primus in homine inventor, & primum sibi ab *Olao* ductus aquosos ostensos esse s testatur, & ipsi laudem novi inventi tribuit t, cum tamen utriusque æmuli libros, &

o *Insidiæ structæ Bartholini vasis lymphaticis* (Hafniæ) 12. *Olao Rudbekio* Hafniæ 1654.

1654. 4.

r not. x. p. 298.

p *Insidiæ structæ Olai Rudbekii ductibus hepatis aquosis* Leid. 1654. 8.

s In *Epistola* quæ exstat cum *insidiis structis Rudbekii vasis aquosis* p. 147. 148.

q *Apologia pro vasis lymphaticis Bartholini adversus insidias secundo scriptas*, ab

t In *microcosmo* p. 73. edit. Lips.



argumenta causæ, in promptu haberet. Deinde a *Rudbekio* vasa serosa prius dicta fuisse, quam *Bartholinus* de iisdem scripsisset, ex ipso *Bartholino* liquet. Is enim in sua eorum vasorum historia monet, sibi vasorum serosorum nomen non placere, quod aliqui his vasis imposuerint *v*, ut manifestæ sive fraudis, sive certe oblivionis *Bogdanus* arguatur *x*, qui negaverit, *Rudbekii* scriptum præceptori suo *Bartholino* ante anni 1653 natalitia innotuisse. Sed multo etiam uberiores & animalium varietate, & ipsa rei difficultate observationes *Rudbekius* in utroque opere *y* protulit, quam unquam *Bartholinus* ediderit, ut & longiori tempore ad ea vasa per totum fere animalium corpus scrutanda eguisse probabile sit, & omnino pateat, ex *Bartholino* sua *Olaum* non fuisse. Denique tabulæ, quas anno 1652 *Magnus Celsius* *z* sculpsit, multo plures & meliores sunt, quam quidem *Bartholinianæ* icones, & iterum longioris temporis partus & labor esse videntur, quam quidem docti *Dani* labores. Porro *Olaus Worm* in epistola posthuma 1017. die 5. Nov. 1653. de novo invento Sueci ait, quod expectet, & eum tractatum se accepisse ex Suecia in

*v* Vasa lymphatica in animalib. p. 30.

*x* In insidiis structis vasibus lymph. Bartholini.

*y* Tum illo, quod Arosiæ prodit, & a Syboldo Hemsterhuys in messe aurea aucti-

us recusum est, tum in disputatione de sero ejusque vasibus ann. 1661. Upsaliæ edita & a nobis recusa. T. VII. disp. anat.

*z* Insid. Anatom. p. 6.

ep. 1019. 13. Jan. 1654. adgnoscit, nulla *Bartholini*, nepotis sui, mentione facta.

Post ea tempora diu nihil accessit, & multum hæc historia etiam nunc a perfectione abest, neque in omnibus partibus corporis animalis hæc vasa demonstrata sunt, neque systema absolutum est, quale ad arterias corporis humani possidemus. Multæ enim partes corporis sunt, in quibus vasa lymphatica nemo vidit aliæ ubi & raro quisquam, & cum dubio aliquo. Ad alia enim incisores se converterunt, eorumque labores rei difficultas vicit. Non equidem adeo minuta ea vasa sunt, neque adeo obscura visu, quando inprimis scirrhus alicujus visceris vel hydrops præcessit. Sed difficultatem natura eorum vasorum venosa & valvulæ faciunt. Si enim in trunculos majores tubum illigaveris, & liquores coloratos inmiseris, difficulter, & non valde longe, ii liquores in vasa minora retroibunt. Si vero naturale lymphæ iter injectione imitari volueris, exigua vascula erunt, in quæ nullos nisi minimos tubulos mittas, & quæ facile sive forfice sive filo lædas laceresque. Neque demum ex minuto ramo in majores truncos ulla majori vi, quæ ad felicem injectionem sufficiat, liquor immitti potest.

*Ludovicus* ergo *Bilsius* vix quidquam præter errorem huic historiæ addidit. Passim aliqua de seroso genere vascula descripsit, & depinxit. *Nicolaus Stenonis* Filius *a*, aliqua *Johannes*

---

*a* In actis inprimis *Hafniensibus*.



*Swammerdam b.* Valvulas in liquidum constituit *Fridericus Ruysch c.*, cum junioribus annis solertiori manu vitreos tenuissimosque tubulos in vascula pellucida dare, eaque, absque injecto vinculo, flatu replere & siccare soleret, & majoribus animalibus uteretur, & demum artem nosset, qua ea vascula, sua cinerea lymphæ turgentia *d.*, per integrum biennium conservaret.

Plura promiserat *Antonius Nuck*, & poterat de ejus viri industria magna incisorum expectatio esse. Integrum enim vasorum lymphaticorum systema amalgamate repletum siccavera: sed pertinacem in eo labore virum, & per plura animalia sua vascula persequentum, mors ante diem abstulit. Ad ea quæ edidit, utique brutis animalibus usum esse constat, vel cordis exemplo, Non ideo tamen vir *Cl.* aut *J. Henrici Schulzii* acerbam accusationem *e* meritis est, aut *Laurentii Heisteri f* censuram, qui tabulas hujus viri pro fictitiis habent. Ipse enim testimonium pro *Nuckio* dixit *Hermannus Boerhaave g*, tabulasque vasorum lymphaticorum vidit, quæ argento vivo repleta vir industrius continuata siccaverat.

Nemo professorum post *Nuckium* huic labori

*b* In *Veslingiani syntagmatis* editione *Blasiana*. Prior vitreis tubulis usus est de *respirat.* p. 92.

*c* Proprio libello anno 1667. 12. edito.

*d* *Epist. anat.* III. p. 28.

*e* Impositorem vocat. de *pin-guedine* p. 27.

*f* *Compend. anat.* not. 6.

*g* *Prælect. acad.* T. I. p. 576.

bori successit. *Johannes* equidem *Zeller*, *Duverneyi* discipulus, in equis vivis lymphatica vasa persecutus est. *Petri Chirac* Archiatrorum olim comitis, icones anatomicæ lymphaticorum vasorum hepatis aliorumque viscerum, a *D. de la Font* ad naturam depictæ & perpulchræ, laudatæ a *D. Montagnat* *h*, lucem nunquam viderunt.

*Josephus Duverney*, nimis solitus labores mutare, aquæ inceptis ad alios incipiendos transire, integrum vasorum lymphaticorum in vacca systema discipulis, ipsique *Geudero* demonstravit *i*, nihil tamen de ea re edidit. Sed neque ex *Godofredi Bidloi* laboribus doctiores facti sumus, qui per totum corpus eadem vasa demonstravit, si ipsi fidem habere licet, non vero semper licet *h*.

Abdominis lymphatica vasa depicta dedit *J. Georgitis Duvernoi* *l*, olim præceptor noster: aliqua, circa maxillam inferiorem *Richardus Hale* *m*. Viscerum quorundam vascula pellucida recentiores aliqui anatomici dixerunt, & artem, qua ea vasa conspicua redduntur, sibi cognitam esse indicavit *n* *Abrahamus Kaauw*, neque tamen aperuit. Testium vasa diaphana vidit *Alexander Monro* *o*, & conjecturam

*h* Lettre. à M. Bérnin p. 71.

*i* De fermentis p. 123.

*k* Exercit. de hydatidibus p.

10.

*l* In Comment. Acad. Petropolit. Tom. I.

*m* In Philosophicis Transactionibus eorumque n. 364.

*n* l. c. n. 625. seqq.

*o* In diss. inaug. de semine

& testibus.



protulit, nasci ex cellulosa tela. Ill. *Meke-  
lius* passim ad eorum historiam aliqua addidit,  
tum *Alexander Monro* fil. & potissimum *Guil.  
Hewson*, qui multas novas, ex humano cor-  
pore tabulas dedit, etiam in artubus, & in  
his non sola cuti vicina vasa, sed etiam profun-  
da, neque prius dicta. Sparsum & ego & in  
hominum cadaveribus, & in vivis animalibus,  
vasa lymphatica & vidi, & persecutus sum.  
Plurima tamen ubique defunt, neque in artu-  
bus, aut dorso, aut interiori capite ea vascula  
hactenus satis certo visa sunt, neque constitu-  
tæ radices aut extremi termini.

## §. II. *Fabrica. Valvula.*

Ea, quæ rubris venis, etiam lymphaticis  
vasis natura est. Tenuis est membrana, etiam  
in majusculis truncis, inque thoracico ductu.  
In ea nullas fibras quidem oculus inermis di-  
stinguit, vitris vero convexis armatus & duas  
laminas *p*, & utcunque fibras *q*, *Nuckius*  
depinxit.

Inter utramque membranam cellulosam te-  
lam descripsit *Ludovicus de Bils*, quam *muscum*  
vocavit, dubia hactenus fide, neque repeti-  
tam a *Nuckio* *r* aliisque.

Valvulas nactæ sunt, pleræque certe, venæ

*p* Ex globulis quasi factas      *q* Idem ibid. f. 19. & p.  
pingit *adenograph.* f. 20. 21. 42.

*r* l. c. p. 43.

aquosæ, fatis earum similes, quæ in rubris venis reperiuntur. Multis locis numerosæ sunt, ut bis mille demonstratas fuisse *Bartholinus* auctor sit *s*. Nunquam, quantum quidem memini, nisi geminæ reperiuntur, quarum parabolica caveæ, aut sinus, partem vasculi a corde remotiorem, cornua vero ductum thoracicum respiciunt *t*.

Eas valvulas, etiam absque arte anatomica, relabens lymphæ in vivo animale distendit, parietes vasorum extrorsum urget, & convexos sinus & conspicuos reddit, ut perinde gemellis nodulis pellucidæ venæ interstinguantur *v*, uti rubræ venæ, quando cera repletæ sunt. Inde factum est, ut plerique historiæ lymphaticæ scriptores ea vasa nodosa pingant, non ob aliquod repletionis vitium *x*, quæ argento vivo fit, sed ad ipsam certe naturæ speciem.

Id utique tenuisse oportet, non raro, & magis circa aliquas corporis animalis interiores partes, vasa lymphatica cylindrica, & absque valvulis esse. Ita circa pulmonem reperi *y*, in hepatis vero convexa parte iconæ expressit vir Ill. *Casimirus Christophorus Schmiedel* *z*. In liene sub membrana communi. Vasa lymphatica glan-

*s* *Anat. tert. renov.* p. 622.

*t* *Ruyssch de valvulis lymphaticorum* f. 1.

*v* *Idem ibid.* fig. 3. 4. 5.

*x* Eo hoc, quod credebat vitium esse, retulit *Guilielmus Cheselden anat of hum.*

*bod. ed.* 1726. L. III. c. 10.

*y* Consentit *Cl. Ferrein* in *diff. an arter. pulmonal. tempore expirationis &c.* *Fr. Götting. jourr. des sav.* 1742. P. 43. ni fallor.

*z* In proprio programme.



dulas inter jugulares & venam subclaviam, alia a cellulosa tela orientia absque valvulis sunt *Mekel*. Sed etiam ductus thoracicus humanus absque nodis plerumque adparet, & a retibus lymphaticis, uti a rubris retibus, valvulas abesse vir Ill. monuit *a*. Quare non bene ubique quasi articulata pinguntur, quæ cylindrica sunt, & demum in nodulos adsurgunt, quando a liquore retento distenduntur.

Robur suum his valvulis inest, quo, a numero adjuvantium se mutuo ostiolorum *b* confirmato, vis inpressa facile sustinetur, ut neque crepent, neque liquorem impulsam longe transmittant, etsi ostendamus, utique neque rarissime, relabi. Fibras transversas, oculo armato visas, hujus forte roboris causas, delineavit *Antonius Nuck c*.

Primus harum valvularum naturam hactenus experimentis suis adtigit *Bartholinus d*, quod vasa lymphatica ligata intumescere, neque, si digito presseris, lympham retrorsum cedere viderit. Manifestius eas vidit *Rudbeckius e*, & numerosissimas esse, neque majori intervallo distare, quam sit mihi granum, monuit, icone etiam, paulo rudiori *f* expressit. Utilitatem perspexit *Franciscus Glisson g*.

*a* Senac traité du cœur p. 252. delineatæ sunt.

*b* Conf. Cl. Wintringham p. 46. dominis p. 18. p. 227.

*c* Fig. 24. 25. quæ equidem ad ductum thoracicum

*d* Vasa lymphatica brutorum

*e* Lact. thoracic. p. 35.

*f* Insid. struct. p. 93. 128.

*g* De hepate p. 449.

Solers ille *Swammerdamius* *h* anno jam 1664 has valvulas accuratius investigavit; & iconem meliorem cum *Gerardo Blasio* communicavit. Integre eas constituit *Fridericus Ruysch i*, & ex equi corpore aëre distentas adservavit, & communus cum *Blasio* congressus invitum convicit, vere adesse *k*.

### §. III. *Vis irritabilis.*

Vasa lymphatica satis valida sunt, ut ne a magno quidem hydrargyri pondere facile rumpantur.

Ne, quæ cohærent separare cogamur, ad-demus, vasorum lymphaticorum naturam valde contractilem esse, & vasorum rubrorum irritabilem vim multis modis superare. Exemta de animale mortuo, & in tabulam disposita, contrahuntur vi mortua, adeo valide, ut retractus ex trunco hydrargyrus vasa rumpat.

Sed etiam in vivo animale, aut nuper mortuo, non solus ductus thoracicus, qui vere de genere vasorum lymphaticorum est, & perinde vasa lymphatica hepatis, ad olei vitrioli tactum contrahuntur & celerrime exinaniuntur *l*: sed imprimis in animale, cui plena fuerunt, aut chylo, aut lympa, aut cæruleo liquore,

*h* De respirat. p. 90. in Observationib collegii privati Amstelodomensis & in syntagmate Veslingiano Blasii p. 552. T. 24. f. 1. 2. 3. 4.

*i* In lib. de valvul. lymph.

*k* Ibid in principio.

*l* Second. Memoire sur le mouvement du sang Exp. 295. 298.



quem animalia abforbere coegi, sub ipsis intentis meis oculis toties vidi hæc sive lymphatica vascula, sive lactea, evanescere: non potuerunt autem visui se subduxisse, nisi expulso, qui replebat, & conspicua reddebat, liquore, lymphæ, lacte, indigo in aqua dissoluto. Dumdum hanc vasorum hujus generis vim primi inventores priori seculo detexerunt, & habet, ut alios omittam, in vasculis pellucidis *Job. Nicolaus Pechlin m*, in ductu vero thoracico, *Carolus le Noble n*. Alii, quod eodem redit, in vivo animale, aut lympham chylo in vasis lacteis successisse viderunt *o*, aut chylum lymphæ *p*.

§. IV. *Origines, ex Arteriis, Venis, Ductibus excretoriis.*

*Fines* vasorum lymphaticorum nunc investigare oportet, qui labor non facillimus est. Prima stamina, sive radiculae, quæ confluentes trunculos constituunt, passim per corpus animalis dispersa, cum arteriis & venis hætenus conveniunt, ut per utrumque genus inflari & repleri possint. Quæ quidem mihi adeo manifesta videntur, ut dubia contra experimenta

*m* De purgantib. p. 75. obs. p. 146. *n* Obs. raræ & novæ p. 20. *o* Elsner in Ephemer. Natur. Curios. Dec. I. Ann. I. obs. 61. Bartholin lact. tho-  
*racic. p. 50. Rudbek vas. aquos. c. 5. Nicolaus Stenonis F. apud Bartholinum Censur. III. Epist. 24. p. 92. Second Memoire &c. Exp. 294. p Drelincourt canicid. 5.*

mota refutare non videatur necesse. Sed cum excretoriis ductibus eadem fere experimenta succedunt, & etiam evidentius ab ejusmodi canalibus partem aliquam contenti liquoris revehere videntur. In hepate aer, aut argentum vivum, per ductum choledochum impulsus, in lymphatica vascula venit *q*, ut etiam facilius per eum ductum, quam per portarum venam, ea pellucida vascula repleantur *r*. Vasa galactophora mammæ cum vasis lymphaticis, aliquanto tamen minus libere, quam per venas communicant. In uretere *s* idem periculum perinde succedit. Per ductum deferentem dudum vasa lymphatica, & ductum thoracicum inflari *Rud. Jacobus Camerarius* *s\** monuit, & *F. Ruysch* *t*, & *Frid. Hofmannus* *v*. Propius aliquantum ad verum accessi, & ex epididymide, excretorio nempe testis ductu, vidi *x* vasculum aberrare, quod argentum vivum impulsus recipit. Id vasculum iterum adcuratius persecutus *Cl. juvenis Alexander Monroo* vidit, omnino ad lymphatica pertinere, & valvulosum *y* fieri, & supra flexionem ductus deferentis usque adscendere, omnino,

*q* *Comper* ad *tab.* 18. f. 1. operis *Bidloiani*

*r* *Cassebohm* in codicibus *M. S.* qui penes me sunt.

*s* *Comper* ad *tab.* 43. f. 5. *Nuck* *adenograph.* p. 61.

*s\** *Eph. nat. Cur.* Dec. II. ann. 7. obs. 229.

*t* *Catal. Mus.* p. 153.

*v* *Medic. system.* T. I. p. 238.

*x* *Philosoph. Transact.* n. 494. & dudum in program. ad *Cl. Winkleri* disputat. inaug. anni 1745. n. 8. not. n.

*y* *De semine & testib.* passim & p. 50. 53. T. II. f. 10. 11.



ut videtur, ad ductum thoracicum iturum. Certa adeo exempla sunt, lymphatica vascula in excretorios ductus suas radículas depangere, & partem ejus humoris recipere.

#### §. V. *Cellulosa Tela.*

A cellulosæ telæ cavernulis oriri, sunt, quæ suadeant. Sæpe mihi successit, ut ex ea tela radículas vasorum lactiferorum mam-mæ nasci viderim. Inde Cl. *Mourous*, quem nuper laudavi, vascula lymphatica fasciculi va-sorum spermaticorum omnino argento vivo re-plevit, quod prius in cellulas eas effusum fuisset 2. A fugillatione, cum dissequeretur, lympham rubello colore tinctam fuisse *Astruc* vidit. Hæc vasa lymphatica melius in cadavere ostendi, quod putredinis vim senserit, a quo cellulosa spatiola grandescunt, aëre turgida.

Morbos addunt videri per vasa lymphatica transferri. Nam a veneno venereo bubones in-guinales nasci; a cancroso veneno vicinas glan-dulas axillares turgescere; a cantharidibus ad-motis, in vicinia tumores dolentes natos esse, in glandulis ejus generis.

Hæc omnia admitto, neque recuso vasa lymphatica esse resorbentium vasorum systema, quæ de cellulosa tela, & de magnis caveis li-quorem sorbent, neque ea ab arteriis continuantur. Hæc, quæ olim *Glissonii*, nuper *J. Hunteri, Alex.*

*Monroi & Guilielmi Hewson* theoria est.

Eandem resorbtionem suadet summa similitudo lymphæ valvulosæ *a*, cum ea gelatina, quæ & in fetu, & in homine hydropico cellulas adiposas replet. Hinc illa, quam se vidisse credebat *Antonius Deidier*, cellulosæ telæ in vasa lymphatica degeneratio *b*.

Morbi etiam ad idem theorema ducere videntur. In cachectica virgine pancreatis, omenti, & uteri glandulæ scirrhusæ *c*. Cum scirrhosis glandularum sæpissime tumores aquosos pedum reperi, manifesto ab impedita resorbtione humoris in cellulosam telam halantis, cum vascula lymphatica per eas glandulas suam lympham ducant, iisque obstructis, hinc iis vasculis revehere impotibus, redituro vaporibus via clausa sit. Imprimis in puero pedes anasarca tumidos vidi, cum glandulæ inguinales enormiter intumuisse.

In teste conquassato liquorem ex arteriis primo in cellulosam telam exire, inde in vasa lymphatica iidem *Cl. viri*. In liene eundem eventum repeti, postquam vasa rupta fuerint.

In ea hypothese id solum desidero, quod omnis resorbtio solis aquosis vasis reservetur, & quod iisdem caveis omnis cum vasis rubris continuatio negetur. De ista diximus *c*\*, & certe novimus, nulla arteria fracta, nullo liquore extra vasa

*a* p. 282.

*b* Consultat. T. III. p. 12. 124. in hepate & brachio &

in *physiolog.* p. 41. 42. De hepate conf. eundem locum,

*c* *Duverney junior* apud *Tauvry anat. raisonnée* p.

114.

*c*\* p. 284.



effuso, tamen per arterias vasa lymphatica ipsumque thoracicum ductum repletum fuisse. Venas vero rubras & de cellulosa tela, & de magnis caveis forbere, per sua experimenta mihi evictum videtur *c.*

Cum præterea vapor effusus in cerebri ventriculis & in medullæ spinalis infundibulo resorberi debeat, & tamen ea tota in amplissima regione nullum vas lymphaticum unquam detectum sit, nullum pariter in tota facie (exiguo circa aures tractu excepto) in cute capillata capitis, in tota amplissima cute dorsi, cum demum in artubus exigua, quæ reperiuntur, vasa lymphatica nullo modo resorbtioni ex amplissima sede cellulosa sufficere videantur. Resorbtio venarum rubrarum evicta videtur.

#### §. VI. *A magnis Caveis.*

Sed etiam a magnis caveis lymphatica vasa redire manifesta experimenta suadent. Ex intestinorum tubo lactea vasa humorem resorbent, quæ vere lymphatica sunt. In ventriculo similis resorbtio locum habet, & huic plurima lymphatica incumbunt, nondum enim albo colore succus ventriculi tingitur. Experimentum non penitus enarrat Ill. *Kaauwius c.*, sibi tamen notum, quo fit, ut lymphatica vascula una cum inhalantibus ostiolis pleuræ, aut abdominis repleantur. Demum denuo morbi idem ostendunt. Ex scirrhis glandularum conglobatarum frequen-

tissimus hydrops *d*. Per eas enim glandulas pellucidorum vasculorum lymphæ iter facit: eo impedito eadem resorptioni resistit, & vapor retentus in magnis caveis in aquam copiosam cogitur, quæ de lymphæ natura est, ut similes utriusque lymphæ dotes analysis demonstraret *e*. Ex steatomate mesenterii hydrops *f*: & ex ejusdem scirrhis *g*. Cum thymo & subaxillaribus glandulis scirrhis thoracis hydrops *h*. In hydropicis vasa lymphatica materie scirrhis plena *i*. Hinc sæpissime in ascite vasa lymphatica turgent *k*, neque alias rectius conspiciuntur, ut satis certo per proprias dissectiones vidi. Hinc illa late patens opinio, ex turgentibus *l*, & demum ex ruptis *m* vasis lymphaticis hydropem nasci. Hydatides certe, hydropes nempe minores, ex lymphaticis vasis dudum derivavit *Thomas Bartholinus n*.

Ex minoribus etiam caveis in vasa lym-

*d* Thom. Bartholinus Centur. IV. obs. 58. J. Theod. Eller observ. med. chirurg. p. 72. Allen synops. c. 14. C. Bartholin de duct. saliv. p. 12.

*e* Memoir. de l'Acad. de Chirurg. ed. 12. T. II. p. 6. 7.

*f* Tulpius L. II. obs. 32.

*g* Guil. de la Motte chir. complet. obs. 121. Boerhaave præl. T. I. p. 180. Hydrops ex scirrhis pene omnium viscerum Bosc p. 1. 1776.

*h* Moebius obs. 6.

*i* Duverney apud D. Tautur. anat. raisonnée p. 114.

*k* Nuck adenograph. C. VIII. p. 96. Allen addend. ad C. VIII. Commerc. lit. Noric. 1732. hebdom. 33. Bartholinus

lymphat. in homine p. 38. Tulpius L. II. obs. 34. Nuck adenograph. p. 96. 100. P. J. Hartmann Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 2. obs. 190.

*l* Th. Bartholin apud Hemsterhuys p. 246. & in lymph. in homine c. 4.

*m* Collins anatom. p. 169.

*n* Lymphat. in homine p. 30. 31.



phatica via patet potissimum ex feminalibus vesiculis.

§. VII. *Ex Venis minoribus, Nervis.*

A decoloribus venis vasa pellucida nasci minime negavero o; etsi exempla sunt, ubi ex minores venæ manifesto in rubras venulas se reddunt, ut in oculo: & alia, in quibus, cum venæ rubræ numerosissimæ sint, tamen nulla vasa lymphatica innotuerunt, ut in cerebri cortice. Verum de rebus extra sensuum potestatem positis nolim multa aut ponere, aut refutare.

Quare paucis etiam verbis alterius hypotheseos mentionem fecero, quæ nervorum cum lymphaticis vasculis conjunctionem statuit p, & liquidum nerveum per ea vascula ad sanguinis massam reducit q. Nam & ignotus est, qui nervos perfluit liquor, & multo, quam lymphæ, subtilior.

§. VIII. *Num ex Glandulis.*

Eadem ratio intercedit, ne de ea origine

o Anastomoses inter vasa lymphatica arteriosa & venosa ponit J. C. Adrianus Helvetius lettre au sujet de l'écrit critique de M. Basse p. 215. Et similia habet Phil. Hecquet in novo conspect. medic. P. II. p. 17.

p A nervis in glandulas reductrices spiritus effundi F. Glisson de hepate c. 45. p. 438.

q In glandulas conglobatas lympham deponi, hinc pariter, ut spiritus, acidam esse F. Sylvius de le Boe diss. med. VII. n. 40.

multus fim, quæ lymphatica vasa a minimis & inconspicuis glandulis derivat, etsi ea *Marcelli* fuit *Malpighii* r magni viri, tum *Johannis Zelleri* s, periti certe historiæ lymphaticæ auctoris, sententia. Numerosissima enim lymphatica reperiuntur iis locis, quæ ab omni suspitione glandularum conglobatarum libera sunt, ut in manu, pede, teste, pene, pulmone. Deinde vasorum lymphaticorum repletio, quæ fit per arterias, nullis nodulis intercipitur, quales ex materie veras glandulas replente nasci oporteret. Ante me, per *Nuckii* etiam experimenta, hæc hypothesis refutata est t, & ab aliis Cl. viris v.

Denique in glandulis conglobatis, quas equidem hi ductus perambulant, non ideo oriuntur x, sed prius nati eas glandulas demum trunculis suis adeunt. Facillimum enim est, in plurimis corporis humani partibus, stamina lymphaticorum vasculorum ostendere, quæ primis radiculis omni glandula propiora sunt, & tum demum glandulas salutant, quando magnam partem sui itineris absolverunt. Ita in funiculi spermatici vasculis lymphaticis vidi y, & in vitulino liene z, inque pulmone

r De gland. conglobat. p. 4.

s In diss. jam. cit.

t Gender de ferment. p. 13.

v Martinus Lister de humorib. c. 22. Joseph del Pa-

pa de humorib. c. 7. p. 494. Nempe non a solis glandulis lymphatica vascula nasci docet.

x Glandulas ab arteriis suum serum habere, & lymphaticis vasis dare docet Hier. Barbatus de sero & sanguine, & Malpighi de hepate p. 67.

y Et Alexander Monroo l. c. T. I. f. 4. 5. T. II. f. 10.

z Conf. F. Ruysch de vas. lymphat. c. 3.



etiam humano, in hepate *a*, in ventriculo *b*, in corde *c*, & in artubus, totoque pede proprius digitos, quam glandulæ sint. Ex lymphaticis etiam vasis prodeunt insignia stillicidia lymphæ *d*, quæ ex vulneribus circa cubitum, occasione sectionis venæ inflictis, passim succedunt, & quorum exempla ipse vidi, ut ægerime ea aquula, plurimo vitriolo imposito, demum comprimeretur. In brachio *e* frequentiora sunt, tamen etiam in femore *f* & tibia *g* visa. Huc pertinent etiam tumores lymphatici, ab omni glandularum conglobatarum vicinia remoti. A pollice ad carpum euntem vidit *Antonius Deidier* *h*, & in eo multa vasa lymphatica tumidissima. In brachii tumore similis eorum vasculorum moles *i*. Fuit in cervicis tumore tunicato vas lymphaticum *k*.

Denique passim vasa lymphatica reperta

*a* Conf. *Bianchi histor. hepat. l. i. c. 7.*

*b* *Peyer Merycolog. p. 88. Exerc. anatom. p. 84. 142. &c.*

*c* Passim per viscera *Winslow Exposit. Anat. T. IV. n. 599.*

*d* Exempla ejusmodi lymphatici fluxus exstant apud *C. Mich. Adolphi de vinculis chirurgicis. p. 21. J. Bohn phlebotom. culpos p. 34. Santem Zarini de missione sanguinis. Alex. Monro Essays of a society at Edinburgh. T. V. n. 26. C. Stalpart van der Wiel Centur. II. obs. 46.*

*Schouten van Gezellen p. 164.*

*e* *Ant. Nuck exper. chir. n. 28.*

*f* *God. Klaunig nosocom. obs. i. Post vulnus nempe scelopetarium ex poris exiguis femoris lymphæ funesta destillatio Christ. Lud. Walter observ. med. chirurg. thes. n. 65.*

*g* *Nuck l. c. Corn. v. Solingen nieuwe operatien der chirurgie p. 375. 376.*

*h* *Physiolog. p. 423.*

*i* *Ibid. p. 41. 42.*

*k* *Keil tumor. tunic. n. i.*

sunt, quæ nusquam uilam glandulam conglobati generis subierunt *l*.

§. IX. *Fines. Systema vasorum lymphaticorum in artu inferiori,*

Radices & originem vasorum lymphaticorum diximus, finem est ut enarremus, quo in sanguinem suam lympham exonerant.

Ergo eo modo nata, quo dixi, vascula venoso more in trunculos sensim majores confluent, ad easdem fere, quibus venæ, leges, ut trunculi pauciores ex plurimis ramis nascantur, & lumine suo angustiores sint, quam est lumen raniorum simul sumtum. Amant autem vasa rubra comitari. ut in exemplo cavam venam, aortam arteriam, & subclaviam, & vasa rubra renum. In artubus longe absque glandulis venarum simillimæ incedunt, cum in artu quidem inferiori primæ glandulæ in poplite reperiantur, in brachio vero primæ bicipiti flexionem inponantur. Eadem ratione longe absque divisione per glandulas progredi necesse est ea vasa lymphatica, quæ in dorso non quidem anatome ostendit, satis tamen probabili conjectura adesse suspicamur: tum ea, quæ circa musculos abdominis exterius quam peritonæum, & in pectore externo oriuntur. Hæc adeo vasa præter liquorem

---

*l* G. Blas anat. anion. p. 25. Colleg. privat. Amst. obs. p. 35.



suum, crebrioresque valvulas, venarum rubrarum similia sunt. Sed canius per singula.

In artubus nunquam quidem vasa lymphatica vidi: ab inferioribus tamen artubus *Thomas Bartholinus* pellucida sua vascula, venas rubras pedis comitantia *m* descripsit. *Idem* vir Cl. *n* in cercopitheco & indico glire vidit per crura minuta vasa, & prius desinentia, quantum digitos adtingerent. Eadem vascula addit, iliaca vasa suis circulis ambiisse, & glandulas conglobatas mesenterii *o* adiisse. Denique cutem inter & ilium musculos *Idem* ejusmodi vascula vidit.

Porro *Nicolaus Stenonis* Filius *p*, quem minus recte *Stenonem* vocare solent, quod nomen patris fuit, non filii, breviter in brutis animalibus posteriorum pedum lymphatica vasa adtigit. Ea vero in humano crure ostendit *Johannes van Horne q*. Inde *Olaus Rudbek* ultra vasa inguinis, serofos suos ductus vidit in animalibus *r*, & post editum opusculum in ove Leidæ anno 1654. ostendit *s*. Porro *Amatus Bourdon t*, non quidem ejusmodi auctor, qui rebus dubiis fidem addat, picta certe dedit vasa lymphatica crurum, cum venis ascendentia,

*m* *Lact. thoracic.* p. 38.  
*n* *Lymphatic. hom.* p. 54.  
*o* *Lymphatic. brutor.* p. 17.  
 83.  
*p* *Act. Hafniens. Vol. II.*  
*els.* 97. p. 241.

*q* In *disp. Cl. Sorgeloos de*  
*æconom. anim.*  
*r* In *insid. struct.* p. 110.  
*s* Teste *Laurentio Roberg*  
 in *disp. de invent. anat. re-*  
*centior.* p. 18.  
*t* *Tab. VIII.*

ascendentia, & inserta glandulis lumbalibus *Cowperus* v. Breviter eadem *Duverneyus* x indicavit, *Nuckius* vero in ipsis pedum digitis descripsit y, & demum ea vasa, proprio artificio sibi noto ostendi posse, gravis testis est *Abrahamus Kaauw Boerhaave* z, cujus auctoritati exempla fluentis de crurum vulnere lymphæ addi possunt.

His *G. Hewson* varia addidit. In artubus alia vasa aquosa superficialia sunt & subcutanea, a digitis in parte dorsali adscendentiam comitantia muscolum tibiale anteriorem: & alia in parte flexoria inter tibiā & tendinem internum musculi gastrocnemii. Valvulas habent, subeunt nonnullas glandulas & inde ad inguinales veniunt, & ibi cum vasis a genitalibus venientibus communicant. Plexum faciunt, & abdomen subeunt sub tendine obliqui interni.

Alia vasa profunda inter musculos comitantur arteriam tibialem posteriorem, inde cruralem, cum ea tricipitem muscolum perforant, & in glandulas inguinales veniunt, ubi cum superficialibus miscentur.

Inter inguinis glandulas facile est vasa lymphatica detegere, quæ multa, & cuti vicina, & grandia sint, etiam in homine, & sæpe eo loco etiam sponte se mihi obtulerint. Earum glandularum lymphatica vasa mercurio replevit

v *Append. ad opus Bidloï sciences avant 1699. T. V. p. 403.*

x. II.

x *Memoir. de l'Acad. des*

y l. c. p. 148.

z l. c. n. 634.



J. Georgius Duvernoy *a*, tum Cl. olim Basileensis professor Miegius *b*, & ego, neque semel, replevi. In inguine ex vase lymphatico, cum bubone dissecto, pertinacem lymphæ fluxum vidit Fridericus Ruyschius *c*. Iconem horum vasorum dedit Olaus Rudbek *d*.

### §. X. In Abdomine.

Ab inguine sursum retrorsum cum vasis iliaceis plexus lymphatici tendunt, & in homine *e*, & in cane *f*, & in fele mihi visi, & a variis scriptoribus depicti, perque ea vasa ductum thoracicum replevit noster olim sodalis, inde archiater, & celeberrimus medicinæ professor Regiomontanus J. Christophorus Boblius *g*.

Dum eam oram, quæ pelvim terminat, cumque ilibus conjungit, hæc pellucida vasa sequuntur, & recipiunt inmissa sibi varia vasa sui generis, quæ ex pelvi erepunt. Nam & ibi circa vasorum ex pelvi exitum, & pone vesicam, glandulæ conglobatæ ponuntur. Eorum vasa aliqua oriuntur ex teste quidem, & funiculum

*a* Comment. Acad. Petropol. f. 10. s. s. & J. Georgius Duvernoi l. c. h. h. & p. T. I.

*b* Apud Johannem Buxtorf Basileensem medicum in thes. anat. botanic. anno 1731. editis n. 13.

*c* Obs. anat. chirurg. 41.

*d* In opusculo Arosiæ edito T. II. f. 1. f. f. f.

*e* Habet etiam ex homine Guilielmus Cowper in append.

f. 10. s. s. & J. Georgius Duvernoi l. c. h. h. & p. T. I.

289.

*f* T. Bartholinus in icone lymphatic. brutor. Rudbekius in edit. Arosiana T. II. f. 1.

*g* g. apud Hemsterhuysium f. 9.

*g* Diff. de via lactea. n. 44.

Exstat in collectionis nostræ Tomo I.

spermaticum comitantur, etiam in homine mihi visa, inque variis animalibus descripta a Cl. *Monroo b*, aliisque olim Cl. viris *i*.

Quæ a pene veniunt, mihi minus nota sunt *k*, sed *Cowpero* dicta in plexum inguinalem se immittunt. Alia huc a vesiculis feminalibus *l* tendunt, aut certe ab earum vicina, aut a vesicæ urinariæ sede *m*, aut ab ipsa demum vesica *n*, & circa veru montanum *n*<sup>\*</sup>, quæ quidem vascula iterum fateor mihi nondum visa esse. Alia ab utero prodeunt, in brutis animalibus *o* apprimè conspicua, neque nunquam in homine visa *p*, & ab ovario *q*, hæc iterum ex bestiis descripta. Alia a mesocolo & intestini recti sede accedunt *r*, & hypogastricam ferè arteriam comitantur. Ea etiam alia via ad glandulas lumbares adscendunt. Sed ea omnia alias ornatius repetemus.

*b* l. c. p. 50. 51. 52. 53. T. II. f. 10. 11. T. I. f. 4, 5. &c.

*i* *Rudbek* apud *Hemsterhuys* f. 7. *Bartholin* Centur. III. epist. 1. *Kohlhans* in propria disputatione, quæ *Regiomonti* prodiit. *Nuck* l. c. p. 53. 147. Ex seroto *J. v. Horne* apud *Sorgeloos* l. c.

*k* *Myotom* reform. T. X. L. I.

*l* *F. Hofman* medic. system. T. I. p. 238.

*m* *T. Bartholinus* lact. thoracic. p. 21.

*n* *J. Zeller* in disp. jam citata.

<sup>\*</sup> Rete eâ sede depinxit *Cl. Watson Phil. Transf. V. LIX. 1. 2.*

*o* *Rudbek* l. c. f. 7. *Verheyen* anat. L. II. tract. 1. c. 22. *Needham* de formato fetu c. 1. *Nuck* l. c. f. 33. *Manget* theatr. anat. p. 204. *p* *Habet J. B. Morgagnus* advers. anat. IV. p. 88.

*q* *Nuck* l. c. p. 70. & T. V.

*r* *Rudbek* apud *Hemsterhuys* c. 6. p. 312. *Nuck* l. c. p. 129. 130. *Schelhammer* in *Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 3. obs. 92.*



Rami aliqui hujus plexus qui vasa iliaca comitatur, plexum in osse sacro faciunt. A vasis iliacis ad truncos grandes aortæ cavæque venæ lymphatica vasa conveniunt, quibus glandulæ lumbales tota ea sede incumbunt. Per eam totam regionem in plexum quemdam numerosissima vasa pellucida conjunguntur, quorum variabilem naturam nullo sermone expresseris. Densum plexum, & similem fere ejus, qui pampiniformis dicitur, *Comperus* s pinxit, sparsum autem, & qualem ego soleo reperire *Antonius Nuck* t, *J. Georgius Duvernoi* v, & *J. Christophorus Bohlius* x, ut eos interim scriptores omittam, quorum figuræ, aut descriptiones, ad bestias depictæ sunt. In eum plexum nunc se inmittunt vascula pellucida, quæ a musculis abdominis y, & lumborum veniunt, idoneis dicta testibus, etsi ego ea nunquam vidi.

Paucis hæc omnia tango, cum eadem fere cum historia ductus chyliiferi, cumque visceribus repetere oporteat, unde hæc vasa lymphatica adveniunt, quæ nunc recenseo. A lumbis adeo in sinistro inprimis latere vasa lymphatica inferiora insigni fasciculo z adscendunt, alia quidem ante venam cavam, & aor-

s l. c. f. 10.

t l. c. f. 32.

v l. c.

x l. c.

y *Thomas Bartholin* lact. thoracic. p. 38. *Evertse* deorganis chyli T. II. *Rudbeck* T. II. b. b. b. & f. 9. *Nuck* adenograph. p. 99. f. 31. *Mieg* l. c.z *Duvernoi* l. c.

tam, quo loco tubulum inmittere jubet, quoties oportet ductum thoracicum replere *Johannes Salzman a*, & quo pene etiam loco, prior tubulum inmisit *Brunnerus b*. Mihi ea regio minus commoda per experimenta visa est, & incerti eventus. Alia vascula pellucida retro venam cavam ponuntur *c*, aliqua etiam pone ipsam aortam. Ea demum conveniunt in secunda vertebra lumborum, inque ductum thoracicum uniuntur.

Eo vero loco in eum fasciculum ii trunculi se miscent, qui a rene veniunt *d*, pone ejus arteriam & pone aortam, & quos in homine vidi, alibique uberius describam; tum quæ a liene *e*, hæc in animalibus certe conspicua, & potissimum in vitulis.

In eadem porro vasa per lumbos adscendentia inmittunt se maxima alia vascula lymphatica, coeliacam arteriam sequentia, alia a liene orta, quæ ejus arteriam comitantur. Alia lymphatica vasa in ventriculo nata prioribus se adfociant, grandia ea, ut in homine vidi, alique *Cl. viri viderunt b*. Alia in curvatura minori coronariam arteriam sequentia, alia in majori, prope minorem curvaturam duodeni cum iisdem conjuncta, reteque facientia; deni-

*a* In nova encheiresi duct. thoracic. p. 30. edit. prior. & p. 707. edit. quam curavi.

*b* De pancreate p. 107. nempe in vena cava prope renes.

*c* Append. citat. f. 10.

*d* Nuck f. 32. 34.

*e* Morgagni advers. anat. II. n. 47. &c. *Kaauw* n. 631. 632.

*b* Peyer mericolog. p. 109. &c.



que & cum vasis lienis & vesiculæ felleæ, & hepatis unita. Ex hepate nempe concavo ea vasa & ad truncum celiacæ arteriæ confluunt, & una in thoracicum ductum abeunt: dum ea, quæ in convexa sede hepatis sunt, aliqua per ligamentum sinistrum ad ductum thoracicum tendunt.

Ita demum, ex conjunctis tot diversæ originis vasculis, denique unus præcipuus ductus *i* & ex mea, & ex aliorum scriptorum adnotatione *k* nascitur, quem equidem alii minores *l* comitantur, aut duo majusculi canales. Adjacet autem ille aquosus truncus aortæ, in facie anteriori corporum vertebrarum lumbalium, dexterior & posterior quam aorta, & recta fere in universum, cæterum undulatus adscendit. In eum nunc ductum, aut plures in trunculos, inmittunt se vasa lactea secundi generis, quæ cum arteria mesenterica ad aortam veniunt. Cum iis vasis fere in prima vertebra lumborum miscetur idem, & hac auctus accessione in chyli receptaculum intumescit, de quo alio loco dicetur.

Inde porro chyli lymphæque communis & maxima vena adscendit, nomenque ductus thoracici induit. Is iterum simplex est, aut alte-

*i* Ita Ill. *Bohlius* pinxit l. *ler de mesenterio* b. h. b.  
*c. f. i.* & *Bartholinus* *Tab. Coroper append. f. ii. l. K.*  
*lymph. brutor.* & *J. Zeller* l. *L. E. f. 10. Q. S.*  
*c. qui iliacum truncum vocat.* *l Hale Phil. Transact. n.*  
*k* Plures ductus habet *J. 364.*  
*Sigmun. Henninger* sive *Eu-*

rum sui similem habet, non ita tamen, ut aliud chyli receptaculum sit, & aliud, quod lympham seorsim contineat *m*.

### §. XI. *In Pectore.*

Dum per pectoris dexterius latus, retro pleuram, aut aortæ imponitur, aut sinistrum ejus latus tegit, ductus iste chyliifer, recipit inserta sibi numerosa, & facile conspicua vasa lymphatica, quæ per eum, quem dixi, communem truncum plerumque liquore colorato, aut sebo distenduntur. Eorum alia a mammis veniunt *n*; alia a septo transverso ejusque convexa facie, retro sternum adscendentia per glandulas mediastini, ad eas usque, quæ supremæ sunt *o*; alia a spatii intercostalibus *p*: alia a mediastini cavea *q*, quæ & ipsa plurimas glandulas conglobatas continet: alia a glandulis pericardio *r* impositis & asperæ arteriæ,

*m* Conjectura fuit J. Geor-  
gii Duvernoi l. c. p. 289.

*n* Ego quidem ea nondum vidi, describit vero ductus inde a mamma ad thoracicum canalem & cisternam euntes, in cane conspicuos, *Franciscus Zypæus fundam. medicin.* p. 58. *Conf. Phil. Transact.* n. 65.

*o* *Ant. Nuck* l. c. p. 142. 143. *Ol. Rudbek de sero ejusque vasis* f. 1. 3. Magnum ibi ductum pingit, pene similem thoracici, huic fere

summo insertum. *Cl. Eschenbach* in *anat.* germanice scripta insignia vasa lymphatica ad ductum thoracicum retro sternum adscendere vidit, cumque iis ea, quæ a convexo hepate veniunt.

*p* *Rudbek* l. c.

*q* *Idem* f. 3. apud *Hemsterhuyssium* b. b. p. 300.

*r* *Rudbek* l. c. T. II. f. 1. *Conf. de pericardio A. de Marchettis* apud J. M. *Hofmannum* in *comment. ad J. v. Horne microcosmum* p. 116.



aque corde *s*, mihi, sed rarius visa; alia, numerosissima ab œsophago *t* ejusque glandulis *v*: alia a thymo *x*, hæc quidem ex aliorum, sed insignium professorum fide. Sed & pulmonis superficies reticulatis vasculis perreptatur, quæ nuper in homine vidi, & quæ ductui thoracico, qua retro cor se sinistrorsum confectit, manifesto se inmittunt *y*: posteriora quidem medio fere in pectore thoracico ductui inserta; anteriora in angulum venam inter jugularem & subclaviam dextri lateris, *Hemsono* auctore.

Hæc lymphatica vasa, dum per thoracem ad ductum chyli feruntur, miros in gyros contorqueri solent, inque insulas intricari, neque aliam *Bilfiani* labyrinthi originem esse crediderim.

## §. XII. In Artu superiori.

Sequitur, ut superioris artus lymphatica vasa exponamus, quorum in homine certa fide visorum tenuis iterum notitia ad nos pervenit

- s* Rudbek 1. c. p. 300. & f. 1. 2.  
*f. 1. Henr. a Moinichen in x Comper 1. f. 12. B. D.*  
*Epist. ad Bartholinum 44. Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann.*  
*Centur. II. p. 538. 5. obs. 32. Drelincourt can-*  
*t Bartholin lact. thoracic. cid. 6. cum alia insertione*  
*p. 36. Goelicke histor. anat. Dorsten. de duct. thoracic. n.*  
*p. 494. 10. Cheselden anat. Edit. VI.*  
*v Vide Boblii T. I. & p. 214.*  
*Narcissi iconem, & Evertse- y Rudbek f. 2. Ferrein 1.*  
*nii, quæ forte Bidloi opus c. Bourdon descript. anatomiq.*  
*fuerit de organo chyli T. II. p. 177.*

\*, nisi lymphæ colliquationes ex venæ sectione natas huc referas, uti quidem referri possunt. In vivis animalibus olim visa sunt ab inventoribus, *Rudbekio a* & *Bartholino b*, venas pedum anteriorum comitantia, ad glandulas bicipitis musculi, inde ad axillares tendentia, & tandem unico fere trunculo, quem utique frequenter etiam in homine vidi *c*, in ductum thoracicum, proxime ejus in venæ subclaviæ cum jugulari confinia, inserta. Deinde *Cl. Hagen* in brachio œdematoso vasa lymphatica eaque prægrandia & flexuosa vidit *c\**. Finis manifestus est, reliqua omnia obscura.

Iterum hic *Cl. Hewsonus* & superficiiei propria vasa aquosa vidit, & in parte flexoria brachii & in extensoria, quæ etiam perforato ligamento interosseo communicant, & ad glandulas demum axillares veniunt.

Ibi conjunguntur cum vasis profundis arteriam radialem, & procul dubio ulnarem & interosseam, comitantia.

Ex utrisque in glandulis axillaribus plexus fit, qui in dextro latere in angulum inter venam jugularem & subclaviam fere inseritur, cum vasis aquosis pulmonis & colli.

In latere sinistro in ductum thoracicum vel in subclaviam *Hewson*.

\* Nisi *Johannis van Horne* experimentum recipias, qui in juvene, post vincula paucis a morte horis injecta, in brachio ostendisse dicitur apud *Sorgelaos æconom. thes. 54.*

*a* In ove ostensa, apud *Robergium l. c. p. 18.*

*b* *Lact. thorac. p. 38.*

*c* Habet *Richardus Hale l. c. f. 13. & 29.*

*c\** *Wahrnehmung. p. 27.*



Hæc brachii vasa aliquando in venæ sectione pertusa molestissima & diuturna lymphæ profluvia faciunt, quale & ipse vidi.

### §. XIII. In Capite.

In capitis equidem regione subcutanea vasa lymphatica passim reperiuntur, & mihi in facie, massetere musculo, parotide *d*, margine nudo maxillæ inferioris etiam in homine innotuerunt, in brutis animalibus utique notiora *e*.

Inde descendunt, cum ea glandularum conglobatarum serie *f*, quæ jugularem venam ad cavam superiorem comitatur. Accedunt trunculi lymphatici nati a glandulis maxillaribus externis *g*, quæ margini maxillæ inferioris & musculo biventri utrinque adjacent. Alii veniunt a musculis hyoidis ossis & pharyngis, hyopharyngeo, thyreopharyngeo, mylohyoideo, geniohyoideo *h*, sterno-

*d* Hic videtur ramus a parotide ad ductum thoracicum Antonii de Marchettis in *Phil. Transf.* n. 307.

*e* Nicolaus Stenonis f. pinxit ea vasa in icone disputationis de glandulis oris add. n. 41. Eadem J. Henricus Pauli Simonis. f. recte descripsit in *anatomes Bilspanæ anatome* c. 6.

*f* Morgagni *Epist. anat.* IX. n. 24.

*g* Pinguntur in tabula disputationis, quam prælide J. Georgio Duvernoi Tubingæ anno 1725. defendi, experientorum comes, de ductu salivali novo.

*h* Georg. Dan. Coschwitz in disp. de ductu salivali novo T. II. a. a. Duvernoi l. c.

hyoideo *b\**, aque musculis linguæ *i*, & ipsa demum lingua, hæc quidem satis dudum a me visa *k*, & a larynge denique *l*. Inde pergunt descendere, & augentur aliis colli lymphaticis vasis, quorum alia anteriora, valde conspicua, ab omnibus fere hujus historiæ scriptoribus descripta sunt *m*, non sine aliqua a thymo advenientium vasculorum accessione *n*. Posteriora alia, sive cervicis, a glandulis splenio *o* musculo adcumbentibus, iterum cum jugulari vena descendunt. Numerosa etiam vasa aquosa sunt thyreoideæ glandulæ. Hæc omnia in trunculos unita, cum ramis a capite descendentibus & comitibus ramorum arteriæ carotidis, demum in dextro latere cum vasis pulmonis & thyreoideis, dextra quidem in angulum venæ subclaviæ cum jugulari, sinistra vero & in ductum thoracicum se inmittunt, & in subclaviam, iterum *Hewsono* auctore.

*b\** *Coschwitz* l. c. f. 1. *Bartholinum* Centur. III. Epist. I. *Amstelodamenses* in *observ. anat. colleg. priv.* p. 35. *Nicolaus Stenonis* f. apud *Bartholinum* Epist. 57. Centur. III. p. 229. & in *Actis. Hafnienfibus* vol. II. obs. 97. *Brunner* l. c. p. 33. exper. 5. *T. I. Zeller* p. 4. *J. Henr. Pauli* l. c. *o* *Nuck* l. c. p. 141. *Zeller* *m* *H. v. Moenicken* apud in disp. citat.

faccum carnosum glandulæ thyreoideæ vocat.

*i* *Rudhek* de sero ejusque vasis f. 2. & in disp. *Cl. Duvernoi*.

*k* *Duvernoi* l. c. p. 16.

*l* A cristis cartilaginum arytenoidearum orta habet *Gunter Christoph. Schelhammer* de voce p. 14.



§. XIV. *Ubi nondum visa sint.*

Lymphaticorum vaforum in cerebri equidem interiori regione positorum nonnulla passim vestigia reperiuntur. In cerebro, ventriculis, glandula pituitaria & infundibulo apud *A. de Marchettis* *q*: in cerebro & plexu choroideo apud *Humphredum* vel *Henricum Ridley* *r* ipsumque *Nuckium* *s*: in dura matre, ad glandulas sinui falciformi adfidentes nuperus apud *Danos* professor *t*: in pia matre alii scriptores *v*, & in comitatu nervorum olfactoriorum versus nares tendentes *R. Carr* *x*. Verum dudum de his per cerebrum lymphaticis vasis dubia moverunt viri insignis his in rebus auctoritatis *J. Conradus Brunner* *y*, & *Job. Zellerus* *z*, neque unquam aliquid simile vidi, & obest, quod nullæ intra cranii caveam glandulæ lymphaticæ reperiantur, quales a ductibus aquosis non longe abesse solent. Sed neque oculorum lymphatica vasa *a* in nuperis experimentis aut meis, aut clarissimi *Zinnii* adparuerunt.

*q* Apud *Camerarium* in *p. 209.* in submersi hominis  
*Epist. Taurinensibus.* *p. 148.* cadavere.  
*149.* & *Cl. Desnoues lettre à v Larcifus, Pacchionus &*  
*M. Guilielmini* *p. 18.* Verum *Fantonus* quos suis locis di-  
iste non plurimam fidem ex- cam.  
perimento adhibet. *x* In *Epistola* *I.* *p. 5. 6.*  
*r* *Anatomy of the brain* *C.* *Leidæ ann. 1683.* sibi visa  
*II.* *f. 1.* *q. q.* Conf de eo esse.  
plexu *Nicol. Stenonis* *f.* in *y* *De gland. pituitrr.* *p. 174.*  
*Bartholini anatom.* *p. 475.* *z* *l. c.*  
*s* *Nov. invent.* *p. 150.* *a* In *Retina Valsalv.* *de*  
*t* *Cl. Heuermann* in *physio- aure human.* *c. 3.* *n. 15.*  
*logia germanice edita* *T. II.*

Ita medullæ spinalis aquosa vasa, a nonnullis Italis & Germanis professoribus dicta, nondum satis iteratis periculis confirmata habemus. Et *Antonius* quidem de *Marchettis* *b* medullam spinalem chylo plenam se vidisse narravit: similia *Galeacio*, sed parum de proprio invento certo *c*, tribuuntur. Ex specu vertebrarum prodeuntia dixit *J. Georgius Duvernoi* *d*, & *Joh. Salzmänn* *e*, sed ad unicum iste quidem experimentum. Ut omnino de his omnibus nuperiorum professorum solertem industriam, & nova experimenta expectasse præstet. Demum placenta & secundinæ aquosis vasis destituuntur, & in magna parte cutis, dorsoque toto nondum visa sunt. Deinde fateri oportet, post tot industriorum virorum labores, fragmenta tamen esse ea omnia, quæ de lymphaticis vasis scimus, neque ullo modo cum arteriarum, aut venarum, aut nervorum historia descriptiones vasorum aquosorum comparari posse. In capite enim & artubus pauca, & hiulca: in vola manus, dorso pedis, dorso trunci, natibus nulla omnino descripta habemus.

In quadrupedibus, avibus & piscibus systema vasorum lymphaticorum fere est quod in homine diximus, & pariter ductus thoracicus, eadem fere in sede, in magnam venam immissus, communis idem truncus lacteorum vasorum & lym-

---

*b* Apud *Camerarium* l. c. &  
*Bianchium* in *hîstor. hepat.*  
*T. II. p. 310.*

*c* l. c.  
*d* l. c. p. 289.  
*e* *Ibid.* p. 281.



phaticorum. In piscibus tamen omnino nullæ glandulæ conglobatæ notæ sunt.

§. XV. *Num in venas rubras se inmittant.*

Exhibui hactenus brevem de lymphaticis vasis summorum capitum enarrationem, pleni enim & continui quidquam nemo dedit, & omnium minime in homine. Omnino vero inquirere oportet, an alius, præter ductum chyliiferum, eorum vasorum finis sit, & an vere in venas rubras terminentur. Vetustiores certe, etiam melioris notæ scriptores, in eo fere consentiunt.

Ita *Nicolaus Stenonis* f. ex dextro capitis latere, dextro pede anteriori, & dextra pectoris cavea, vasa lymphatica in venas axillares f deduxit, ex glandula vero parotide, & maxillari, in cavam venam g. Idem varias eorum aquosorum ductuum cum venis axillaribus & jugularibus anastomoses novem iconibus expressit h; & duas etiam infertiones, hanc quidem in jugularem externam venam, illam in axillarem, ex cane depinxit, vasisque colli tribuit *J. Henricus Pauli* i.

A brachio vasa lymphatica ad venam subclaviam tendere *Nuckius* auctor est k, & *Richardus Hale* l, ad jugularem *Bartholinus* m.

f *De muscul. & gland. p.*

38.

g *De gland. oris n. 41.*

h *Act. Hafn. l. c.*

i l. c.

k l. c. p. 48.

In urso vasa lymphatica in labyrinthi modum intorta, inque axillarem venam priori ostio, altero in cavam descendentem inserta, Cl. olim in Academia Borussica Professor vidit *n*.

In pectore vasa lymphatica pulmonis in venas subclavias & axillares ire, non facile in mera rerum historia rejiciendus auctor testatur, *Fridericus Ruysch* o: quæ tamen ego vasa in humano cadavere manifesto in thoracicum ductum deduxi, & deduxit Ill. noster *Mekelius*. Thymi lymphatica vasa in venas subclavias inserta, ex bestiis descripsit *Carolus Drelincourt* p.

A spatiis intercostalibus venas pellucas in jugulares truncos derivavit *Nuckius* q, tum a diaphragmate in easdem venas r, a corde iterum in eas, & in subclavias s.

Colli lymphatica vasa, & conjuncti cum iis ex capite trunculi, in duos ductus colliguntur, axillari, & jugulari venæ insertos, ex præcipuorum his in rebus auctorum testimonio t. Sed in ipsam venam axillarem capitis lymphatica vasa alii profectores deduxerunt v, exque capite in cavæ venæ truncum x.

l *Philosoph. Transact.* 1. c.  
& *Duverney Memoir.* avant  
1699. T. I, p. 403.

m *Lymph. brut.* p. 34. 38.  
n P. I. *Hartmann De perit.*  
*anatomica veterum Special.*  
diss. II.

o *De valvul. lymphatic.* p.  
6.

p *Canicid.* 6.

q l. c. p. 142.

r *Ibid.*

s p. 143.

t J. *Henric. Pauli anat.*  
*Bils. anat.* c. 6. *Rich. Hale*  
*ibid.* n. 31. 32.

v *Rudbek de sero ejusque*  
*vasis* f. 2. *Duverney* l. c.

x *De glandulis oris* n. 41.  
Fatetur tamen nonnunquam  
in thoracicum ductum inferi  
*Conf. icones actor. Hafniensium.*



Eo pertinet *Richardi Lower* experimentum, qui ligata vena cava, caput fero turgere vidit *y*.

Hepatis simi pellucida vascula ad cavam venam iterum non contemnendus scriptor deduxit *z*, & ipsas venas lacteas cavæ venæ & portarum inferi auctor fuit, qui inter primos circuitum sanguinis per experimenta defendit *a*.

Aliqua vasa diaphana uteri, aut certe a latis ligamentis nata, in hypogastricam venam *Wepferus b\** persecutus est. Lumbalem venam per lymphatica vasa nuperus prosector replevit *b*, & in lumbis lymphatica vasa in cavam venam & venæ sine pari partem, quæ sub transverso septo est, inferi, gravissimus testis est *Abrahamus Kaauw c*. In azygam inserta vidit *Cl. Hebenstreit d*.

Inter ductum thoracicum venasque renales & lumbales consensum aliquem, & occultos, neque ostensos, communicantes ductus prioris seculi prosectores Galli descripserunt *e*, cumque vena sine pari conjuncta vasa lymphatica  
nuper

*y* De corde C. II. p. 82. ed. Anglic.

*z* *Mauritius v. Reverborst* de circulatione bilis n. 19. Tab. I. f. 1.

*a* *J. Walæus* apud *Bartholinum* p. 789. Eum exscripsit *Alexander Maurocordatus* de officio pulmonum p. 112.

*b\** In dubiis anatomicis p. 100. de apoplexia p. 350.

*b* *Casimirus Christophorus*

*Schmiedel* progr. de vasis lymphat. hepat.

*c* n. 633.

*d* Progr. de mediastino postico.

*e* *Gayant & Pecquet. Memoir. de l'Acad. des scienc. avant 1699. T. X. p. 63. 464. 503. & in Claud. Perrault Essays de physique, ejusque diss. sur une nouvelle insertion du canal thorachique.*

nuper J. *Adamus Kulmus f*, quem alias au-  
diemus. Nuper Cl. *Mertrud* vascula lymphati-  
ca vidit, quæ & cum ductu thoracico com-  
municant, & in lumbales venas aperiuntur. *f\**.

Nullum testimonium dissimulavi, neque  
non moveor magno præcipuorum virorum con-  
sensu. Sed aliæ & fatis graves rationes sunt,  
quæ mihi hoc totum lymphaticarum venarum  
cum rubris commercium dubium reddunt &  
suspectum. Expendi, quam vicinas venas ru-  
bras lymphatica lumborum, pelvis, testium-  
que vasa habeant, quam remotum inde ductus  
thoracici in venam subclaviam sinistram paten-  
tis ostium sit: & existimavi, mirum omnino  
naturæ consilium fore, per immensam longi-  
tudinem eam lympham sursum ducentis, si  
omnino non contrarium est ejus aut mori, aut  
legibus, in venas rubras lymphaticos ductus  
immittere. Sed etiam certo fatis novi, hepa-  
tis vasa lymphatica adeo numerosa, neque ca-  
væ venæ *g*, neque illi inmitti, quæ ad por-  
tas tendit. Ramorum etiam lymphaticorum,  
certa fide, ex omnibus corporis animalis parti-  
bus in truncos sensim majores, hinc in duc-  
tum thoracicum confluxus, manifestam inter  
eum ductum, cavamque venam similitudinem  
constituit. Porro ad naturæ constantem analo-  
giam animum adhibui, quæ perraro mini-

*f* In *Breslauer Sammlungen*  
XVI. *Versuch*. p. 432.

*f\** *Mem. des sav. étr.* T. VI.

*g* Confirmor *Cassebohmi* te-  
stimoniis in *posthumis*, quas  
possideo *schedis*.



mas, etiam rubras venulas, in maximos truncos inmittit, sed eas in trunculos colligit, sensim majores, donec suo lumine magnis proximi sint, in quos terminantur. Accedit etiam experimenti fide, difficilius venas minores in magnos truncos suum sanguinem inmittere *b*. Iterum ductus chyli fer proximam in abdomine venam cavam manifesto præterit, & remotissimam subclaviam eo valde probabili consilio petit, ut capiti, collo, artubus superioribus propior accedat, earumque partium recipiendis lymphaticis venis se accommodet.

Addidisse liceat, nunquam me vel unicum vasculum reperisse, quod vera fide in venam rubram terminaretur, neque me absque consentientibus Cl. viris *i*, eum vasorum aquosorum terminum rejicere.

His omnibus pensitatis valde mihi probabile fit, omnem ex corpore humano redeuntem lympham prius in thoracicum ductum confluere, quam sanguinis massæ reddatur. Ita & facilius in sanguinis contrarium torrentem se sua mole penetrat, & in unum truncum collecta efficaciter sanguinem eo in loco diluit, ex quo proxime pulmonem subit, quo in viscere obstructionis periculum & perpetuum est, & gravissimum. Etiam pietas ali-

*b* Second Memoire sur le 144.  
mouvement du sang. Exp. 137. *i* Bohn circul. anat. p. 161.

qua in hac mea conjectura est, cum *Præceptoris* fuerit *k*, qui ductum thoracicum pro manifesta vena cava tenuiorum humorum habet.

Minores illas vasorum lymphaticorum insertiones, quotcunque vera fide observatæ sunt, eas ad raras varietates *l* refero, aut omnino ad errores physiologicos. Facillime enim liquor aut aër, vasis lymphaticis impulsus, potuit retrogrado itinere, contra valvulas non satis resistentes, per ampla sua cum arteriis confinia, in venas rediisse: uti ostendimus per ductus excretorios, adeo manifesto ex arteriis ortos, & nusquam venis rubris inmissos, impulsu liquorem, aut flatum, per eadem arteriarum confinia in rubras venas viam sibi aperire *m*. Non tamen resistam pertinax, si accuratis experimentis hæc oscula lymphatica aliis, & a ductus thoracici ostiolo remotioribus locis, ab idoneo artifice ostensa fuerint. Et subclaviæ quidem venæ, aut jugularis, cum ex vena conjunctioni, venas lymphaticas inseri non dubium est: sed ex venæ ductui, quem dixi, proximæ sunt.

*k* *Prælect. ad instit. rei* Med. n. 129.

*l* Ea *Gualtheri Needham de Gayani* ductibus sententiâ fuit *Phil. Transf.* n. 85. *Lomerus* autem lymphæ ductum ad ci-

sternam chyli a renibus euntem esse monuit, quodcunque Galli vidissent, apud *Birch. histor. of the royal societ. T. II. p. 172.* *m* *Sect. II. p. 280.*



§. XVI. *Glandulæ conglobatæ historia.*

A vaforum lymphaticorum historia minime separari potest glandularum *conglobatarum* descriptio. Eas enim glandulas aut omnes pelucidæ venæ adeunt, quæ multorum est sententia *n*; aut certe pleræque, quod magis est probabile. Reperiuntur in quadrupedibus & avibus: piscibus, & quadrupedibus frigidis nullæ sunt *n*\*. Ad has omnino carnes *glandulæ* nomen primario pertinet, cum figura earum verarum glandium simillima sit, & eas omnino *Celsus* o intellexit, quando de glandulis scripsit, quæ in cervicibus interdum cum dolore intumescant. Eas etiam *Marinus* *p* a reliquis glandulis separavit, quod densæ essent, & vaforum divisionibus subjacerent: eamque notam *Galenus* retinuit *q*. Non ut accurate separaret, nam lac, salivam, serum, pituitosum in mesocolo humorem separari scripsit, cum conglomeratis adeo conjungit *q*\*. *Rufus* subpingues *r*, carnosasque concretiones dixit, in inguinibus & lactibus, & alibi *s* glandulas cervicis, alarum, mesaræi & inguinum recensuit. Tumores ex carne & adipe factos maxime cir-

*n* Nuck l. c. p. 49.

*n*\* Herxson. Pallas Comm. Petrop. L. XIX. in lacerta. o L. IV. c. I.

*p* Apud Galenum de semine L. II. & de methodo medendi L. XIV.

*q* Apud Oribasium edit,

Dundass p. 180. Nullam vaforum divisionem esse pronunciat, cui ejusmodi glandulæ non subjiciantur.

*q*\* Meth. medend. XIV. c. II.

*r* De appell. part. L. II, p. 64. edit Clinch.

*s* Ibid, L. I. p. 38.

ca inguina, alas & mesenterium, (ubi *choirades* dictæ) *Pollux* *t* vocavit. Tertium glandularum genus *Vesalius* *v* facit, quæ cavitates repleant, sub auribus, aut in jugulo. Denique a conglomeratis proprio nomine *conglobatarum* distinxit *Franciscus Sylvius* *x*, idque nomen a discipulis *y*, & a tota fere posteritate conservatum est, etsi non verum nomen, neque simplices glandulas esse, quas conglobatas *Sylvius* vocavit, & conglomeratarum titulum his nostris rectius inponi *Lossius* *z* objecit, adque conglobatas veras testem, pinealem glandulam, prostates, & minores miliares glandulas retulit *a*. Nuper etiam Cl. *Bromfield* nullum conglobatarum a conglomeratis discrimen esse docuit, ut in alio animale conglobatæ sint, quæ in alio conglomeratæ *a\**. Sed Cl. virorum objectiones receptum a *Sylvio* discrimen nondum antiquarunt *b*.

S. XVII. *Fabrica.*

In universum oblongæ sunt, olivæ figura *c*, & modo simplices, discretæ, sparsim habi-

*t* Edit. *Hemsterbuys*. p. 261.

*v* De fabric. corp. hum. p.

722.

*x* Disput. med. quint. n. 25. 26. 27.

*y* Nicolao Stenonis f. de muscul. & gland. p. 29. Regnero de Graaf de pancreate p. 50.

*z* Disp. de glandulis in genere n. 24. 30.

*a* n. 28.

*a\** Obs. II. p. 45. 46.

*b* G. C. Schelhammer in Analectis. Nicholls in Compend. anat. æcon. p. 4.

*c* Conf. figuras Nuckii, Comperi, Mylii.



tant, modo in acervos colliguntur, confluentium similes, quales cumuli ex congestis simplicibus in ala & inguine inprimis reperiuntur. Color in fetu pallide rubellus est, in adulto homine sature ruber, in bronchialibus glandulis, quæ de hac classe sunt, sature cæruleus & nigro proximus.

Firmitas & in ipsa carne glandulæ, & etiam magis in membranis, quibus ambeuntur, insignis est, hæc cum levitate conjuncta.

Cum abeuntibus partibus corporis humani multa cellulosa tela ea lege uniuntur, ut in medio adipe, aut cavernoso textu, mobiles sint. Ex ea nota levius malum esse, neque glandularum naturam valde a legitima recessisse, chirurgi colligunt: in scirrho enim vetustiori, & confirmato, ad cutem adhærent, & immobiles fiunt.

Fabrica mihi valde simplex visa est, quam insigniter complicatam & difficilem varii, etiam bonæ notæ scriptores, faciunt. Ergo membrana unica est, firma, duriuscula, ut per morbos facile in cartilagineam naturam transeat. In ea vascula sanguinea numerosissima apparent, & colorem rubrum sola faciunt: fibras autem carneas habere, etsi magni & viri, ad vota sua forte & physiologicos usus adfirmant, neque oculo, neque ex irritabili vi unquam

d Marc. Malpighius de Berger de natur. human. p. glandul. conglobat. n. 2. Opusc. 165.  
posthum. p. 46. J. God. de

confirmare potui, & manifesto video, *Malpighianas* fibras, quas membranæ externæ subiectas, carnosas & reticulatas vir magnus describit *e*, alias ad vascula velamenti, alias ad cellulofam telam pertinere. Neque duplex velamentum reperio *f*, aut exteriorem membranam fibroso-tendineam *g*, & interiorem glandulæ quasi tendinem *h* distinguo, cui fibræ internæ inferantur, quæ ad *Nuckii* descriptionem, cum aliqua poetica amplificatione, ut ego quidem credo, fictæ sunt.

§. XVIII. *Cellulosa Tela.*

Postquam ea membrana remota est, cellulosa tela succi plena succedit, mollis, flexilis, cum vasis sanguineis intertexta, quam *muscosam* Cl. viri dixerunt *i*, & ex fibris non cavis fieri recte *Nuckius* docuit *k*. Non alia sunt fibrosa stamina glandularum lymphaticarum, cum innumeris foraminulis ad cribri modum, per quæ lymphæ trajicitur *l*, ab aliis profectoribus descripta; eademque sunt fibræ earum glandularum, quæ per putredinem *Lossio* *m* in-

*e* l. c.

*f* *Nuck* in *adenograph.* C. I. p. 27. 28.

*g* Ita describit, & pingit *Guilielmus Mylius* in *disp. de gland.* quam in II. Tomo collect. meæ recusam dedi, & non inique *Bidloo* tribueris. Conf. n. 4. f. 1. B. D. E.

*h* Ibid. c. c. & n. 5.

*i* L. *Bilsius* apud *Tob. Andree* in *balance balsamat. Bilshan.* & *Clauderian.* p. 7. *Nuck* de *gland. conglobat.* c. 2. p. 33. 35. 36. f. 13. 14.

*k* Ibid. p. 37.

*l* *Tiling* apud Cl. *Bassium* observ. 5.

*m* l. c. n. 12.



notuerunt. Eædem sunt etiam motrices fibræ *Mylii n*, quas in duos ordines divisit, quorum prior, in membrana illa tendinosa quasi radicans, tenderet in folliculum internum *o*: alter circulis concentricis folliculum adiret *p*, in eadem præterea, in qua prior, tunica firmatus. Cellulosam vero fabricam esse, olim amicus noster singularis, magno cum rei naturalis dispendio præmatura morte ereptus, J.G. *Gmelinus q*, in prima juventute sagax monuit: non bene vero ea fila a *Ruyschio* neglecta fuerunt, qui nihil præter vasa, & nescio quos acinulos, in his glandulis descripsit.

§. XIX. *An Glandulas & Folliculos habeant.*

Minores in glandulis conglobatis glandulas passim describi videas. Nam *Marcellus Malpighius r* rotundos acinos, intus cavos, in area fibrarum (cellulosa nempe tela) positos, plenos liquore pellucido, cinereo, in morbis vero tartaro, & descripsit, & contra *Nuckium* non admittentem tuitus est *s*. Eosdem acinos per universam fibrosam glandulæ fabricam dispersos repetiit *G. Mylius t*. Et ipse *Fridericus Ruyschius* acinos nonnullos glomerulorum fimiles

*n* l. c. n. 6.

*o* l. c. p. 5. & 6. A. A.

*p* f. 6. B.

*q* In disp. de glandul. mensenter. Tubing. ann. 1725.

defensa.

*r* De gland. conglobat. p. 1.

2.

*s* In posthumis p. 101.

*t* l. c. f. 5. E. E.

depinxit *v*, verum cavos esse aut liquorem continere *Idem* negavit; *Albinus x* autem pro vasorum glomerulis habuit, in quos liquor injectus non penetrasset: hinc observavit, multos videri acinos, quando omnino vasa non repleta sunt, paucos, si repleveris. Neque cavos acinos reperit *idem*, quem modo laudavi, *Gmelinus y*, neque *Aug. Ludolfus de Hugo z*, qui inter discipulos meos ex carissimis fuit, verum, cum ad summum in arte fastigium nunc cominus accederet, & ipse ex subito morbo interiit.

Sed præterea *Mylius* minimas in externa harum glandularum fabrica glandulas *a* dixit, & internum folliculum *b*, a multis vasculis perforatum. Solus hæc omnia.

### §. XX, Succus proprius.

Succum glandulis conglobatis inesse, album, serosum, lacte tenuiorem, in juniore potissimum animale conspicuum, id quidem certum est. Eum, cremori similem dixit *Thomas Wharton c*, cinereum *Malpighius d*, diapha-

*v* In *Epistola de fabrica glandular.* p. 65. in adjecta

icone, inque *Thesaur.* X. n. y l. c. p. 13.

61. *Thes. omn. max.* n. 118. *z* In *disp. de glandulis & thymo* p. 12.

*Cur. posterior* n. 119. Conf. a l. c. f. I. E. E.

*Boerhaav.* in *Epist.* quam b f. V. c. & f. VI.

modo citavi p. 79. c *Adenograph.* p. 30.

x In *Scholis* quas annis d *Posthum.* p. 46.



num *Nuckius e*, album *Morgagnus f*, recte & ad naturam, ut puto omnes. Etsi enim ego album perpetuo reperi, minime tamen repugnat, ab abundante lymphæ alium colorem admisceri. In morbis sæpe gypseus succus est, in glandulis vero bronchialibus copiosissimus, ex cæruleo niger. Id est atramentum glandulosum nuperi clari chirurgi *g*, quale quid in glandulis renalibus nunquam reperi. In adultis cæterum minuitur, & sæpè, & ante senium, & in senio, ostendi omnino nequit.

Ubinam is succus habitet, nondum confentitur. Ex thymi tamen exemplo, maximæ glandulæ, crediderim, cum *Nuckio h*, omnino in areolis cellularum residere. Nam in tota thymi glandula, ubicunque læseris, exiguo etiam vulnere, in eam violationem lac exprimi potest, neque tamen aut manifesta cavitas reperitur, qua contineatur, neque ex vase aliquo effluere videtur, cum & copia eam guttulam superet, quæ ex vase non magno inciso speretur, neque ex remotis glandulæ partibus per vascula adeo facile in vulnus urgeri posset, & denique manifesto cum spuma ex cellulis cavernulisque exprimatur.

*e* l. c. p. 38.  
*f* *Epist. anat.* IX. n. 27,  
 28. p. 256. &c. in glandulis  
 jugularibus aliisque lymphati-

tici generis.  
*g* *Cl. Nic. le Cat Traité*  
*des sens* p. 379.  
*h* l. c. p. 36.

§. XXI. *Vasa, Nervi.*

Arteriæ rubræ magno numero in glandulas conglobatas veniunt, neque per solam externam membranam diduntur, quam rubro colore imbuunt, sed per cellulofam fabricam plurimæ sparguntur *i*, quarum retia ad humani mesenterii glandulam depicta dedit *Fridericus Ruysch k*.

Iis arteriis venas respondere nemo negat, etsi nemo eas descripsit, uti passim negligi solent.

Nervi certe perpauci eas glandulas adeunt, vix demonstrabiles, etiam quando maximæ sunt. Ita neque in numerosis adeo mediastini glandulis vel unicum nervum ostendere facile fuerit, neque in thymo, insigni glandula, quæ mollior equidem, succo tamen suo & decrefcente in adultis magnitudine, cum his lymphaticis glandulis convenit. Hinc obtusus harum glandularum sensus, quoties tument & suppurantur, ut in scrophulis fit. Non intelligo, quomodo Cl. viris exciderit, numerosos ad eas glandulas nervos advenire *l*.

§. XXII *Vasorum Lymphaticorum ad eas Glandulas iter.*

Sed lymphatica vasa, inque mesentericis

*i* Malpighius de gland. conglob. p. 2. Fuse de his arteriis egit.

*k* In icone *Epistolæ* adjecta, quam sæpe citavimus.

*l* Malpighio de gland. conglob. p. 2. Nuckio p. 46.



lactea, accuratius ad has glandulas Cl. viri, priori maxime seculo, persecuti sunt. Ergo unum *m* vas lymphaticum, aut plures *n* etiam trunculi, conglobatam glandulam adeunt, ut in lumborum glandulis facile visu est, potissimum, quando argentum vivum in imum ductum thoracicum injectum est.

In ramos arterioso modo divisa *o* per eam glandulam sparguntur eadem, communemque legem servant, ut ramorum lumina simul sumta trunci lumine majora sint.

His *inferentibus p*, aut advehentibus, lymphaticis vasculis alia continuantur, quæ *effe-  
rentia* & evehentia ab officio dicta sunt, & ex inferentium ultimis ramulis suis radicibus nascuntur *q*. Nam argentum vivum priori generi vasculorum infusum per alterum facile reddit. Deinde eadem vascula, ad venarum similitudinem, cum aliis sui similibus, in majores trunculos coeunt, atque unicam demum, aut paucas venulas aquosas efficiunt, quæ per rimam dehiscantis *r* glandulæ, non quidem ad ejus interiora penetrantem, egrediuntur. Eadem sæpe ad aliam *s*, & tertiam demum conglobatam glandulam veniunt, perque eas perinde dividuntur, ut per primam; nam ad

*m* Nuck f. 10. 27.

*n* Idem f. II. 12. 26. 28. l. c. conf. Nuck pag. 34. 41.

29.

*o* Nicolaus Stenonis f. de muscul. & glandul. p. 37.

*p* Nomen a Nicolao datum

Kerkring observ. 93.

*q* Nuck f. 26. 27. 28. 29.

*r* Nicolaus Stenonis f. l. c.

*s* Idem l. c. p. 38. Mal-

pighi l. c.

quintam usque glandulam in mesenterio lacteum trunculum, quem mihi selegeram, persecutus sum. Adparet, non tam insignis venæ portarum privilegium esse, quando eadem, & ex coeuntibus venis nascitur, & in discendentes ramos dividitur. Eam enim prærogativam cum omnibus vasis lymphaticis communem habet.

Sunt tamen & inter lymphatica, & inter lactea vasa, non pauca, quæ glandulas suas, obiter, nullo ramo in earum interiora dato, salutatas præter vehuntur, ut in inguinalibus & alibi.

Vasorum aquosorum ad reliquas partes, quæ glandulam conglobatam constituunt, adeo magna ratio est, ut possis eas pro fasciculis aquosorum vasorum habere, quæ per tenacem multamque cellulosam telam conjungantur.

#### §. XXIII. *An Lympha in Glandulas effundatur.*

Verum omnino difficile est definitu, num lymphæ vasculorum advehentium unice in revehencia resumta transeat? Num potius in aliquas glandularum caveas prius effundatur, ex quibus per revehentes ductus resorbta exeat. Utrunque & auctoritatem reperias, & rationes. Et quidem in cavos suos acinos lympham utique effundi *Malpighius* statuit *t*, & experimentum addit, atramentum nempe injectum



in oculis morbosæ glandulæ hepatis stagnasse. Aliud experimentum Ill. olim archiater v addidit; argentum nempe vivum in glandulas conglobati generis pulsum, in minimas guttulas dispersum fuisse.

Contra Ill. *Albinus*, nam *Mylium* præterimus x, uti ex scholis ejus ante quinquaginta annos frequentatis memini, argentum vivum minime in spatiola aliqua glandulosæ fabricæ effundi monebat. In ea enim cavea, si aliqua hujus liquoris in massulas & guttulas effusio locum haberet, nulla porro vi credebat effectum iri, ut in vasa avehantia idem resumeretur. In spatiola enim, quæ nactus esset, porro multo facilius effunderetur, quam quidem per ostiola minora vasorum inhalantium resorberi posset. Sed præterea oleum terebinthinæ, & sebum ab incisore impulsus, addebat in vasis manere, neque in cavitatem aliquam exstillare. In *Brunneri* experimento fluidum metallum casu aliquo ex ruptis vasculis effluxisse monebat. Addi possunt experimenta, dudum y citata, in quibus argentum vivum, & terebinthinæ oleum arteriis rubris impulsus, in vasa lymphatica transit. Ostendit enim hic eventus, arteriolas in vasa lymphatica continuari. Nam, per eadem hydrostatica theoremata, liquor, in arterias pulsus, in cellulosa spa-

v J. Conradus Brunner de pham, neque in conglobatas gland. duodeni c. 2. glandulas deponi.

x l. c. p. 7. Transire lym-

y L. II. Sect. I. p. 224.

tia facilius se diffunderet, quam quidem in minuta ostia venularum pellucidarum resumatur.

Utut hæc sint, certa tamen succi lactei in thymo per cellulosa telam effusio videtur suadere, utique ab arteriis in spongiosa glandularum conglobatarum spatiosa tenuem liquorem effundi, a lymphâ manifesto diversum, lactique propiorem: quem porro resorbentia vasculorum revehentium oscula resumant, cumque lymphâ mistum avehant. Nihilo enim difficilior hæc nobis lactis exhalatio & inhalatio videri debet, quam adipis <sup>z</sup>, multo pigrioris humoris, evicta in cellulosa spatiosa & effusio, & in venas de iis spatiis resumtio. Neque alia ratio fuerit maximæ ad obstructions facilitatis, quam continuo in his glandulis esse ostendemus. (n. XXVI.)

#### §. XXIV. *Series & Systema glandularum conglobatarum.*

De utilitate harum glandularum superest, ut dicamus. Verum ea non satis confirmari potest, nisi enarratis locis, quæ tenent. Per majorem ergo corporis humani partem reperiuntur, tum inter musculos cutemque, tum in cellulosis spatiis, quæ visceribus circumponuntur. Etsi amant comitari vasorum truncos, & venas, imprimis majores, non ideo tamen possis pro propria earum conditione habere,

---

<sup>z</sup> L. I. Sect. IV. p. 82. seqq.



ut vaforum divisioni affideant, quod quidem toti vetustati *a* placuit. Nam & glandulæ plurimæ sunt, quibus vaforum divisiones, ullius momenti, in vicinia nullæ adsint, exemplo glandularum mediastini, & alibi vasa magna dividuntur absque glandulis, ut in aortæ arcu, & artubus fere ubique fit. A cranii tota cavitate absunt, neque huc aut bullas choroidei plexus traxisse oportet, aut conarium, aut pituitariam glandulam: quas enim posteriori loco diximus glandulas, eæ vere de cerebri natura sunt, priores certe & minores, & molliores quam conglobatæ.

In facie adeo incipiunt adparere, circa jugum, quod ex osse temporum, & malæ osse componitur. Ibi enim & parotidi glandulæ conglobatæ inponuntur *b*, & masseteri musculo, male aliquando cum salivæ fontibus conjunctæ. Numerosæ sunt, & anteriorem totam utriusque faciem sequuntur.

Deinde ea series glandulam maxillarem attingit. Eam passim, & in maxilla inferiori supra ejus marginem, qui ad symphyfin tendit, circa arteriæ labialis truncum, & sub maxillæ eadem ora, inque biventri musculo, multæ iterum conglobatæ glandulæ circumstant. *Maxillares externas* vetustiores adenographi *c* dixerant. *Richardus*

*a* Oribasius l. c. p. 80. *Ve-* icone ad diff. de glandulis  
salivæ. etiam L. III. c. 4. p. oris.  
260.

*c* Wharton l. c. p. 128.  
*b* In Nicolai Stenonis f. Nuck l. c. p. 5.

*chardus Hale* *d* ea voce aliter usus est, easque glandulas insignivit, quas vulgo buccales dicimus.

Porro hæc glandularum series cum pharynge *e* continuatur, & ad latus, & ad posteriorem ejus faciem, secundum iter jugularis venæ, & carotidis arteriæ. Adfident inde frequentes venæ præcipuæ capitis, & commune *jugularium* nomen tenent *f*, olim impositum. Earum aliquæ exteriores, ad latus exterius carotidis cerebialis, inter processum maxillarem ossis temporum & primam cervicis vertebam, levatori scapulæ insident: aliæ ad exteriora mastoidei musculi, versus complexum ponuntur, non eæ quidem aut magnæ, aut numerosæ. Has *cervicales* dixerunt *g*, earumque, quæ superiori loco sedent, *occipitales*, non ignoratas *Whar-tono h*.

Donec ad subclaviam venam agmen glandularum jugularem truncum secutum venit. Ibi earum aliæ ad exteriora recedunt, cum subclavia vena, partim supra claviculam, & partim eo osse protectæ, *subclaviæ* dictæ *i*.

Aliæ in sede super claviculam, qua ea cum scapula committitur, supra acromion, trapezio

*d* In *Philos. Transact.* l. c. huc pertinent de *appellat.*  
*e* Ad processum styliformem *part. corp. hum.* L. I. p. 38.  
 usque *Wharton* l. c. p. 123. *g* *Nuck* l. c. p. 6. *Mylius*  
*f* A *Thoma Wharton* impositum l. c. n. 2.  
 situm l. c. c. 19. p. 122. *h* l. c.  
*Conf. Riolanum anthropograph.* *i* *Comper* *append. ad. Bid-*  
*p.* 290. *Cervicales Ruffi* forte *loun* f. 12. E.



musculo teguntur, & *superescapularium* *k* nomine innotuerunt.

Aliæ, inter musculum infraescapularem & costas, ferrato minori musculo tectæ, insignem glomerem constituunt, quas *axillares* vocant *l*. Earum aliæ simplices sunt, aliæ congestæ. Tres fecit *Whartonus m*, ego *n* multo majorem numerum reperio.

In artu porro superiori vix quidquam glandulosi est, præter unam alteramve conglobati generis glandulam, quam in bicipite musculo, prope flexionem cubiti, neque tamen constanter inveni, dudum a variis scriptoribus *o* dictam. Non penitus nunquam etiam in imo cubito, super carpi articulum cum radio, paucas, neque grandes, glandulas offendi. In manu vero, aut pedis planta, ut similes corporis animalis partes uniam, nihil simile glandulæ unquam vidi, etsi clari viri in ea sede descripserunt *p*.

Verum agmen illud jugulare dextrum cum vena cava, utriusque vero lateris cum aspera arteria continuatur. Illæ quidem per pericardii superficiem anteriorem, mediæ inter pleuræ laminas, in mediastini cavea, numerosæ

*k* *Nuck* l. c. *Mylius* l. c. *lumbo de re anatomica* p.

*l* Vide in *Tab. anter. art.* 209. *T. Wharton* l. c. p. 187. *corp. hum.* *T. inque posteriori tabula* V.

*m* *Adenograph.* p. 188.

*n* l. c.

*o* *Car. Stephano de dissect. corp. hum.* p. 129. *Realdo Co-*

*Nuckio* l. c. *Mylio* l. c. *Heistero in compend. anat.* T. II.

p. 34. 35.

*p* *C. Stephanus, Nuckius, Mylius, Heisterus* l. c.

ad septum transversum *q* usque continuato agmine descendunt, & earum aliquæ ipsi diaphragmati insident. Unicam non bene vetustiores lymphographi *r* dixerunt, numerosas *Lancisus* *s* depinxit, non recte vero soli superiori sedi pericardii tribuit, uti pariter non recte pro fontibus habuit liquoris, qui in pericardio reperitur. Eædem sunt *sternales* & *submamillares Nuckii* *t* & *Mylly*, neque enim alias novi, quas eo nomine hi viri intelligere potuerint.

Quæ cum arteria aspera descendunt, eæ utrumque pariter ejus ramum comitantur *v*, & pulmonis grandia vasa circumstant, & anteriores, & posteriores, quarum nomen a pulmone *Nuckius* *x*, a bronchiis *Verheyenius* *y* deduxit, neuter quidem inventor, ut alibi fusi ostendemus *z*. Earum aliquæ pone pericardium in posteriori mediastini cavea *Lancisus* delineavit *a*,

Eæ, quas ultimo loco dixi, insigni numero, & mole, cum œsophago ad septum usque

*q* Hæ sunt glandulæ strumosæ a thymo ad diaphragma dictæ *Francisco Glisson* de *rachitide* p. 12.

*r* *Rudbek* apud *Hemsterhuys* f. nov. 1.

*s* De corde & aneurysm. T. III. f. 1. F. F.

*t* l. c.

*v* Glandulas numerosas inter pulmonem & mediastinum dixit *Idem F. Glisson* l. c.

*x* l. c. p. 6.

*y* *Anat.* L. I. T. 22. f. 3.

*z* Habet aliquas *Rudbek* T. II. f. 1. r. r. s. s. apud *Hemsterhuysum*. D. de *Marchettis* comp. anat. p. 93. *Wepfer* *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. ann. 9.

*a* l. c. f. 2. F. F. F. J.

Nimis autem & numerosas & exiguas pinxit.



transversum descendunt, numerosissimis vasibus lymphaticis mixtæ. Earum aliqua, aut duæ, quæ magnitudine forte excellerent, tamquam solæ ea in sede essent, aut aliquid singulare haberent, pro *dorsali* quadam propria glandula a *Vesalio* *b* descriptæ sunt: eam glandulam *J. Vercellonius* *c* celebrem reddidit, cum falsum in ea, & digerendis cibis utilem succum, discerni sibi persuasisset. Verum omnino neque unica est, ut hi viri putarunt, neque duæ ut alii *d*, neque quatuor aut quinque, ut *Whar-tonius* *e* & alii *f*, sed omnino numerus & incertus est, & constanter magnus, uti recte monuit vir Cl. *Burcardus David Mauchardus* *g*. Lymphaticæ tribui vindicavit, qui tot alios errores felici ingenio profligavit, primarius professor Patavinus *h*.

In abdomine demum hæc eadem series porro ad dextra œsophagi, & ad sinistra conspici-tur, & in utroque gastrocolico, & gastrohe-

*b* L. V. f. 15. F. F.

*c* De glandul. conglomerat. œsophag. p. 59. 60. 112. &c.

*d* Boerhaave *Inst. Medic.* n. 73. Ea est, cujus scirrhum funestum optimo consilio *Præceptor* expugnare docuit apud *Ruysschium* advers. anat. l. n. 10. Itâ ex consilio meo, cum simile fatum ægroto inmineret, argento vivo cum camphora exhibitto, feliciter lethum avertit optimæ olim spei medicus *Daniel Rudolph Ith*, noster olim auditor.

*e* l. c. p. 112. 113.

*f* *Isbr.* v. *Diemerbroeck Anat.* p. 326.

*g* De glandul. appellat. p. 9. Confer icones *Bohlii* T. I. *Everse* de organo chyli T. II. f. 1. 2. & iconem *Narcissi*, quæ omnes a nobis in T. I. collect. anatomicæ recusæ sunt.

*h* *Morgagn. Epist. anat.* IX. n. 42. 43. Monuit etiam *Amatus Bourdon* in magnar. tabular. explicatione, quæ vocatur *description anatomique* p. 49.

patico omento. Illæ quidem sequuntur arcum majorem omentalem ventriculi, ad finem usque gastrocologici epiploï. *Omentales Nuckius* i cum sequacibus vocavit, dudum *Peyero* dictas *k*: neque aliæ sunt *inferiores ventriculi* ejusdem uberrimi harum rerum scriptoris *Nuckii*.

Quæ in minori arcu ventriculi sunt, *superiores ventriculi* huic ipsi Cl. viro dictæ, *gastricæ* vero *Jacobo Vercellonio l*, a pyloro ad vicinas portas transeunt, & truncum venæ, quæ ab iis portis nomen habet, & anteriores *m* ambeunt, & posteriores *n*, quæ ipsi cavæ venæ sub hepate anteriores insident. Et multæ & magnæ sunt. Vesiculam fellis priores adtingunt, ut tamen non bene, quasi unica foret, *cysticam* dixeris *o*. *Hepatis & portæ* glandulas seorsim numeravit *Nuckius*.

Eadem catena glandularum cum vena portarum & arteria mesenterica continuatur, & cum numerosissimis illis mesenterii & mesocoli glandulis conjungitur, quæ alias rectius dicentur.

Aliquæ pancreatis capiti, duodeno inferius adhærenti, adjacent. Cum vena cava porro anteriores glandulæ descendunt, per lumborum vertebrae, lumbalium *p* nomine celebres, toties *Bartholino* laudatæ *q*, quas vir Cl. ob

*i* l. c.

*k* *Merycolog.* p. 109. omnino ante *Bianchum*. Conf. *Joh. Fantoni dissert. anat.*

*l* l. c. p. 50. seqq.

*m* *Ruyfch* ic. XI. ad tract. bb.

de gland. lymph.

*n* *Rudbek* T. I. m.

*o* Uti *G. Mylius*.

*p* *Nuck* fig. 32. &c.

*q* *Lact. thoracic.* in fig. a,



numerosa inmixta vasa lymphatica omnino pro vero in homine chyli receptaculo habuit. Grandes sunt & frequenter intumescunt.

A magnis vasis eadem cum eorum iliacis ramis cognomines *r* ad femora tendunt. Et ab eo agmine alter fasciculus in pelvim descendit, quæ cum vena hypogastrica ramoque ejus obturatorio, & sacris vasis dispersæ, & ipsæ funestis scirrhis obnoxia, *sacrae* Cl. viris *s* dictæ sunt. In pelvi ultimas mesentericarum, quæ rectum intestinum posteriores comitantur, hæ sacrae iterum adtingunt.

Altera catena glandularum est, quæ ad femur cum arteria & vena crurali exit, & sub abdomine ejusque musculis, in iliaco imprimis interno musculo, inter tricipitem & sartorium *t* partim in acervum congestæ, partim singulæ adparent. Illas, cum plures esse credidissem, accuratius numerans, quatuor *v* inveni, octo faciebat *Whartonius* *x* sex septem *Hewson*. Superiores aliæ sunt, aliæ inferiores, *Inguinales* cæterum a sede dictæ, celebres ob bubones venereos, qui earum morbi sunt, & sæpe scirrhusæ, aliquousque cum magnis vasorum truncis ad

*r* *Iliacæ* *Nuckii* fig. 31. T. 55. f. 1. in append. ad  
32. Q. Q. *Rudbekius* unicam *Bidloum* T. I.  
depinxit in fig. 9. apud *Hem-*  
*sterhuys* K. L.

*s* *Antonio Nuckio*, & qui  
fere omnia ab eo sumit, *My-*  
*lio*.

*t* *Comper myotam*, in fol.

*v* Tres disgregatas pinxi,  
nempe de sua sede remotas,  
deque vasis pendentes, in  
*Tab. art. ped. 1. fasciculi*  
*V. quatuor in Tab. art. tot*  
*corp. anter.*

*x* l. c. p. 183.

medium fere sartorium descendunt, a quo musculo *sartoriarum* nomen *Nuckius* y sumsit, ab arteria vero *crurales* dixit z. Qua sede una duæ tres glandulæ reperiuntur.

Sensim rariores factæ, in poplite a\* fere desinunt, & sub eodem in tibia una & altera, in pede nullæ mihi unquam occurrerunt. Hæ & popliteæ, ut ultimæ conglobatarum, ita minimæ sunt.

§. XXV. *Utilitas, in juniore animali major.*

Exposita fabrica, de utilitate harum glandularum inquirere licet. Et primum eam in juniore homine majorem præstare videntur. Nam in fetu maximæ, mollissimæ, succi plenissimæ, inde in juniore animale a; in adulto jam duriores & strigosiores sunt, & earum non paucæ omnino evanescere videntur b, non quod vere destruantur, sed quod solidioris textus cellulosi adtractio adeo exiguas fecerit c, ut obiter intuenti, maxime si præterea adeps eas texerit, omnino non facile adpareant. Nam in maxime adultis corporibus certe thymum in mediastini cavea distinguo, & in mesenterio,

y l. c.

z l. c. *Rudbek* l. c. f. f.

a\* Glandulas in poplite habent *Cl. viri Columbus*, *T. Wharthonus*, *Nuckius*, *Mylius*, *Heisterus* II, cæ.

a *Mart. Lister de humorib.* p. 7.

b De mesentericis *Fridericus Ruysch advers. anat.* III. n. 7.

c In his glandulis rationem solidi ad fluidum perpetuo cum vitæ progressu augeri recte monet *Clifton Wm-tringham* l. c. p. 208.



etiam recti intestini, suas glandulas. Aliquæ in adultis etiam manifestiores fiunt, quod colore se magis efferant, uti de bronchialibus notum est.

Sed etiam succus, qui lacteus in glandulis infantilibus & plurimus adest, in adultis corporibus aut ægre demonstratur, aut omnino, etiam in maxima thymi glandula, evanuit. Eum vero succum utilitatem suam corporibus tenerioribus præstitisse nemo dubitaverit. Lympham ergo ab eo glanduloso lacte admisto dilui credere possis, uti certe admistus iste cremor chylum diluit, & facit, ut pellucidior per vasa lactea secunda a glandulis prodeat, quam per prima subiit *d*. Verum ea hoc ipso cremore tenuior est.

#### §. XXVI, *An Lymphæ motum juvent.*

Plurimi & anatomici & physiologici scriptores, & primus *Malpighius* e fibras musculares his glandulis adscripserunt, & vim aliquam ad promovendum lymphæ iter idoneam, ut vasorum pellucidorum quædam quasi corcula essent *f*: numerosiores ideo in hominis inguine esse lego, quam in brutis, quod humana lymphæ multo magis ascendat, quam in bestiis *g*.

*d* *Ruyfch advers. anat.* III. n. de *fabr. glandular* p. 65. &c. *f* *J. Godofr. de Berger de succi nutritii per nervos transitu* p. 26. & *de natur. human.* p. 167.

*e* *De gland. conglobat.* p. 3. *Lancisius in epist.* p. 14. *Mylius* n. 7. 12. *g* *Morgagn. advers. anat.* II. p. 88.

Verum, si neque fibras musculares nactæ sunt, neque irritabilem naturam, de ea quidem vi desperari potest. Deinde, & per ipsas causas, demonstratur, & per phænomena, non alibi succos humanos frequentius stagnare. Omnino vero repugnat, ibi plerumque motum lymphæ suppressi, ubi nova vis musculosa accessit. Sed in glandulis conglobati generis vulgarissima sedes scirrhorum est. Glandulæ mesentericæ frequentissime *h* duræ, & mole sua auctæ, reperiuntur, & in meis, & in aliorum virorum experimentis, ut omnino non raro pro hydrope suo tumore inposuerint *i*, & ex vulgari theoria atrophiam infantibus *k*, adeo frequentem, inducant: neque imperite certe duo clari medici, *Chudenius* pater *l* & filius *m* huic ætiologiæ curationem hujus mali superstruxerint. In scorbuticis corporibus eos scirrhos frequentissimos esse *Faudacq* docuit *n*, in hypochondriacis *Marcellus Donatus*, in rachiticis *Thomas Morgan p*. Mihi id malum in

*h* Jul. Cæs. Arantius de tumorib. c. 44. Blas. P. I. obs. anat. 13. Ido Wolf. obs. n. 22.

*i* Diemerbroeck anat. p. 40. Sbaragli ocul. & mentis vigil. p. 22. Memoires avant 1699. T. I. p. 404. &c. Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 2. obs. 160. Tulpius L. II. obs. 32. & pro graviditate obs. 33.

*k* Schelhammer oncolog. p. 140. Hildan L. I. obs. 70.

*l* Christian. Fridericus in nova methodo curandi atrophiam.

*m* Valentinus in disputatione defensa Gottingæ 1747. qua parentem tuetur.

*n* Reflexions sur les playes p. 54. & Saviard in obs. chir.

*p* Histor. medic. mirab. p. 336.



pueris Gottingæ adeo frequens apparuit *r*, ut vix mihi temperem, quin solani tuberosi nimium cum inerte vita conjunctum usum accuserem. Sed etiam a venereo veneno facile in scirrhos abeunt *s*.

Verum una cum mesentericis glandulis præque aliæ per corpus humanum glandulæ intumescere solent *t*, lumbales *v*, iliacæ, inguinales, etiam meo experimento, & ipse demum thymus *x*, qui de hac tribu est. Neque uti vera, ita nupera, est adnotatio, in iis corporibus, in quibus glandulæ colli intumuerunt, etiam mesentericas & bronchiales glandulas pariter obstructas reperiri *y*, manifesto argumento, communem in toto systemate conglobatarum glandularum stagnationem dominari. Ita alii Cl. viri viderunt, in collo vix strumas erumpere, nisi in mesenterio pariter numerosæ adfuerint *z*. In scrophulosis mesenterium scirrhis plenum *a* est.

*r* Opuscul. patholog. obs. 39. In gonorrhœa exemplum habet J. de Muralt Vademecum p. 64.

*s* Opuscul. patholog. obs. 45.

*t* Drouin Journal des savans 1690. n. 25. Harder in apiario observ. 61. & 71. Ingrassias de tumoribus p. 229. Warthon l. c. p. 57.

*v* Fontani analect. p. 66. Moebius in disput. qua observ. select. &c. n. 6. Barbette in praxi p. 27. Heister. compend. anat. T. II. p. 29. cum atrophia.

*x* Phil. Conrad. Fabricius in program. anat. ed. 1749. p. 8.

*y* Russel de tabe glandularum p. 23. Conf. Barbette prax. p. 28. Morgagn. Epist. IX. n. 26.

*z* Riolanus in enchirid. anat. patholog. p. 110. Andry orthopedie p. 117. Conf. Vigier Chirurg. p. 65.

*a* Johannes Scultetus observ. 31. post armamentarium. Gerardus Blasius obs. anat. P. I. obs. 12. Muralt Vademecum p. 54.

Denique in tota classe conglobatarum glandularum longe, quam in conglomeratis, frequentiores scirrhi sunt, & cum hac posteriori tribu tota sana Cl. viri lymphaticum glandularum genus scirrhis obfessum reppererunt *b*.

Neque, si ad causas recurras, obscurum est, quare in conglobatis glandulis celeritas fluidi transeuntis minuatur. Perinde enim, ut de rubris vasis dicitur *c*, ita in lymphaticis ad glandulas adpellentibus, celeritas lymphæ minuitur ob majus lumen omnium ramorum, cum lumine trunci comparatum: deinde etsi vasa efferentia pauciora sunt, & in universum inferentibus non majorem habent luminum summam, in iis tamen non potest amissa celeritas reparari, cujus pars non exigua destructa sit, frictione, quæ fit, dum per minora & conica decrefcentia vasa delatus humor parietes suorum vasorum distendit. Ipso experimento adeo potentem retardationem ex his causis in lymphaticis glandulis nasci reperiō, ut nulla vi fluidissimum metallum in lactea vasa impulsū ad totum lacteum systema, aut in ductum thoracicum urgere potuerim, neque magis successisse vidi, cum summus anatomicus *Albinus* id experimentum faceret. Recte adeo dudum observatum est *d*, uti in hepate, sic in conglobatis glandulis, ex mora transeuntis humoris

---

*b* Frid. Ruysch post tract.  
de valvul. lymph. obs. 29.  
Blasius P. I. obs. 13. N. Ste-  
nonis f. de gland. oris. n. 10.

*c* L. VI. Sect. I.  
*d* Rivinus de coagul. hu-  
mor. p. 37.



frequentes scirrhus subnasci. Non necesse fuerit, etsi minime abs re est, cum claro nupero anglo chirurgo adjecisse, si lymphæ iter accelerare vellet, naturam facilius eo fine potituram fuisse, dum musculosam vasis eam vehentibus membranam circumdedit *e*. Quare omnino glandulas, quas descripsimus, lymphæ motum adjuvare, probabile esse non videtur.

### §. XXVII. *Aliæ Hypotheses.*

In aliis hypothesibus etiam minor veri species mihi quidem adparet; ut absque refutatione enarrasse sufficiat: alii asperum aliquem liquorem in his glandulis ex nervis decidere, & ad sanguinem redire *f*: alii spiritus animales ipsos, in his glandulis secretos, lympham constituere *g*: alii lympham, dum per cellulosa glandularum fabricam trajicitur, adtenuari, & spiritu dilui *h* scripserunt: alius demum nuperus auctor glandulas *cacas*, ita enim conglomeratas vocat, jacturam humorum reparare docuit, quæ per secretionem in glandulis *aper-tis*, conglomeratis, perpetua fiat: hinc nostras lymphaticas glandulas, dum altera tribus re-

*e* Guil. Cheselden anat. of human body Edit. VI. p. 218.

*f* Glisson de hepate c. 45. p. 439.

*g* Sylvius de le Boe disput. VIII. n. 40.

*h* Ant. Nuck l. c. p. 46. 47.

paratur, inferviendo confumi *i*. Recte vero ostendit J. *Fridericus Crellius*, neque omnes glandulas conglobatas per ætatem diminui, neque omnium conglomeratarum molem augeri *k*,

---

*i* A. P. *Queitsch* in *select. francof.* T. II. p. 37. &c.

*k* In programm. de glandularum in cæcas & apertas divisione Helmstad. 1741. 4.

FINIS LIB. II.





---

# DE FUNCTIONIBUS CORP. HUM.

## LIBER TERTIUS.

CIRCUITUS SANGUINIS  
EX CORDE IN ARTERIAS,  
EX ARTERIIS IN VENAS,  
EX VENIS IN COR.

---

### S E C T I O I.

#### QUO SANGUIS PER ARTERIAS FLUAT.

§. I. *In Arteriis perpetuo sanguis est.*

**V**ASA, quæ hæcenus descripsimus, aut sanguinem continent, aut lympham, sive arteriæ fuerint, sive venæ. Eorum liquorum nondum aut copiam indagamus, aut naturam: erit utrique requirendæ suus locus. Id unice volumus, & arterias & venas semper suis humoribus, sanguis fuerit aut lymphæ, in vivo animale plenas esse, tum quando vehementer turgent, ut in diastole fit, aut in plethora, aut ab aliis causis, tum quando collapsæ videntur, a frigore, terrore, aliave causa. Et quidem arteriæ rubræ, cordi continuæ, utique sanguinem continent, non tenuem aliquem humorem, non spiritum demum, aëremve, ut pri-

mus quidem *Praxagoras* *a*, deinde *Erasistratus* docuit; *Cicero* *b* vero, *Aretæus* *c*, & alii Cl. viri, pneumaticam inprimis sectam secuti, & *Rufus* *d*, ab *Erasistrato* potissimum persuasi *e* scripserunt.

Plurima contra experimenta fecit *Galenus* *f*, non in alia parte physiologiæ aut uberior, aut magis posteriorum plaufum meritis. Recte ergo ostendit, nullam in vivo animale arteriam aperiri posse, quin sanguis profiliat, & in sinistro cordis ventriculo plurimum sanguinis reperiri *g*, in quo nullum esse *Erasistratus* docuerat.

Reposuerat *Idem* *g*<sup>\*</sup>, quem modo nominavimus, auctor in tantis miseri animalis torminibus, dum cutis detrahitur, sanguinem ex proximis venis ad vulnus & in arterias confluere, per suas, quas continuo dicemus, anastomoses.

Iterum experimento hanc adfirmationem refutavit *Galenus*. Nam arteriæ utrinque liga-

*a* *Galenus* de dignoscend. puls. L. IV. c. 2.

*b* Spiritus ex pulmone in cor recipitur, & per arterias distribuitur, sanguis per venas de natur. Deor. L. II. p. m. 603.

*c* Calorem ex corde in arterias dari *Curat. acutor.* L. II. c. 7. p. 108.

*d* Cordis ventriculus dexter sanguineus, sinister pneumaticus est, cum moveatur ab

accepto spiritu de appellat. part. L. II. p. 59.

*e* *Pollux* edit. *Hemsterhuys* p. 258. Cor sanguinem per venas, spiritum per arterias emittit, & sinus sinister spiritum expellit.

*f* Num sanguis natura in arteriis contineatur.

*g* De *Hippocr.* & *Platonis* decret. L. I. p. 302.

*g*<sup>\*</sup> Num Sanguis &c. c. 6.



tæ, ut aliunde sanguis irrepere nequeat, tamen sanguinem continent *b*.

Deinde ipsa rapiditas, qua sanguis ex incisa arteria erumpit, multo major ea velocitate est *i*, qua sanguis per venas apertas effluit, neque adeo a confluxu cruoris explicari potest, qui ex venis in arterias veniat. Et in vivis animalibus, in mesenterio, nulla parte læsa, nimis facile est, aut inermi oculo, aut vitris convexis armato, quoties in minutis animalibus arterias contemplamur, sanguinis per arterias motum cernere. Neque aliam *Erasistrateæ* opinionis causam fuisse crediderim, præter albedinem arteriarum, per quarum crassas cellulosaque membranas non perinde, ut in venis solet, sanguis translucere potest. Nisi forte, sed hoc subtilius est, vir clar. in suis vivorum animalium incisionibus aërem in corde vidit, qui equidem in venis magis quam in arteriis reperiri, & cum sanguine reliquo, alternis anulis, potissimum in cerebri venis conspici solet *k*. Sed in corde *l* tamen etiam, non quidem magis in sinistro quam in dextro ventriculo, aëris copia & spuma sanguinea non

---

*b* *Administr. anat.* L. VII. cap. ult.

*i* *Second Memoire sur le mouvement du sang.* p. 262. n. I.

*k* Confer similia testimonia *Alexii Littrii histor. de l'Acad. Royal. des scienc.* 1704. obs. 17. *Memoires de l'Acad.* 1714.

*l* *Premier Memoire* p. 153.

non raro, maxime vero per æstivos calores reperitur, non ideo excluso sanguine. Demum in ranis, ut olim in testudine & rana *Redus m* & *Caldefius n*, frequentius reperio o, aëreas magnasque bullas per vasa, equidem perinde venosa, insigni cum velocitate circumferri. Nihil autem ex his phænomenis pro *Erasistrato* sequitur. Neque enim aër in arteriis magis, quam in venis conspicitur, & venæ potius, contra ejus sectæ theoriæ, frequentius aëre turgent: deinde aër, qui in corde reperitur, putredinem equidem sequitur, cumque ejus corruptelæ incrementis, & ipse augetur, neque extra ea tempora adest, quibus sanguinis aër a calore expanditur. Bullæ demum aëreæ frigidorum animalium conspectu raræ sunt, neque ad perpetuam fabricam pertinent, & omnino per vulnus aliquod in sanguinem irrepsisse videntur, cum non conspiciantur, quando omnia illæsa servantur p.

§. II. *Nec a morte arteriæ inanes sunt.*

Deinde arterias a morte perinde sanguinem continere, facile per dissectiones ostenditur, non penitus præter necessitatem, cum *Præceptor* nostro p\* aliquæ voces elapsæ sint, quæ

*m* Giorn. de letterati sup- mouvement du sang Exp. 3.  
 plem. III. p. 86. 9. 198. 214.  
*n* Osservaz. anatomiche in- p l. c. Exp. 17. & p. 188.  
 torno alle Tartarughe p. 67. p\* Instit. Med. n. 213. Ar-  
 o Second Memoire sur le terias fere vacuas esse.



minus cauto lectori persuadeant, inanes in cadavere arterias esse, & alii minime incelebres viri *p\*\** fere similia docuerint. Pauciores certe a morte in arteriis, & in sinistro corde sanguinem reperiri, recte *Harveius* monuit *q*, & pleraque experimenta confirmant *r*, cum arteriæ fere se contrahant, exsiccatione, pressione corporum incumbentium, & frigoris vi, & adtractione spontanea filorum cellulorum, ex quibus componuntur, donec in nuperis experimentis a novem partibus sui luminis ad quatuor redierint *s*, & totæ nunc planæ sint. Verum sanguinem certe in plerisque cadaveribus continent, & incisæ fundunt, & sebo repletæ, cum eo adipe mistum dissectæ ostendunt. Neque eæ solæ sanguinem habent, in quas suo ex pondere, per *Andream Pastæ t*, eruditi medici, experimenta, sanguis se confert, verum & aliæ, & minimæ, quas rubor contenti sanguinis solus conspicuas reddit, alias evanituras, & majores demum arteriarum trunci sanguinis momentum retinent. In suffocatis, & animi deliquio extinctis, sanguinem in arteriis reperiri *Harveius v* falsus est; de ebriis vero & ex malignis morbis mortuis *Cl. Schwenke x*: ab aortæ demum trunco prope cor nunquam abesse testis

---

*p\*\** *Cl. Perrault du mouvement peristaltique* pag 136. *J. Theod. Schenk hîmor. humor.* pag. 68. *Jacob. F. Boissier in comment. ad Peyeræ observ. anat.* 17.  
*Halcsii hæmastatiks* p. 9. *s* *Lamure de secret.* p. 26.  
*q* *Diff. de motu sang.* p. 93. *t* *De motu sanguin. post mort.* Epist. I. p. 4. seqq.  
*diff. II. p. 208. diff. III. p. 223.* *v* *Diff. III. p. 225.*  
*r* *J. Pecquet diff. anatom.* *x* *l. c. p. 84.*

est *Lancisus* y cujus, & *J. B. Morgagni* z, experimenta cum meis consentire gaudeo.

Id utique verum est, venas, quam arterias, sanguine magis turgere; arteriæ enim densiores per eas causas, quas excitavimus, sanguine se liberant. Eum venæ recipiunt, & coguntur retinere, cum cor pondere suo resistat; neque, etiam si non resistat, præter paucas uncias recipere possit. Hinc in truncis majoribus a atque, in cava vena prope cor b, maxima cruoris copia fere semper præsto est. Hanc phænomeni causam dudum eximius *Harveius* indicavit c. In strangulatis, & apoplecticis plenissimæ reperiuntur d.

§. III. *Sanguis a corde in arteriarum truncos, a truncis in ramos, ex ramis in vasa minima fluit.*

Verum is sanguis in vasis suis non quiescit unquam, dum vita superest, neque quisquam accessit opinioni Itali medici, cujus apud *Valisnerium* e epistola exstat, & ea fuit conjectura, ut sanguinea massa tota solidam fibrosam & musculosam machinam vasis conten-

y *De corde & aneur.* p. 64. ed. fol.

z *Advers. anat.* II. p. 83.

a *Diss. anat.* p. 93. tum *G. Bagliv. exp. med. pract.* p. 679.

b *Bartholin hep. defunct.* p. 44. 45.

c *Harvei Exerc.* I. p. 93. III. p. 251. *Pechlin de pur-*

*gant.* p. 484. *Peyer obs.* 13.

d *Panarol. iatrológism. Pen-* *tecost.* I. obs. 13

e *D. Capilupi apud Valis-* *nerium oper. omn.* T. III. p. 320.



tam efficeret. Sed nimis experimento contrarium errorem non adtinet refutasse. Celer enim motus sanguinis in animalibus viventibus, inque eorum aut arteriis, aut venis, facillime ostenditur *f*. De directione quæritur. qua sanguis aut per arterias aut per venas movetur.

Et de arteriis quidem supervacua omnino cura videri potest, cum nulla veræ contraria opinio unquam prolata sit, & omnis perinde antiquitas, uti tota recentiorum schola, nemine refragante, docuerit *g*, sanguinem a corde per arterias in minutissimos earum ramulos fluere. Paucas enim voces bono seni *Leeuwenhoeckio* condonabimus, viro in universum non erudito, & quem vigor animi deseruerat *h*, quando horum contraria scripsit.

#### §. IV. *Ostenditur per vincula.*

Et tamen præstat etiam hanc partem veri suis experimentis munivisse, ne aliquis paradoxorum amator existat aliquando, qui hanc inermem medicæ theoriæ partem convellere suscipiat. Ergo arterias varias in plurimis animalibus ligavi: in calidis quidem animalibus

*f* Vide Sect. IV. & VI. du second Memoire sur le mouvement du sang.

*g* Vide Galenum quod sanguis in arteriis natura continetur c. 4. & de utilitate pulsus. c. 5.

*h* Phil. Transact. n. 319, Epist. physiolog. p. 167. Sanguinem in arteriis lente moveri, & ad cor redire, neque pulsus in arteriis esse docet.

cruralem anteriorem *i*, posteriorem *k*, aortam *l*, carotidem *m*, & demum pulmonalem arteriam *n*, in ranis vero arteriæ aortæ truncos duos, qui cordi proximi ex aorta nascuntur *o*. Ea administratione facta vidi, eam partem, quæ cor inter & vinculum est, vehementer sanguine repleri, cæruleam reddi, intumescere, & cruoris maximam vim, insigni cum vehementia, ejicere, quando inter cor & linum vulnere perforatur. Optime vero succedit in aorta, quando supra cor ligatur, sive calidum animal fuerit sive frigidum. In umbilicalibus arteriis *Galenus* experimentum fecit, in pulmonali nuper *Cl. Portal* *o*\*. Quæ vinculum, ea tumor facit, qui arteriam comprimit. In sarcocoele arteriæ testis digiti crassitie fuerunt *o*\*\*<sup>o</sup>. Cum aorta arteria in abdomine amplissima esset, eadem supra cor & una carotides latissimæ *o*\*\*\*<sup>o</sup>. Contra eadem arteriæ in parte a vinculo ad extremos arteriæ fines tendente, pallecebant, albæ fiebant & planæ, & apertæ nullum sanguinem percussæ dabant. Iterum, soluto vinculo, sanguis veniebat in partem arteriæ a corde remotiorem, & pulsum & nativum lumen restituebat *p*.

Dudum hæc experimenta a præstantissimis

<i>i</i> Second Memoire &c. Exp.	<i>o</i> * Colomb p. 22.
47. 57. 58.	<i>o</i> ** Sw. Wet. Ac. Handl.
<i>k</i> Exp. 48.	1737. n. 1.
<i>l</i> Exp. 52.	<i>o</i> *** Lieutand Sepulchret
<i>m</i> Exp. 51.	II. p. 94.
<i>n</i> Exp. 51.	<i>p</i> Exp. 206.
<i>o</i> Exp. 53. 204. 206.	



viris facta sunt, & arteriam ligatam inter cor & vinculum intumescere *Vesalius q* ante *Harveium r* monuit, & alii *s* prioris seculi incisores eundem hujus periculi eventum viderunt. Infra vinculum detumescere Idem princeps in experimentis *Harveius t*, & in pede atque collo anferis *v*, tum in splenica & coeliaca arteria, *x* *Pecquetus* vidit, & alii similia viderunt *y*. Et nuper, cum *Homobonus Pisoni* iter sanguinis *Harveianum* impugnaret, Patavii eodem cum successu experimentum repetiit, ipso *Homobono* teste *z*, Illustris *Morgagnus*. Paulum alia ratione, iterum *Harveius* ex arteria incisa sanguinem a sede cordis vehementer, a parte a corde remotiori languide effluxisse vidit *a*, quod idem experimentum sæpe, etiam in umbilicali pulli ovo contenti arteria, institui. Arteriæ trunco resecto, rami inter cor & sectionis locum nati detumescunt, neque sanguinem fundunt *b*, iterum evidente testimonio, sanguinem ex corde in ramos & vulnus tendere.

Verum quotidie alio, tamen pariter salutari consilio, chirurgi idem experimentum re-

*q* De fabrica corp. hum. p. 568. 569. edit. Leid.

*r* l. c. p. 79.

*s* J. Pecquet diff. anat. p. 27. Job. Walæus diff. de motu sanguin, edit. 1641. p.

389. Carolus Drelincourt canonicid. 9. Ph. Verheyen L. II. p. 204.

*t* l. c. p. 104.

*v* l. c. p. 29.

*x* Ibid. p. 30.

*y* Vopiscus Fortunatus Plemp. fundam. medicin. p. 117. Job. Walæus l. c. Phil. Verheyen l. c.

*z* De circulat. sang. p. 406.

*a* Exerc. III, p. 236.

*b* Salmon de utero p. 27.

petunt, quoties in vulnere plurimum sanguinem fundente, aut in aneurysmate, inque membrorum amputatione sanguinis ad aliquam corporis regionem iter intercipere volunt. Comprimunt enim arteriam, aut omnino cor inter & eam regionem vinculum injiciunt. Dudum *Galenus* in hæmorrhagia arteriam immarcescibili filo ligabat *b\**. Ligata carotide arteria hæmorrhagia narium suppressa est *c*. Hinc sanguis, quem cor inpulit, arteriam dilatat, quoties ejus pars remotior ab inflammatione *d*, aut ab alia causa impervia facta est.

#### §. V. *Objeçtio cui respondetur.*

Est tamen quod objici possit *e*, etsi nondum objectum est. *Johannes Riolanus f* olim adnotavit, cum arteria cubitalis supra vulnus firmiter ligata fuisset, tamen ex eo vulnere sanguinem exstillasse. Ipse vidi, cum arteriæ radialis truncus in juvene vinculo interceptus esset, tamen ex ejus parte inferiori, exque manu aliquantum sanguinis effluxisse. *Johannes Walæus* arteriam bis ligatam, inter duo vin-

*b\** De Method. Medend. L. XIII.

*c* Matth. Gottfrid. *Purmann* im chirurgischen Lorberkranz p. 351.

*d* F. de Sauvages L. de inflammation. cum *Halesio* edito p. 281. *Theophilus Lobb* of fevers p. 247.

*e* Movit eam objectionem *Præceptor prælect. Acad. T. II. p. 37.*

*f* In notis ad *Walæi* epistolas p. 621. edit. fol. Vidit *Walæus* *Epist. II. p. 416.* qui numerus adesset, nisi in curia typographi omisisset.



cula vidit sanguinem fudisse g. Neque rarum est, cum arteria brachialis ob aneurysma vinculo intercepta fuisset, eam sub eo vinculo sanguinem fudisse g\*. Ex hoc eventu adnotato procul dubio chirurgorum cautela nata est, ut bis arteriam brachialem incisam ligent, & supra vulnus, & infra, ne sanguis sub unico vinculo effluat h.

Recte hunc scrupulum solvit *Præceptor* optimus i, & eum sanguinem, qui infra vinculum effluit, qua parte nullum oportuerat effluere, ad anastomosin aliquam refert, quæ sanguinem, ex vicino aliquo, supra sedem vinculi nato, trunco in eam partem ligatæ arteriæ adfert, quæ supra vinculum est. Ita certe, in exemplo a *Præceptore* citato, fieri potuit, ut ex ligatâ carotide supra vinculum sanguis exsiliret. Eum enim sanguinem plurimi alii, qui liberi manserant, trunci eo mittere potuerunt: ut vertebralis arteria per duos ramos, qui circulum *Willisii* constituunt, aut alterius lateris carotis, per anastomoses arteriarum thyreoidearum superiorum, coronariarum labii inferioris, superioris, nasalium, dorsi lin-

g Ibid.

g\* *Bertrandi chir.* II. p. 207.

h *Pigrai præcept.* L. II. p. 243. *Wisemann oper. omn.* p. 357. *Saviard obs.* 34. *Alex. Monroo in Essays of a society at Edinburgh* T. II. n. 15. T. IV. n. 17. R. J. C.

*Garengeot operat. de chirurgie* T. III. p. 249. *Le Dran operat. de chir.* p. 39. *Molinelli de aneurysm.* p. XXII. obs. 4. *Vylhoorn in Heisterum* p. III. *Sharpe present. state of surgery* c. 36. p. 209. & alii, vix ullo excepto. i Eodem loco.

guæ, ossis hyoidis, aliasve, quas maximo numero excitavimus *k*. In brachio, quoties ob aneurysma arteria brachii vinculo intercepta fuit, potest per vulnus a lanceola chirurgica inflictum sanguis emicare, quia arteriæ retrogradæ *l* ab ulnari, a radiali, aque interossea, infra vinculum natæ sanguinem per profundam humeri, atque anastomoticam humerariam supra vinculum liberam acceperunt, inque trunci brachialis partem vinculo inferiorem, adeoque in vulnus miserunt. Ita ex arteriis manus, ex radiali arteria ortis, cum is truncus supra manum ligatus esset, tamen sanguis profiliit *m*, & in eandem arteriam pulsus, qui per dies aliquot evanuerat, rediit *n*, quia arteria ulnaris per subcutaneum arcum volæ, & per profundum arcum, aliasque numerosissimas communicationes, sanguinem in radialem truncum reddidit, ut & micare, & ex ramis suis sanguinem dare potuerit, etsi nihil a corde accipiebat.

#### §. VI. *Alia objectio.*

Alia iterum objectio ex tumoris defectu su-

*k* Confer anastomorum enumerationem ex L. II. Sect. I. n. 21.

*l* Dudum *Johannes van Horne* rem sensit, de aneurysmat. p. 347. ed. Lipf. deinde uberiorius exposuit *J. B. Winslow* *exposit. anat.* T. III. *Traité des artères* n. 40. & alii. conf.

*Fascicul. V. icon. anat.* p. 22. 23. *Molinelli* de aneurysm. obs. II.

*m* Confer, v. c. *Colleg. chirurgic hanoveran.* obs. 26.

*n* *Molinelli* l. c. p. VII.

Post trigessimam horam a re-  
vincta arteria brachii pulsus  
rediit. Adde *Act. Edinburg.*

T. II. p. 284.



mi posset, cum omnino arteriæ lino vinctæ non semper super vinculum turgeant, aut sanguine repleantur, atque adeo, quæ paulo prius produximus, experimenta non videantur firma esse.

Nempe certum est, arterias ligatas nonnunquam, & in mesenterio inprimis, non intumescere o; & si continuo intumuerint, tamen eum tumorem neque constantem superesse, neque, ut probabile videbatur, cum tempore augeri p. Utrumque ipse vidi, aliique ante me clari viri.

Verum in prioribus exemplis sanguis in arteria valde ramosa, a sede revincta fugiens, per liberos ramos evadit; & vasa, in iis animalibus alioquin a vi cordis non dilatabilia, dilatare ne conatur quidem: & in altero exemplo, eadem causa est. Neque minus verum est, a corde per arterias sanguinem advenire, etiamsi nunc in alios ejusdem trunci ramos venit.

#### §. VII. *Oculi testimonio verum confirmatur.*

Ut hæc experimenta se habeant, manifestiora alia supersunt, quæ ostendunt, omnino a corde per arterias inde natas ad minimos usque furculos sanguinem impelli. Nam in rana, cujus mesenterium nudum lenti vitreæ

---

o *Second Memoire sur le* mor nullus nobis visus est.  
*mouvement du sang.* Exp. 54. p *Sauvages patholog. me-*  
 93. 188. Cl. *Remus* p. 43. *thod.* p. 125. 126. *de pulsu*  
 50. Etiam in carotidibus tu- p. 26. &c.

opponitur, aut in pisciculorum pellucente cauda, facillimum, & gratum est, torrentem videre sanguinis, qui ex cordis sede per arterias versus earum ramos, & ad minimos usque ramulorum fines, tamdiu perenni fluente fertur, quamdiu vires cordis sufficiunt. Vidit olim, ex innumeris operum locis, *Antonius v. Leeuwenhoeck q*, vidi & ego frequentius *r*, quam opus sit in re, de qua nemo litem movit.

Et tamen etiam hic calumniæ locus superest, nisi eam removebimus. Certum est enim in moribundo animale *s*, aut in eo *t*, cujus arteria lanceola incisa, aut casu aliquo vulnerata est, frequenter omnino, sanguinis motum ita corrumpi, ut in arteriis a minimis finibus versus cor retrocedat, aut versus sedem vulneris, atque adeo contra eam legem pugnet, quam diximus adeo constantem esse, & receptam. Frequenter eadem retrocessio locum habet, quando sanguis alicubi, & in minimis arteriis stagnat *v*, & cordis jam debilis impetus minus valide sanguinem impellit, quam huic cruori, qui in minimis retinetur, & novæ a corde accedenti undæ, resistitur. Solet tunc sanguis prius oscillare, & alterna directione

*q* Vide v. e. *contin. arcan.*  
*natur.* Ep. 112.

*r* *Second Memoire* Sect. IV.  
 tot. in exp. fere omnibus ut  
 59. 61. 62. 63. 64. 65. &c.

*s* Exp. 66. 68. 69. 87. 93.  
 95. *Premier Memoire* p. 63.

*t* Exp. 152. 154. 155. 156.  
 166. 170. 172. 173. 175. 176.  
 180. 187. 199. 201. 221. 222.  
 223. 226. 229. 231. 234.

*v* Exp. 92. 93. *Premier*  
 p. 63.



modo a corde quidem versus extremos fines arteriarum fluere, modo vero inverso itinere ab iis finibus versus cor redire  $x$ , donec vel plena quies succedat  $y$ , vel superato obstaculo victrix vis cordis sanguinis nativum iter restituat  $z$ . Oscillationes etiam viderunt ante me clari viri *Marcellus Malpighius*  $a$ , cujus experimenta etiam apud *Baglivium* exstant  $b$ , *Antonius Leeuwenhoeck*  $c$ , *Antonius de Heyde*  $d$ , & *Hermannus Boerhaave*  $e$ .

Deinde retrogredi etiam in homine sanguinem, & ex minoribus arteriis in majores, atque ad cor demum redire, multa sunt, quæ manifesto ostendunt. Quoties enim frigus artus adeo constrinxit, ut exalbescant, & pulsu destituantur, sanguinem repulsum versus cor fugisse necesse est: venæ enim ab eadem causa, etiam magis imperviæ fiunt, quam arteriæ, & prius quam arteriæ evanescunt. Sed in aliis etiam animi deliquiis, quoties color genas fugit, & calor, & in inflammationibus, quæ subito disparent, succedente post summum ru-

$x$  l. c. Exp. 65. 66. 68.  
69. 72. 73. 87. 93. *Premier*  
*Memoire* p. 60. seqq.

$y$  Exp. 69. *Premier Me-*  
*moire* p. 62. *Leeuwenhocck*  
*exper. & contemplat.* Tom.  
II. p. 164. 165. Tom. III.  
p. 112.

$z$  Exp. 66. 69. 93. 95.

$a$  *Posthum.* p. 92.

$b$  *Oper. omn.* p. 679.

$c$  *Arcan. natur. detect.*

*Epist.* 65, p. 164. 165. 170.

*Epist.* 67. p. 205. 206. *Conti-*

*nuat. arcan. natur. Epist.*

118. p. 111. & alibi.

$d$  *Centur. observ.* n. 85.

$e$  *De usu ratiocin. mechani-*

*ci* p. 34. in *Prælect. Acad.*

Tom. II. p. 298. & apud J.

G. *Haymann* in *comment.*

Tom. IV. p. 484.

borem pallore *f*, ab arteriis minimis cutis in truncos majores sanguinem refugisse necesse est. In terrore genæ expallescent, & sanguis in cor, inque magna vasa congeritur. Denique a vulnere sanguinem ex ramis arteriæ in truncum revocatum fuisse, experimento Ill. Archiatrorum comes confirmat *g*.

Verum hæc omnia non debuerant *Leeuwenhoeckio* imposuisse *h*, uti imposuisse videntur. Quamdiu animal viget & recte se habet, tamdiu etiam iter sanguinis a corde ad minimas arteriolas continuatur. Morbus est, debilitas cordis, vis illata, aut obstaculum insuperabile, quæ nativum flumen retrogredi cogunt. A morbis vero & mortis initiis argumentum contra ea phænomena sumi iniquum foret, quæ in sano & vigente animale manifesta sunt.

---

*f* Habent hanc retrocessionem *Bernardus Siegfried Albinus de vasis intestinorum*, *P. Senac du cœur* Tom. I. p. 174. *F. Boissier de Sauvages de l'inflammatione* p. 248. *Franciscus Quesnai de la saignée* ed. 1736. p. 208. edit. 1740. G. v. *Swieten comment.* Tom. I. p. 214. *g* *Lettres de Morisson sur le choix des saignées* p. 52. *h* Not. *h* p. 372.





## S E C T I O II.

## ITER VENOSI SANGUINIS.

§. I. *Venosi sanguinis fluentum arterioso contrarium,*

UTI dudum arteriosi sanguinis flumen vetustas accurate vidit, ita in venosi cruoris itinere definiendo minus omnino felix fuit. Eamdem nempe, quæ arteriosi sanguinis est directio, etiam venoso antiqui medici tribuerunt, ut perinde ex corde per venam utramque ad extremos earum fines sanguis dideretur, eo cum discrimine, ut per arterias vitalis spiritus, per venas nutritius sanguis ad omnes ultimos vasculorum fines, totumque corpus animale veheretur. Hoc memorabili exemplo communis omnium medicorum erroris monemur, ne quidquam pro vero ideo recipiamus, quia receptum est, sed experimenta requiramus, quæ fidem nostris opinionibus faciant, tamdiu dubii.

§. II. *Ostenditur à Valvulis.*

Ergo ostendendum est, utique contrarium sanguinis per venas iter esse, atque sanguinem per id vasorum genus, a minimis vasculis aque omni corporis animalis ambitu ad cor redire. Poterant hanc summi momenti veritatem valvulæ venosæ

vel solæ dudum, aque ipsius *Hieronymi Fabricii* temporibus constituisse, & mirum certe efficaciae præjudicatarum opinionum exemplum est, potuisse hunc virum eas valvulas sub vinculo brachio circumjecto tumidas pingere *i*, neque sentire, nunquam futurum ut turgerent, si sanguis per venas a corde adveniret: eum enim sanguinem in ea hypothese vinculum omnino a manu avertisse debebat. Fecerat experimentum, viderat in vivi hominis brachio sanguinem versus cor compulsus cedere, contra si eundem contra manum urseris, resistere utique valvulas, & in nodulos intumescere: & eo ipso experimento ad valvularum cognitionem se quasi manu fuisse ductum *k* ipse auctor est. Nihil autem in ea fabrica vidit, nisi causam moræ in sanguinis motu, & naturæ cautelam, ne in musculorum actione sanguis ex vena cava nimis rapide ad artus raperetur *l*. Sed neque *Salomon Alberti* felicius summa opportunitate inclarescendi, & inveniendi veri usus est *m*, neque passus est se a loquente natura persuaderi nuperior medicus *Homobonus Pisoni n*.

Sapientius, & cum maximo generis humani emolumento, easdem pelliculas *Harveius o* contemplatus est. Nempe valvularum sinus

*i* De venar. ostiis Tom. celeriter prætervehatur, addidit *histor. plerarumque partium* p. 164. 169.  
 II. f. 1.  
*k* Ibid. p. 2.  
*l* Ibid. p. 3.  
*m* Sanguinem in sinu valvularum colligi, ne nimis *n* In disquisit. nov. in circulat. sang. p. 415.  
*o* De motu cordis c. 13.



versus cor aperti patent, versus extremos vero artus cæco fine iidem terminantur *p.* Igitur sanguis, qui ab artubus advenit, inter convexa valvularum dorfa viam sibi faciet, easque contra parietes venarum adprimet, ut omnino nullum inde obstaculum experiatur. Contra, quando idem sanguis a corde versus extremos artus pellitur, offendit in aperta sinuum valvulorum ostia, inque ea subit, cæcoque fine retentus, & parietem venæ extrorsum urget, ut in nodum intumescat, & valvulam versus axin venæ cogit tumidi in modum veli explicari, atque adeo lumen venæ, quam late potest, claudere: ita ea sanguinis unda neque ipsa transit, nam in imo fundo sinus valvulosi retinetur, neque proximam undam finit transire, quæ alioquin per axin venæ viam inveniret, quam vela valvulosa a sanguine inflata, nunc utrinque in caveam venosam prominentia, aut totam claudunt, aut tamen insigniter arctant.

§. III. *Magna valvularum utilitas.*

Mirum est, potuisse adeo nuper, & quidem iatromathematicum virum *q*, ab hac adeo manifesta valvularum utilitate oculos ita avertere, ut negaret sanguinem ad partes extremas regredi, atque adeo persuaderetur, ad id vitiosum

*p* L. II. Sect. II. n. 16. p. 263.

*q* Georg. Ebrhard. *Hamburger physiolog. medic.* p. 84.

tiosum iter impediendum nullum valvularum officium requiri. Regredi enim utique, & frequenter admodum, continuo ostendemus; & præterea refluxui arteriosi sanguinis potentissima cordis impulsio opponitur, venoso vero sanguini a truncis relapsuro præter valvulas nihil resistit, nisi debilis vis sanguinis, a minimis tubulis venarumque gracilibus radiculis redeuntis. Prudentius olim, si fides in historia est, intellexit P. *Paulus Sarpi*, sanguinem non posse non in venis ad artus relabi, eaque ipsi inveniendarum valvularum causa fuisse dicitur; requiri enim aggerem, qui sanguinem relapsurum sustineat, vir acuti iudicii sensit.

Sed etiam in musculorum actione summa valvularum utilitas est, ut pressionem omnem sanguinis versus cor determinent. Nullæ si forent, tumentes utique muscoli perinde venas interpositas conprimerent, & tota hæc pressio posset in duas partes æquales mentis acie dividi. Prior ergo medietas sanguinem versus cor urgeret utique; & hætenus sanguinis iter & reditum juvaret. Verum altera medietas sanguinem versus artus extremos finesque venarum retroageret, & ab universo corporis ambitu redituro sanguini undique resisteret. Tantum ergo a musculorum tumore impedimenti in sanguinis circuitu nasceretur, quantum ac-

---

\* Charleton three lectures, p. 19. ex vita F. Pauli & Fulgentio descripta.



cederet remolumentum. Nulla enim ratio assignari potest, quare a musculis non perinde versus artus, ac versus cor, sanguis venosus urgeretur. Nunc, postquam valvulae factae sunt, tota musculorum actio, qua venas tumentes comprimunt, unice circumeuntem sanguinem adjuvat. Integra manet vis, qua sanguis versus cor urgetur: altera vero pars pressionis, circuitui noxia, a valvulis sustinetur, neque effectum suum, naturae finibus contrarium, exserere, aut sanguinem venosum in artus urgere potest. Dudum hæc clari ante me viri viderunt. Hinc artus potissimum valvulis muniuntur, viscerum venae non item. Nam in artubus muscoli sunt, quorum vis circuitum sanguinis adjuvare potest, in visceribus non perinde efficax.

§. IV. *Officium experimentis confirmatur.*

Facillime hanc valvularum potestatem injectio sebi anatomici demonstrat *t*, quoties tubulus venae axillari inmittitur: sebum enim contra iter venosi sanguinis impulsu valvulas obvias distendit, inque nodulos v earum sinus intumescere cogit, & vix unquam succedit,

*s* Claudius Perrault du mouvement peristaltique p. 140. *t* Stylo cedunt ad cor ducto, retrorsum actio resistunt  
*Mecanique des animaux* p. 124. *Harvei* p. 124.  
 256. Clifton Wintringham l. v *Icon. anat. Fascic. VI.*  
 c. p. 225. Tab. III. *Monroo de semine*  
*& testib.* T. I. f. 2.

ut aliqua tolerabilis perfectio in venarum repletionem obtineatur. Et si enim utique neque cordis, neque lymphaticorum vasorum, neque hæ venarum valvulæ, adeo severe custodiam suam exercent, quin aliqua pars sebi inter tumentes sinus viam inveniat, & relabatur, tamen numerus valvularum id omne fere subplet, quod perfectioni unius paris deest, & quam ceram primi custodes translabi siverunt, eam secundi, aut tertii retinent, neque sinunt ad minimas venas relabi. In vivo animale vero credibile est, firmitatem quidem vimque contractilem valvularum majorem esse, quam est in cadavere: & valvulas a columnis redeuntis sanguinis contra undas relapsuras sustineri, quod auxilium iterum a cadavere abest; & demum rarissime ea vi venosum sanguinem retroagi, quam professor adhibet, qui siphone anatomico ceram suam urget. Denique in cadaveribus aliquid de perfectione functionum naturalium deficit. In vivo animale omnia plena, omnia pressa sunt, & valvulæ magis introrsum premuntur, & ipsas venas angustiores esse certum est. Sive nunc incisi animalis partes a vicinarum pressione liberaveris, sive omnino in cadavere experimentum feceris, non mirum erit, valvularum intervalla aliquanto amplius patere. Ita etiam in corde, cujus valvulæ utilitatem habent a nemine in litem revocatam, tamen & a morte sebum sæpe ex aorta repalsum in ventriculos regurgitat, & inciso corpore, compressa auricula dextra cruorem in ea-



vam venam refundit v\*. Poterunt ergo in vivo animale valvulæ suo officio perfectius fungi, & omnino in vivo homine ejusque tumente brachio fungi videntur.

§. V. *Contrarium experimentum.*

Non oportet dissimulasse, passim aliqua experimenta ostendere, valvularum custodiam non adeo castam esse, ut quidem theoria requirit. Nam & aër in iliacam venam pulsus ad pedes usque penetravit v\*\*, & in viva equa valvulæ sanguinem relabentem sustinuerunt v\*\*\*, & inter duas valvulas incisa vena tamen sanguinem fudit v\*\*\*\*. In vivo demum homine lac in venam incisam immisum, ea directione, qua ad manum pergeret, aliquantum ab hac theoria visum est recedere. Rediisse enim, sed paulo post in venam relapsum esse, & venas inferiores inde intumuisse, cum frigoris sensu versus digitos procedente, & post quindecim horæ minuta soluto vulnere lac cum sanguine non prodiisse utique legimus x. Hæc experimenta id solum ostendere videntur, si vis vehemens accesserit, valvulas nonnunquam venas suas non satis diligenter claudere.

v\* *Second Memoire sur les parties irritables & sensibles* p. 392. *Exper.* 474. 551. 553. 557.

v\*\* *Riolan respons. ad Harvei* p. 77. *Pisoni ult. antiquit.* p. 64.

v\*\*\* *Hales hæmastat.* p. 14.

v\*\*\*\* *Meibom de valvul.* n. 58.

x *Pisoni ult. antiquit.* p. 64. *Disquisit.* p. 417. 418. *Suspiciatur Mangetus theatr.* p. 955. tubulum non fuisse in venam missum.

§. VI. *Ponderi sanguinis resistunt.*

Valvularum in universum functionem diximus. Peculiare vero officium est, quo ponderi sanguinis resistunt. Vim enim ponderis utique in vivo animale, valvulis destituto, sanguinem venosum regere, numerosis exemplis ostendi *y*. Ergo in sedente homine, & in stante etiam magis, sanguis venæ cavæ, & cruralium vasorum, non ita sincera vi ad cor credit, quin in pedes relabatur, si is situs corporis diuturnior fuerit, aut sanguinis copia major, aut aliqua corporis debilitas, aut redeunti sanguini nata difficultas: hinc illæ præconum *y*\* & haruspicum, & feminarum demum gravidarum varices: hinc oedemata hominum, qui minus adfueti, aut diutius, stando officio funguntur, aut pendulis cruribus curru vehuntur; hinc nimia nonnunquam infantum capita *z*. Et varices quidem a valvulis iterum nascuntur, in quas relabens sanguis venæ parietes extrorsum urget, etiam magis, si musculorum actio accesserit, quæ sanguinem, ex compressis venis, in earum sinus premit *a*.

Multum tamen hic valvulæ profunt, & pericula relapsuri sanguinis minuunt *b*. Si enim,

*y* Second Memoire p. 388.  
389. Exp. 205. 207. 209. 213.  
219. 223.

*y*\* Bernardin Ramazzini de morbis artificum c. 29.

*z* Bidloo Exercit. Anat. Chirurg. VI.

*a* Franciscus Bayle problem. 16.

*b* Dudum hæc nota sunt. Vide inter nuperos Cl. Nicholls compend. anat. æcon. p. 3. Brun otia physiol. p. 28. Boerhaave in Prælect. ad n. 133.



simplicitatis gratia , unicum par valvularum posueris, & columnam superiorem dixeris eum sanguinem , qui in cava vena, inque trunco valvulosæ venæ, supra id ostiolum est: inferiorem vero columnam eam vocaveris, quæ infra valvularum jugum est: utique tunc, si valvulæ nullæ forent, columna superior toto pondere contra inferiorem niteretur, eamque etiam a proprio pondere relabentem, & debiliter ab arterioso sanguine in pedibus lentius moto propulsam, omnino facile retroageret, ut in pedes venosus cruor colligeretur, neque posset ad cor redire. Nunc, utcumque a gravitatione sua superior columna deorsum retroagatur, tamen a valvulis sustinetur, eas distendit, aque earum robore geritur, venamque expansis ostiorum velis claudit. Ita fit, ut totum huius superioris columnæ pondus nihil quidquam inferiori columnæ obsit, neque eam retroagat: & plerumque brevis mora est, donec muscoli, valvuloso jugo vicini, in mutato femoris situ agentes, columnam superiorem sursum promoveant, sinusque valvulosos evacuent, viamque pro unda inferiori liberam restituant.

Aliquanto vero facilius id officium a valvulis præstatur, quod non unicum earum, ut modo ponebam, par natura fecerit, sed totam columnam sanguinis cruralis per juga valvulosa in multas brevesque cylindros diviserit, quæ in se mutuo non gravitant, & , cum leves sint & exiguæ, facilius ab agentibus musculis sursum aguntur, quam quidem de unica & longissima columna sperari posset.

§. VII. *Varices.*

Et tamen diuturniores causæ, quas natura omnino non supposuit, neque omnibus cavere potuit, sensim faciunt, ut sanguis in sinibus valvulosis longiori mora collectus, venarum alioquin debiles membranas enormiter dilatet, atque noxias, brachii nonnunquam mole *c*, varices efficiat, quas chirurgus extirpandas tradere necesse sit. Eædem demum ruptæ sanguinem fundunt *d*, etiam funesto eventu *e*. Ne tamen adeo facile rumperentur, aliquantum aggeres, sive inferiores cæcique sinuum valvulorum cum vena connexi fines, cavent, quos in ima parte, quam sanguis maxime urget, fortiores eadem natura fecit. Exigua vero varicum aut frequentia est, aut noxa, si cum funesto sanguinis relapsu comparaveris, qui extremas pedum venas, alioquin ad stagnandum pronas, obrueret, cordique necessarium sanguinis stimulum subriperet, in pedes congesti, neque redituri, si valvulas natura non fecisset.

Etsi in hujusmodi teleologiis non soleo facilis esse, non tamen improbabile mihi videtur, ideo frequentes in venarum ad portas euntium infimis ramis varices & stagnationes

*c* Hildan oper. p. 899. Notissima est Marii historia.

*d* Ecce aliqua exempla Petzold obs. 45. hist. med. Vra-

tislav. p. 278. Bausch de hæmatite.

*e* Viti dialoghi d'un bolognese IV. p. 107. Storck hëbammen Unterricht. p. 225.



esse, quod eæ venæ valvulis destituantur. Hæmorrhoides vero ex iis cruoris congestionibus nasci notissimum est g.

Nimis subtile est *Gualtheri Charleton* de valvularum utilitate commentum, sanguinem nempe relabentem in spatio valvularum recepto, resilire, & per angustius duarum valvularum intervallum duplicata, ob eam ipsam angustiam, celeritate versus cor properare h.

§. VIII. *Vincula verum iter sanguinis venosi demonstrant.*

Etiam simplicius erat, & oportuerat notius fuisse, alterum experimentum, quod toties necessario repetitur, quoties medicus venam fecit. Brachium enim, ipsa natura jubente, cor inter & eam venam ligatur, & ab omni ætate ligatum fuit. Nobis, verum edoctis, mirum nunc videtur, ex adeo simplici experimento antiquitatem errore suo non liberatam fuisse. Si enim vere per venas a corde sanguis fluit, oportebat ex ea ligatura omnino sanguinem ab ea vena intercipi, ex qua educere scopus est; & minime obscurum erat, in ea hypothese vinculum in carpo injici oportuisse, ut sanguis inter cor & vinculum congregaretur. Rectius certe, ex theoria, veterinarii medici vincu-

---

g *Stabl de motu sanguin. hæmorrhoidali* p. 9.      h l. c. p. 15. seqq.

rum venæ injiciunt, in parte, quæ cordi propior est *i*. Cum tonfor venam ad carpum ligaret, nullum sanguinem obtinuit *i*\* stulte miratus.

Verum eam theoriam non in solis veterinis natura redarguit, in quibus vena, quæ a vinculo sanguinem revehere prohibetur, ad mortem animalis usque sanguinem fundit *k*. Etiam in homine vinculum inter cor & locum incisionis injectum facit, ut vena repleatur, intumescat, & plurimum sanguinem incisum fundat. Facillimum erat inde deducere, venire adeo a manu sanguinem, non a corde, quem vinculum non intercipiat, sed congreget. Primus tamen a rerum origine *Andreas Cæsalpinus l* vim experimenti perspexit, & tumorem illum venæ observavit, qui inter manum & cor enascitur. Cæterum, cum in parte veri pedem fixerit vir clar., melius ea luce usus est *Guilielmus Harveius m*. Negantem vero ipsum eventum, & adfirmantem, se omnino venam in parte a corde remotiori ligare, *Primirosum n* merito, tanquam testem perpetuo eventui, totique generi humano obloquentem, repudiamus.

#### §. IX. *Objectioni respondetur.*

Non ideo defuerunt objectiones, quibus

*i* La Fosse observations p. 112. *m* l. c. p. 105. 106. c. XI. *n* Animadversiones in Walæi disputationem quam pro sanguinis circulatione Harveianæ proposuit p. 89.  
*i*\* Apud Storch Jahrgäng, IV.  
*k* LaFosse ibid.  
*l* Quæst. Med. 17. L. II.



præjudicatam sententiam scholæ tuerentur. Et primum regestum est, firmiter adstricto brachio omnino sanguinis effluxum adeo non adjuvari, ut vel omnino supprimatur, vel certe malignius prodeat: soluto vero vinculo sanguinis torrens restituitur o, etiam *Spigelii* p experimento consentiente.

Verum etiam hoc effugium *Harveius* occupavit. Ostendit enim, strictius vinculum non venas solas, sed ipsas utique arterias brachii comprimere, atque adeo efficere, per ea quæ non dudum dicta sunt, ut sanguis ad manum, atque brachii partem inferiorem venire nequeat. Hinc pulsus deficit, & venis fons obstruitur, a quo sanguinem habent. Idem tonfori accidit, nuper dicto. Quare soluto tunc vinculo, & sanguine per liberatam arteriam confertim in manum veniente, redditus venis sanguis per vulnus exit. Hæc aut horum similia *Harveius* q respondit, & alii r.

§. X. *Compressio alia idem confirmat.*

Experimento, quod in venæ sectione omni tempore factum est, alterum adfuit, & perinde a vinculo repetitur. Nam primo notissimum est, fortiter adstrictis collaribus, quacunque de causa stringantur, totam faciem intumescere, & ipsam conjunctivam tunicam ru-

o Est objectio *Jacobi Pri-  
mirose* in *Walæum* p. 96.  
p *Anat.* p. 172.  
q l. c. c. XI. p. 108. seqq.

r *J. Walæus* *Epist.* II. p.  
412. 415. edit. 1641. P. *Dio-  
nis cours d'operat*, pag. 463.  
&c.

bere s, & demum sanguinem de naribus stillare z. Iterum nihil hujusmodi expectari poterat, si sanguis per venas a corde adveniret: eum enim id vinculi genus a facie averteret. Nunc, cum vinculum cruorem in capite congreget, necesse est, a capite venire, atque vinculi violentia aversum in capite mansisse.

§. XI. *Ut vincula sanguinem reservent.*

Subtilius aliquanto, cæterum ejusdem generis experimentum antiquitati notissimum fuit. In sputo nempe cruento *Erasistratus* penum aliquam sanguinis, quantum ad vitam sustentandam sufficeret, artubus ligatis reservabat. Negabat utiliter fieri *Asclepiades*, cujus objectionibus *Celsus* v respondet. Neque imperitum *Erasistrati* consilium fuisse, per *Hildani* x observationem constitit. In maxima enim hæmorrhagia narium artubus ligatis sanguis compressus est, idque consilium nuper Ill. Archiatro y placuit. Facile nunc sentiet meditatus, si per venas sanguis a corde veniret, vinculum artubus interjectum id facturum, quod in arteriis facere ostensum est z, ut nempe cor inter & vinculum sanguis vehementius erumperet, & in universum nimiam facilitatem, qua san-

s *Camerar de ophthalm. venerea.*

t *Storch Kinder Krankheiten* T. IV. p. 349. *G. van Swieten* T. III, p. 330.

v L. IV. c. 4.

x *Obs.* 16. Cent. II.

y *G. v. Swieten Comment.* T. I. p. 382.

z L. III. sect. I. n. 4.



guis ex vase rupto neque resistente fluit, novum incrementum nacturam esse, quando in alio trunco sanguis, a vinculo injecto repellitur, uti celerius animalia pereunt, quibus aliqua arteria incisa, altera ligatur *a*. Adeo ergo non prodesset, in hypothefi, *Erasistrati* consilium, ut vehementer noceret, & sanguinis jactura major fieret. Nunc, quando sanguis per venas ab artubus ad cor redit, omnia facilia sunt, & inter se consentiunt. Nam vincula artubus injecta faciunt, ne possit ab artubus, magna nempe corporis parte, sanguis ad cor redire, neque adeo arteriam subire, per quam ruptam effunditur. Nascitur ergo penus aliqua sanguinis, quem arteriæ artuum liberæ advehunt, venæ ligatæ servant; ita neque penitus ex sanguinis jactura animal perit, & tamen, fracto nunc cordis impetu, potest lentior in arteria violata motus, & grumus denique nasci *b*, quo arteriarum vulnera clauduntur, neque eum grumum nimio suo impetu cor debilitatum expellet. Ponimus autem artus ita ligatos esse; ut arterioso sanguini aditus apertus manferit. Nimis enim arcta vincula aut gangrænam facerent, omni a compressis artuum arteriis sanguine averso, aut certe atrophiam,

---

*a* In experimentis *Harveii* p. 113. *Loweri* c. III. *Ferrenii* apud *Salmon* de utero p. 153. 154. 157. 160. 161. 165. 27. Conf. III. *Senac* du cœur T. II. p. 174.

*b* *Second Memoire sur le mouvement du sang.* Exp. 166. 167. 170. 171. 176. 177. 178. 179. 180. 182. 187. 194.

maligna penu admissa, & quæ non suffecerit. Ita enim evenire, etiam a periscelidis nimia adstrictione, exempla existant c.

§. XII. *Vinculum nudatæ venæ injectum.*

Supererant experimenta in nudatis venis facienda, quæ iter sanguinis evidentius docerent. Si enim vena ligata fuerit, observari poterat, qua parte intumesceret, & incisa sanguinem uberius funderet: qua contra inaniretur, & incisa cruorem negaret. Si sanguis in venas a corde venit, intumescet vena, & congesto sanguine replebitur inter cor & vinculum, & contraria fient, inter vinculum, sanguinem intercipient, artumque, si ab artubus & universo corpore ad cor per venas sanguis redit. Tumor enim erit inter artus & vinculum, cum sanguis a minimis venæ ramis veniat, iter vero suum persequi prohibeatur, & ultra linum, cordi proprius, vena, cum nihil nunc accipiat, sanguine per vinculum averso, detumescet & inanietur. Erat experimentum *crucis*, uti *Franciscus Bacon* ea voce usus est.

Fecit *Harveius*, fecerunt eo ævo plurimi anatomici, quorum pericula conjuncta proponam, ut constat in numerosis venis, & omnibus, perinde verum eventum esse, quo circuitus sanguinis nititur. Ergo in vena cava



serpentis *Harveius* vidit *d*, vinculo injecto, aut pressione vinculi æmula adhibita, eam venam versus cordis sedem expallescere, & inaniri, & vinculo, aut pressione, remota iterum sanguine repleri. In eadem vena, supra hepar vinculo adstricta, similis eventus experimentum fecit *Johannes Walæus e*, in vena cava superiori *Johannes Pecquet f* & *Rogerus Drake g*.

Vena jugularis vivi anseris ligata detumescit versus cor, in *Walæi h* experimento, & super vinculum, propius caput, incisa, sanguinem uberrimum, infra vinculum, versus cor dissecta, nullum fundit, tum in dama *i*, tum in aliis animalibus *k*, & in hominibus strangulatis idem fieri, carnificibus innotuit *l*. In vena renali iterum idem eventus est *m*.

In vena portarum *n* vineta, in venis spermaticis *o*, mesentericis *p*, splenicis *q*, gastricis *r*, pancreaticis *s*, brevibus *t*, cæcalibus *v*, hæmorrhoidæis *x*, & intercostalibus *y*, semper

*d* l. c. c. X. p. 94.  
*e* *Epist.* I. 387. Experimenta instituit *fociis Cl. viris* usus, *F. Sylvio de le Boe*, *Rogero Drake* & aliis *Vid. Ep. II. p. 408.*  
*f* l. c. p. 27.  
*g* In *diff. de circulat. natur. n. XI.*  
*h* *Epist.* I. p. 395.  
*i* *Exerc.* p. 249.  
*k* *Walæus Epist.* II. p. 410.  
*l* *Harvei* p. 279.  
*m* *Walæus l. c. p. 394.*

*Vop. Fort. Plemp. fundam. Medic. Ed. II. p. 135.*  
*n* *Walæus l. c. Pecquet p. 30. 33. 34. 35.*  
*o* *Walæus p. 394.*  
*p* *Walæus ibid. Drelincourt canicid. 7. 8. 9.*  
*q* *Walæus l. c. Drelincourt l. c.*  
*r* *Uterque l. c.*  
*s* *Drelincourt l. c.*  
*t* *Ibid.*  
*v* *Ibid.*  
*x* *Ibid.*  
*y* *Walæus l. c.*

eodem modo sanguis inter venarum radículas & vinculum collectus est, & ultra vinculum vena versus cor detumuit.

In venis artuum similium experimentorum numerus maximus est 2, & in ipsis digitorum *a* venis, inque variis demum corporis animalis venosis truncis *b*.

Pariter etiam ego *c*, tardus in credendis, quæ nullo meo experimento confirmarentur, experimenta feci in vena cava infra diaphragma *d*, in vena cava abdominali *e*, mesenterica *f*, jugulari externa *g*, vena cruris anterioris *h*, cruris posterioris *i*, & vena portarum *k*. Quæ *Harveius* viderat, perinde vidi. Moneo tamen, ut anatomicus maturet administrationem, neque expectet, donec animal langueat, ne forte pariter cum robore animalis etiam cordis viribus exhaustis, itinereque sanguinis sufflaminato, nullus in venis tumor adpareat. Præstat etiam calidis animalibus uti, in frigidis *k\** enim reperio, nimis

- 2 *Harvei* p. 250. *Walæus* p. 588. *Raymundo Vieussens* p. 390. *Pecquet* p. 27. *Verheyen* L. II. p. 264. *P. Dionis* Cours d'anatomie p. 447. *J. B. Morgagnus* apud *Pisonum* p. 406.
- a* *Pecquet* p. 30.
- b* *A. Vop. Fortunato Plempio* fundam. Medic. p. 116. & in munit. fundam. Plem. p. 141. *J. Muralto Vademec anatom.* p. 135. 136. *Thoma Bartholino* anat. tert. renov.
- c* *Second Memoire sur le mouvement du sang.* sect. V.
- d* Exp. 108.
- e* Exp. 110.
- f* Exp. 112, 107. *Remus* exp. p. 4. 10.
- g* Exp. 114.
- h* Exp. 105. *Remus* exp. 1.
- i* Exp. 106.
- k* Exp. 108. *Remus* p. 10.
- k\** Conf. exp. 111. *Remus* p. 44.



facile a fede vinculi sanguinem in alia vasa deflectere, ut omnino sub vinculo neque sanguis congregetur, neque tumor conspicuus nascatur.

### §. XIII. *Morbi vincidis similes.*

Quæ vinculum ea morbus facit. A polypo in corde venarum colli mirus tumor ante mortem visus est in B. Söceri mei *H. Friderici Teichmeyer* experimento *l.* Cum in dextra aure polypus caudatus federet, venæ jugulares latissimæ repertæ sunt *m.* Polypus in aure dextra per cavam venam continuatus, hinc in ægro subitus brachii tumor, & in venis veluti varices adparuerunt *n.* Polypi in aure dextra, hinc venæ jugulares sanguine plenæ, & hepat tumidi *o.* In ventriculo cordis dextro antiquæ, & duræ concretiones: hinc vena cava maxima *p.* Cum scirrho hepatis, liene magno, venis amplioribus, polypus in corde dextro, ibi radicans, & in jugulares, aliasque venas extensus *q.* Ab incumbente tumore externo venæ mire intumuerunt *q\**. Cum luxatæ vertebæ earum venam conprimerent, venæ

*l* In disp. de cord. polyp. n. 19.

*m* Malpigh. posthum. p. 45.

*n* Bernhard Albin de polyp. p. 7.

*o* G. Aug. Langguth in anatomico infantis rachitici.

*p* Sentac T. II. p. 412.

*q* Philos. Transact. n. 157.

*q\** Tropanegger de sang. reatu n. 27.

venæ artuum inferiorum turgidissimæ fuerunt Morgagni *q*<sup>\*\*</sup>.

#### §. XIV. *Obiectio solvitur.*

Etiam hoc adeo evidens experimentum obpugnaverunt; quorum oculi nascens lumen *Harveianum* non sine dolore ferebant. Et primo contra eventus, quos narravimus, obiectum est; in ligata vena, tamen supra sedem vinculi, versus cor, & esse sanguinem, & de incisa vena effundi *r*. Hoc experimentum jam *Asclepiadi* innotuit *r*<sup>\*</sup>. Eo processit *Jacobus Primirose*, ut plus omnino sanguinis in ea parte venæ reperiri scriberet, quæ cordi vicinior est *s*: negaret idem venam, quæ cordi propior est, concidere, si presseris *t*.

Neque certe dissimulasse oportet, utique sæpe experimenta hanc objectionem confirmare, in jugulari *v*, & in mesenterica *x*, & in cavâ abdominali *y* vena: in quibus ipse vidi, injecto vinculo, tamen in parte venæ, quæ cordi propior est, sanguinis abunde superesse: neque dubito, etiam in crurali vena sub sa-

*q*<sup>\*\*</sup> Morg. Sed. & caus. morb. II. p. 356.

*r* Jac. Primirose in animadvers. in L. II. de motu cordis p. 87. & in destructione fundam. Plempii p. 91. Job. Riolanus in prætermiſſis Parisiis ann. 1652. 12. editis p. 176. Homobonus Pisoni in ult.

antiquit. & in Mangeti bibl. anat. p. 953.

*r*<sup>\*</sup> Scribon. l. c. 21.

*s* In animadvers. l. c.

*t* In destruct. fundam. p. 105.

*v* Second. Memoire sur le mouvement du sang. Exp. 113.

*x* Ibid. Exp. 107.

*y* Exp. 109.



phenæ ortu ligata , aut in brachii venis idem phenomenon appariturum , ubicunque vinculum injeceris. In his enim venis omnibus , supra vinculum , nempe cordi propius , magni rami in truncum , quem vinxisti , se inmittunt , ut in primo exemplo ipse a subclavia & a vena cava sanguis facillime retrogrediens , in altero rami intestinales alii , aut splenicus truncus , in tertio rami renales , & conjunctus sanguis venæ sine pari , lumbalium venarum & spermaticarum , in femore saphena vena , cum omnibus femoris venis varie connexa. Quare nihil inexpectati fuerit , si supra vinculum truncus venosus sanguinem habuerit , quem tot rivi libere advehant.

#### §. XV. *Et alia.*

Eodem fere modo solvitur alia objectio , inter duo nempe vincula venam tamen & sanguinem continere , & percussam fundere *z*. Hæc enim objectio a primis adversariis circuitus sanguinis proposita , nihil quidem pro veterum hypothese facit , cæterum pertinet ad venosos ramos , qui inter duo vincula in truncum re-vinctum sanguinem adferunt *a*. Ob eandem causam oculi non tument , quando vena jugularis ligata est *b*. Nimis enim multæ ve-

---

*z* *Primirose destruct. fun-* *tiquit. p. 78.*  
*dam. Plempii p. 97. nisi vin-* *a Walæus l. c, p. 411. 412.*  
*culum ad cor nimis arctum* *b Nuck defens. duct. aquos.*  
*fuerit. Homobon. Pisoni ult. an-* *p. 14.*

næ liberæ superfunct, per quas sanguis ex capite redeat.

§. XVI. *Chirurgia infusoria ostendit iter sanguinis venosi.*

Aliud, & minime infirmum, experimentum, quo sanguis venosus ad cor refluere ostenditur, potest a *chirurgia infusoria* sumi. Acidi enim ex metallis stillantes liquores utique, quoties in venas injecti fuerunt, sanguinem in pulmones usque & cor dextrum coegerunt, manifesto argumento, ad eas vias, neque ad minimos ramos, venena ista chemica tetendisse. Verum non placet hæc experimenta divellere, quæ multo majorem vim habent, neque solum sanguinis venosi viam ad cor ducentem, sed præterea humoris venosi iter per cor, & arterias, ad omnes corporis humani partes, continuatum demonstrant.

§. XVII. *Et ipse confirmat oculus.*

Quare unice aliud testimonium citabo, omnium quæ peti possunt, manifestissimum *Harveii* ævo nondum notum, cum microscopia quidem in Italia cognita, nondum tamen satis familiari usu a physiologicis scriptoribus adhibita essent. Ergo animal quodcunque, cujus sanguis per vasa fluens pellucidis velamentis tegitur, microscopio subicitur; adhibentur autem frigida fere animalia, ranæ, lacertæ, pisces, ne frigus aëris admissi humorem vitalem cogat, uti quidem in animalibus calidi sangui-



nis cogit *c*. Consideretur nunc adtentis oculis, & diu hæc consideratio continuetur, ut certo distinguas, quæ vasa in animale sint, & quæ via sanguis per ea vasa feratur. Adparebit duorum vasorum genera esse *d*, & in priori, quod arteriarum nomine descripsimus, crassiores eundem membranas esse, & tamen sanguinem, rapido torrente, a corde ad minimos eorum vasorum ramos ferri *e*. Contra alterius generis tubos, fodales priorum, cæterum latiores, saturati ruboris, teneræque membranæ canales esse, in quibus sanguis omnino contrario ductu a minimis ramis in truncos, ex truncis in cor fluat *f*. Id experimentum primus *Marcellus Malpighius* instituit *g*, deinde *Antonius v. Leeuwenhoeck* *h*, & nunc vulgo faciunt. Numerosissima etiam ego pericula feci, & primo oculi ictu, in pisciculis inprimis, utrumque vasorum genus ex sanguinis itinere discerno.

#### §. XVIII. Retrocessio sanguinis venosi.

Verum neque in hac luce dissimulandum est, calumniæ locum superesse. Frequenter enim omnino sanguinem in his animalibus videas, per eas ipsas venulas a cordis vicinia

*c* Second Memoire sur le mouvement du sang. Exp. 10. *f* Sect. VI. du Second Memoire.

*d* Ibid Exp. 59. 60. 61. *g* In posthum. p. 91.

62. 63. 64. 65. &c.

*h* Passim, & in exper. &

*e* Sect. I. p. 382. & Exp. contemplat. Epist. 112. &c. quæ citavimus.

ad extremos fines, aque truncis in ramos relabi *i*. Deinde, uti in arteriis, ita in venis, perinde crebræ oscillationes adparent, ut sanguis hoc quidem temporis momento legitimo itinere per venulas ad cor redeat, proximo vero tempusculo utique versus minores ramos a corde relabatur, & alternus adeo & sibi contrarius ductus sit, quo sanguis venosus movetur *k*.

Cura tamen adhibita, ne hoc quidem phænomenon perspectæ veritati nocebit. Quamdiu enim animal viget & valet, verum iter venosi sanguinis perpetuo idem est, & versus cor immutatum tendit. Quando vero vena inciditur *l*, & facilitas major fluxuro sanguini in ea sede nata est, aut coagulum *m* aliquod aut obstaculum *n* sanguinem repellit, aut pondus *o* debilem sanguinis motum mutat, aut alioquin moribundi animalis vires fractæ sunt, toties utique in istis, valvulas alioquin non nactis animalibus, sanguis ad extremas venas relabatur. Verum tamen etiam istis in animalibus viribus restitutis, clauso vulnere, coagulo superato, omnino sanguinis iter nativum restitui-

*i* Premier Memoire p. 93. 167. 169. 170. 171. 174. 177. Exp. 117. 137.

*k* Ibid. p. 88. & Exp. 117. 178. 179. 184. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 224. &c. 123. 124. 129. 132. 134. 137. *m* Premier Memoir. p. 93. 142. 143. 145. 224. 225. 226. Second Memoir. Exp. 128. 230. 234. Leeuwenhoeck Con- Leeuwenhoeck exper. & con- tin. arcan. natur. p. 116. templ. p. 208.


*l* Premier Memoir. p. 93. *n* Exp. 135. 145. Second Memoir. Exp. 137. *o* Conf. Exp. 205. 207. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 209. 213. 219. 223. 156. 158. 159. 162. 164. 166.



tur *p.* Num in vena portarum sanguis relabatur, & inde hæmorrhoides, aut a sanguine in ventriculū reflūente funesti cruoris vomitus succedant, nunc quidem nondum inquiremus; verum etiam hoc loco a naturali statu omnia in diversum iverunt *q.*

### SECTIO III.

§. I. *Sanguis a corde per arterias in venas transit, per venas cordi redditur.*

UE sit in utraque classe vasorum directio sanguinis, confirmavimus, quantum sufficere visum est. Adparet, per arterias sanguinem ex corde ad minimos earum ramulos ferri: adparet ex minimis venarum radiculis sanguinem ad cor revehi. Parum nunc superest, quod ad circuitum vitalis humoris demonstrandum postulari possit. Nam arterias ultimas cum venulis continuari etiam ostendimus *r.* Si ergo sanguis ex corde per arterias in earum minimos ramulos fertur, si hi ramuli in minimas venarum radiculas continuantur, si venæ sanguinem ad cor revehunt, videtur iter totum sanguinis a corde per arterias & venas ad cor ostensum

*p* Prem. Mem. p. 93. Exp. & alibi.  
 123. 129. 66. 93. 95. Mal- *q* Stahl de hæmorrhoid. in-  
 pighi l. c. Leeuwenboeck l. c. ternar. motu.

esse. Et tamen, cum res maximi momenti sit, omnino reliqua argumenta producere oportet, quibus hæc theoriæ medicæ basis stabilitur.

Ergo brevis meditatio videtur ad verum ducere. Si sanguis per arterias celeriter ad ultimos earum fines fertur, oportet in alia vasa eum exire: nisi exit, stagnabit, colligetur, vasa sua distendet & rumpet. Verum non transit in vascula lymphatica, exhalantia, ductusve excretorios, eorum enim vasculorum humores *s* a sanguine differunt, superest, ut in venas transeat.

Iterum venæ sanguinem ad cor revehunt, sequitur ut aliunde habeant. Verum a lymphaticis vasis, aut ab inhalantibus non habent, eorum enim liquor non est sanguis *t*: superest ut habeant ab arteriis, quæ & sanguinem vehunt, & cum venis continuantur.

Denuo, si liquor secundum directionem sanguinis in arterias pulsus, in venas transit *v*, sanguinem etiam a corde secundum eandem directionem, per arterias motum, in venas transire necesse est. Vasa eadem sunt, directio eadem, neque color hic, aut diversa liquoris indoles, ad iter mutandum quidquam valet.

*r* L. II. sect. I. p. 189. seqq.

*t* L. II. sect. II. p. 310.

*s* L. II. sect. I. p. 210. &c. seqq.

*v* L. II. sect. I. p. 176.



§. II. *Quoties Arteria vinc̃ta est, Vena nihil accipit.*

Sed alia argumenta data sunt. Breviter tangimus experimentum, quo ostenditur, arteria vinculo intercepta, venam socalem, quæ ejusdem artus sanguinem revehit, omnino inaniri & pallefcere: eandem vero venam, si arteriæ vinculum solveris, iterum cruore repleri, eumque per vulnus suum dimittere, omnino uti diximus, in sanguinis missione medica, sanguinem ex vena nullum venire, quoties vinculo arctiori brachium adstrictum est: laxato eodem sanguinem per vulnus ejusdem venæ obsequi v\*. In mesentericis, lienalibus, hepaticis x, cruralibus y experimentum factum est.

Denuo eodem vere modo, visus est sanguis, pressa arteria iliaca, in venam iliacam inanem urgeri, ut vena, quæ inanis fuerat, dum medicus arteriam sociam premebat, nunc sanguine turgeret z. Hæc enim omnia ostendunt, ex arteria in venam sanguinem continuo succedere, nihilque venam habere, nisi quod ab arteria accipit.

Eo minus huic experimento immoror, quod eventus penitus contrarios alii novi equidem inventi adversarii protulerunt, *Riolanus* a pri-

v\* p. 394.

x *Drelincourt canicid.* 9.y *Munit. fund. Plemp.* p. 144.z *Walæus l. c.* p. 414. Números prætermis̃sos adjeci.a *Notat. in A. exerc. Harveyi, de motu cord.* p. 111.

mo, deinde *Homobonus Pisoni b*, arteriam supra os pubis ligatam fuisse, & tamen ex vena saphena incisa, sanguinem profluxisse dixit, & perinde profluere, si arteria ob aneurysma resecta fuerit.

Si omnino in hoc eventu veri quid subest, ut quidem lubenter dubitarem, vel omnino is solus sanguis effluxit, qui in trunco saphenæ ejusque venæ radicibus præsto erat, & quem dudum arteria eo miserat, priusquam vinciretur. Vel arteriæ ligatæ aut resectæ truncus infra sedem, qua vinculum injectum aut arteria resecta fuit, per anastomoses sanguinem ab iis truncis accepit, qui supra vinculum nascuntur. In exemplo, sanguis in arterias femoris venisse potuit per arteriam hypogastricam, ejusque ramos obturatorios *c*, ischiadicos *d*, hæmorrhoidæos *e*, & iliacos posteriores *f*, qui cum profunda femoris *g* & circumflexa interna *h* & externa *i* varie conjunguntur, ut minores aliquas communicationes interim omittam.

§. III. *Nisi rediret sanguis cordi nullus superpeteret.*

Quare alia experimenta proferemus, a co-

- |   |   |
|---|---|
| <i>b</i> <i>Disquisit.</i> l. c. p. 406.      | <i>corp. tot. e</i> &c.                       |
| <i>c</i> <i>Fascic. icon. anat.</i> V. T.     | <i>g</i> <i>Fascic.</i> V. T. III. 2. T.      |
| II. delta, psi, omega, theta.                 | II. epsilon. <i>Tab. corp. tot.</i>           |
| <i>d</i> <i>Fascic.</i> V. p. 13. <i>Tab.</i> | epsilon, sigma.                               |
| <i>corp. tot. post. p. q. r.</i> &c.          | <i>h</i> <i>Ibid.</i> T. 3. <i>k. d. Tab.</i> |
| <i>e</i> <i>Ibid.</i> p. 14. T. 3. <i>d.</i>  | <i>corp. tot. r. r. y. y.</i>                 |
| <i>f</i> <i>Fascic.</i> V. p. 15. <i>Tab.</i> | <i>i</i> <i>Ibid.</i> p. 15.                  |



pia sanguinis repetita, quem aorta accipit. Et primo sanguis per arterias celeriter movetur, & ejus unda adeo magna est, ut omnino intra paucissima horæ minuta vulnerato homini moriendum esset, nisi in locum sanguinis per arterias emissi, alius per venas ad cor rediret *k*.

Accuratius experimento utemur. Cordis humani ventriculus sinister continet duas fere uncias *l* sanguinis, aut aliquanto plus minusve. Idem ventriculus ab expulsis iis duabus unciiis evacuatur & inanis fit, aut certe exiguum est, quod in aliquo cordis recessu reliquum hæret. Nam neque cor quiesceret, si a multo sanguine lacefferetur, neque in animalibus pellucidi cordis, inque pullo, qui ovo incubato continetur, aliquid superesse potest, cum post pulsum perfecte expallescat. Et si singulo pulsu aliquid retineri poneret, nihil inde contra nos sequeretur. Vel enim id, quod superstes esse ais, in proximo pulsu exiret, ut tantumdem reliqui fieret in secundo pulsu, quantum in primo pulsu cordi hæsit, & tantum de antiquo sanguine semper de corde expellatur, quantum de novo retentum est. Sed tunc eædem duæ unciaë in quolibet pulsu de corde exhibunt. Vel pone in quolibet pulsu aliquid in corde manere, quod etiam proximo pulsu non expellatur, tunc utique undæ sanguinis arteriosi ea quantitate diminuentur. Sed pone esse drachmam;

---

*k* Valde hoc argumentum  
urfit *Harveius* c. 9. tot.

*l* *Prim. lin. physiol.* n. 108,  
115. &c.

si in singulo pulso drachma in corde manet, manebunt in mille pulsibus drachmæ mille, quantum ullo corde contineri posse ridiculum est. Sit copia sanguinis de corde primo pulsu expulsa  $a$ , sit id, quod de ea unda in corde residet  $x$ , sit  $a \text{ † } x$  capacitas ventriculi, dico omnes undas sanguinis fore  $\equiv a \text{ † } x$  sive pares contento ventriculi. Pone non esse, remanere in corde eo primo pulsu  $x$ , nec in proximo exire, manebunt secundo pulsu in corde  $2x$ , tertio  $3x$ , & millesimo  $1000x$ . Hæc adeo fuscè repetii, quia alius quidem vir Clar. *m* ventriculum dextrum negavit evacuari, & dimidiam portionem sanguinis ejicere docuit, si cum sinistro compares; & alius *n* multo illustrior, nuper cor non depleri, & ad unciam in singulo pulsu in corde manere, neque adeo recte ultra unciam pro portione sanguinis sumi, quam singulis undis cor expellat, festinus omnino scripsit, in quam quidem quantitatem nunc non inquirō, & unice ostendo, quamcunque posueris, tamen undam sanguinis non minui, & *Harveianum* ratiocinium firmum manere. Neque enim hæc unda sanguinis semuncis est, uti pro sua modestia *Harveius* posuit  $o$ , neque dimidiæ drachmæ, ut timidior contra sua experimenta *Walæus p*, ipse fassus, ventriculo canis semuncem contine-

---

*m* G. Wolfg. Wedel phy- 348.  
*fiolog. reform.* p. 107. *o* l. c. p. 81.  
*n* *Traité du cœur* T. I. p. *p* *Epist.* I. p. 93.



ri *q*, & testes habiturus *r*, si tres drachmas sanguinis ex ejus animalis corde uno pulsu expelli scripsisset. Longe minus guttula unica de corde ejicitur, uti ex suæ hypotheseos vi coactus posuit *Jacobus Primirose s*, exque alia hypothesi, quæ ignem in corde & rarefactionem sanguinis admiserat, *Cartesius t* cum schola sua posuit.

Rectius *Harveius v*, duas uncias poni posse, recte *Lowerus x*, etiam plus duabus unciis in suo experimento in cordis ventriculo fuisse. Propius vero *Helvetius y*, quindecim drachmas cum dimidia, & octodecim drachmas *Henricus Albertus Nicolai z* cordis ventriculo contineri docuerunt. Neque valde nimii fuerit *J. Alphonsi Borelli a* calculi, qui tribus omnino unciis ex computato pondere sanguinis majori cordis ventriculi capacitatem dimetitus est. Sex enim uncias in canis corde idoneus testis reperit *b*.

Sint ergo duæ unciae, quæ uno pulsu in aortam exeunt: sint pulsus in minuto primo 80, quot certe mihi sunt, mediocriter valenti: efficientur 9600 unciae, quas cor singulis horis

*q* G. Charleton de motu sanguinis p. 91.

*r* Idem ibid.

*s* Animadv. in Walæum p. 85.

*t* De homine p. 5. edit. Schuyl. Regius in diff. de circulat. sang. p. 3.

*v* l. c.

*x* C. III. p. 112.

*y* Apud H. A. Nicolai de

direct. vasor. p. 51. & in Memoir. de l'Acad. des scienc. 1718.

*z* Idem ibid.

*a* Propos. 68. absque certo experimento. Consentit *J. Tabor Exerc.* p. 103. ex calculis geometricis.

*b* Philos. Transact. n. 191. Sed confer fufius L. IV. de corde.

in aortam pellit, & quæ per arteriosum systema diduntur, & intra diem naturalem erunt 14400. libræ sanguinis, quas cor sinistrum ejicit.

Pone nunc cibi & potus sumi uncias 128 in 24 horis, pauci enim mortales *Sanctorii* appetitum adtigerunt: earum unciarum magna pars per excrementa varia, perque insensilem transpirationem abit. Pone nihil decedere, totum cibum, & universam aquam in sanguinem ire, adparet tamen nullam omnino portionem cibi ad sanguinem esse, & sexcentis demum diebus tantum chyli, aut sanguinis nasci, quantum pro unico die requiritur: ut cordi ea copia suppeditetur, quam in sano homine emittit.

Supereſt, ut is sanguis, quem aorta a corde habuit, ad cor revertatur: nihil autem nisi per venas ad cor venire potest, nullus enim alterius naturæ canalis se in cor inmittit. Necesse adeo est, eam sanguinis copiam, quæ ex corde exit, & arteriis recipitur, in venas transire, ut per eas cordi reddi, ejusque castellum alere possit. Hoc argumentum uti simplex est, & artificio caret, solum tamen debuit homini verum unice amanti satisfecisse.

§. IV, *Vulnera non possent tantum dare sanguinis, nisi circuiret.*

Alio modo copia sanguinis, quam aorta effundit, ad evincendum sanguinis circulum ducit, adeo certe evidente ratiocinio, ut ne an-



tiquitas quidem vim hujus argumenti *c* penitus præterviderit. Nempe sanguis ex incisa arteria, majori imprimis, de toto corpore, & de omnibus venis effluit, ut carnes animalis pallescant, & totæ albæ fiant, maxime, quando Judæi *d* carotidem bestię absciderunt. Nunc ex hypothese veterum debuerat effluxisse is sanguis, quem his paucis minutis horæ cor in arteriam incisam miserat, aut ab hepate, ex chylolo paratum acceperat. Celerrime enim sanguinis tantum effluit, ut minima copia *e*, neque ad vitam alendam sufficiens supersit *f*, intra tria *g* quatuor *h* quinque *i* horæ minuta. Eo brevi tempore, neque ex arteriæ incisæ trunco potuit ea copia sanguinis venisse, quæ in bove aut equo ad quadraginta libras effluit: neque ab hepate suppeditari. Manifesto ergo ex venis totius corporis cruorem in arteriam

*c* Experimentum exstat apud *Galenum an sang. nat. in arter. contineat. c. 4. & de utilit. pulsus c. 5.*

*d* Judæi exquisite acuto cultro juguli arterias resecant, ne sanguinem cum carne edant, contra legem Noachicam & Mosaicam latam *Genes. c. IX. v. 4. Levitic. c. XVII. n. 13. 14.*

*e* Effluxerunt in equo sanguinis libræ 44. manserunt in venis libræ fere sex *Hales hæmastat. p. 7. 8. Canis exsanguis fuit emissis libris quatuor B. de Moor de instant. med. p. 50. Post vulnus fu-*

*nestum mesenterii nullus in reliquo corpore sanguis Boerb. Prax. I. 373.*

*f* Nam perit animal, quando major pars sanguinis effluxit, & in equis saltus ex carotide ad duos pedes rediit *Hales p. 16.*

*g* *Lower de corde c. 3. p. 174. 175. cum arteria cervicalis læsa fuisset.*

*h* Intra sedecimam partem horæ canis periit apud *Bartholomæum de Moor l. c.*

*i* *Lower l. c. p. 174. ed. Belg. & p. 115. ed. Anglic. etiam ex cervicali arteria.*

confluxisse dicendum est, ut & copia ostendit, & venarum inanitio. Neque *Galenus* id ignoravit. Plus semel enim mutuū arterias inter & venas commercium eo experimento demonstravit, quo constat vel arteria magna vel vena magna incisa sanguinem universi corporis ex eo vulnere effluere: demum ex venis in arterias aliquid, eas ut alat, sanguinis transire *i*\*. Poterat dici, & veteres dixerunt *k*, & nuperi circuitus sanguinis adversarii *l*; hunc sanguinem ex venis cum incisa arteria unitis in eam arteriam refluxisse. Verum ea explicatio non respondet phænomeno: tunc enim ex arteriæ incisæ eo fine, qui minimis ramis & venulis in ramos insertis continuatur, sanguis ille veniret. Verum in phænomeno pars arteriæ a corde remotior, & non multum sanguinem fundit *m*, & non diu *n*, & absque impetu, ut ne quidem eum finem ligasse necesse sit, quoties arteria resecta fuit. Qui vero cruor celerrimis undis ad torrentis morem se per vulnus præcipitat, is a corde venit: sequitur ut etiam sanguis venarum universi habitus corporis in cor refluxerit.

§. V. *Minime vero vulnera vasorum minorum.*

Aliquanto plus curiositatis hoc experimen-

*l*\* *Facult. natur. L. III.* ne ex venis in arterias elap-  
*k* *Erasistratei apud Galenum* so phlegmonen nasci docet.  
*an sang. in art. cerviculi con-* *l* *Homobonus Pisoni.*  
*tin. c. 5. & Galenus de usu* *m* *Nullum Second Memoire*  
*part. L. VI. c. 17. Nempe ex* *sur le mouvement du cœur*  
*aëre spiritum vitalem in ve-* *Exp. 156. 180. 183.*  
*nas dari, & contra a sangui-* *n* *Exp. 173. 175. 187.*



tum habebit, si ostenderimus, ex minimis etiam arteriarum furculis, a quibus minime tantam cruoris jacturam expectes, tamen pariter ad mortem usque sanguinem effundi. Ergo arteriolæ dentium utique ex minimis sunt, quas primus cum suis trunculis descripserim *o*, & primum pariter se descripsisse *Bertinus* persuasus fuerit *p*. Ex iis tamen adeo exiguis, inque adulto homine penè inconspicuis arteriolaris, sanguis, ad mortem usque *q*, evulso potissimum molari dente, effluxit, & paulum a morte abfuerunt *r* alii ex eadem arteriola læsa ægri, quos inter celebris fuit *Achilles Gasserus* *s*, eruditus medicus, & *Gesneri* olim amicus; huic enim tantum de dente evulso sanguinis periit, ut nunquam nativus color genis redierit, perinde uti *Paulinæ Senecæ* uxori, post incis-

eifas

*o* In *hist. art. maxillaris* p. 132. (omnibus auxiliis quæ exstat in *Fascic. II.* & *VIII.* anno 1743. & 1752. editis.)

*p* *Nouvelle osteologie* T. I.

*q* *Stalpart van der Wiel*

*obs.* 18. Cent. I. *Commerc.*

*Lit. Noric.* 1732. p. 294. *Do-*

*minicus Anel* apud *Fauchart*

*chirurg.* *dentiste* p. 266. *Joh.*

*de Dieft* in *diff.* in hæc ver-

ba *Ergo hæmorrhagia ex den-*

*tium evulsione ex culpa chi-*

*rurgi lethalis* *Parisiis* ann.

1734. *proposita.* *Joh. Bohn* de

*remunc. vulner.* p. 24. *Fau-*

*dacq reflexions sur les playes*

*p.* 132. (omnibus auxiliis frustra adhibitis.)

*r* *Helwig obs.* 27. Septem

horarum hæmorrhagia ægre

coercita *Car. Guillemeau osteo-*

*log.* p. 190. *Tulpius obs.* 49.

*L. I. Guisard tr. des playes*

*T. I.* p. 164. *Ronseus epist.*

*med.* 2. *Hoechstetter decad.*

*VIII. cas. I. Zacutus Lusita-*

*nus prax. medic. mirab. obs.*

90. *Guil. de la Motte obs.*

210. (decem libris amissis).

*Fauchard T. I.* p. 263. *Bres-*

*lauier Sammlung.* 1721. *M.*

*Jun. & in miscellan. A. E.*

*Buchner p.* 1139.

*s* *Rumler observ.* 72.

cifas venas perpetuus pallor in genis superfuit: & similia maximæ de dentibus hæmorrhagiæ exempla apud plurimos, eosque etiam gravissimos auctores reperias. Sed ex naribus ne quidem conspicuo poro arteria aperitur, & cruor absque vulnere exsudat. Et tamen notissimum est, septem *t*, & undecim *v*, & quindecim *x*, & sedecim *y*, & triginta *z*, & quadraginta sanguinis libras *a* ea via effluxisse *b*, & ipsam demum mortem huic jacturæ supervenisse *c*. Et ego ipse hæcenus felicior maximam de nare hæmorrhagiam in gravida femina febre miliari laborante vidi, & ipse in morbo acuto erysipelacei generis, cruorem ad multas libras salubriter per eandem viam amisi.

Verum etiam ex aliis minimis vasculis, ut in ala nasi *d*, glandula lacrumali *e*, gingivis *f*, ex linguæ latere *g*, ex ampulla in manu nata *h*, ex vulnuscule hirudinis *i*, partim funesto even-

*t* Nicol. Fontanus curat. & respons. p. 171.

*v* Lanciscus de subitan. mor. tib. L. II. ad finem.

*x* Christinus apud Schurig hæmatol. p. 285.

*y* Buchner Miscell. Med. 1728. p. 932.

*z* Baronius de pleuropneumon. p. 293.

*a* Journal des sçavans T. XI.

*b* Alia gravissimarum hæmorrhagiarum exempla sunt apud Job. v. Mekreni aanmerking c. 4.

*c* Guil. Fabricius Hildanus obs. 77. Cent. VI. Christ. Ehrenfrid. Hagedorn Cent. I.

Tom. I.

hist. 60. Bresläuer Samlungens 1724. p. 581. Bausch de hæmatit. prodrom.

*d* Phil. Salmuth. obs. 20. Cent. II.

*e* Funesta Phil. Transf. n. 208.

*f* Journ. des sçavans T. 14. Marc. Donat. p. 350. ad octo libras. Camer. memor. L. 20. obs. 77.

*g* In celebri Usserio annuæ insignes hæmorrhagiæ; Arnold de Boot.

*h* Copiosus inde sanguis Bresl. Saml. 1720. p. 322.

*i* Schurig sialograph p. 226. funesto eventu.

D d



tu, partim alioquin uberrimæ sanguinis eruptiones visæ sunt *k*.

In his exiguorum vasculorum maximis hæmorrhagiis manifestior recurrit observatio, non potuisse ex vicinis venis eam enormem sanguinis copiam in læsam arteriolam venisse.

### §. VI. *Et venarum.*

Denique per venas rarius quidem ad mortem usque sanguis effluit. Earum etiam majorum vulnera satis facile sponte collabuntur, & sanguinem fundere desinunt *l*. Igitur Romani, sub pestilentibus illis primi seculi Cæsaribus mori iussi, inmissis etiam medicis, qui venas inciderent, & letho damnatos continuo curarent, non absque arte aliqua mortem impetrabant. Ergo in balneum descendebant, ut venæ cuti subjectæ laxarentur, atque eodem tempore utriusque brachii venas aperiebant. Ita *Seneca* in balneo exspiravit, ita *Petronius Arbiter*. Aliqua tamen exempla sanguinis etiam de venis ad mortem usque manantis reperi. Ex vulnere venæ angularis, ad oculi interiora transeuntis, funesta sanguinis jactura visa est *m*. Ex venarum raninarum vulnere sanguinis 24. libræ fluxerunt *n*, & omnino mors ipsa

*k* Multas collegit *Bausch* 14.

*l*. c. & *Keil de quantit. sang.* *n* *Buchner Miscellan.* 1730.

*l* Conf. *Second Memoire sur le mouvement du sang* Sect. VII. fere tot. *p.* 1062. Magna inde hæmorrhagia *J. Antonides van der Linden* diff. XV. de circul.

*n* *Hildan Centur.* I. obs. sang. n. 519.

secuta est *o*. Ex saphæna, ex poplitea vena rupta mortes pene subitæ. Ex venis cubiti incisis sanguis fere omnis exhauritur *p*. Ex jugulari vena incisa sanguinis libræ viginti *q*, & ex ea sponte rupta mors secuta *r*. Imo æque celeriter fere animalia ex venis incisis, quam ex arteriis apertis, exsanguia fieri *Lowerus* auctor est *s*.

Hæc posteriora experimenta ostendunt, posse eum sanguinem per venas effluere, qui in arteriis fuit, atque adeo ex arteriis in venas apertum in vivo animale iter esse. Victus veri *Galenus t*, omnino hunc sanguinis com meatum adgnovit, per minimos vero ramos venarum & arteriarum eum deduxit. *Vesalius v* mutuum influxum & refluxum sanguinis arteriosi & venosi, ex perspecta præterea arteriarum magnitudine, ante tempora *Harveiana* suspicatus est. Verum sanguinis ex radiculis in truncos refluents communicatio, per minima vasa, non respondet celeritati, qua cruor effunditur, & ex venis in arteriam redituro obstat demonstrata sanguinis a corde venientis directio.

*o* Jul. Ofrai in *penelope* T. II. p. 219.

*p* *Harvei* c. 12. p. 115.

*q* *Gatinara operum* p. 15. edit. Basil.

*r* *Kanold Bresl. Samlungen* 1726. p. 254.

*s* l. c. p. 177. ed. Belg.

Collectionem hæmorrhagiarum venosarum habet J. Bohn de *lethalit. vuln.* p. 26. seqq.

*t* *De facult. natur.* L. III.

c. 15.

*v* *De fabr. corp. hum.* p. 747.



§. VII. *Sanguinem ab una vena in omnes arterias & venas didi, ostendunt venena in venam data.*

His fere experimentis novum inventum *Harveius* stabilivit. Alia supererant, quæ *Cl. viro* ignorata proxima demum ætas detexit. Eorum prima dicemus, quæ ab infusoria chirurgia repetuntur. Nempe in vivi animalis incisam venam succi medicati aut venena inmittuntur. Si vera esset *Galenica* illa theoria, æquum est exspectare, ut vis eorum pharmacorum cum sanguine ad extremos ramos ejus venæ deferatur, quæ medicamen recepit, atque adeo ejus efficacia in eo artu adpareat, quem vena veneno infecta adit. Verum longe alia eventus docet. Vis enim eorum medicamentorum in capite, in visceribus, in toto corpore animalis efficax se effert, quo nullo modo in veteri theoria sanguis ejus venæ venit: manifesto denuo argumento, sanguinem, cum quo medicamentum commiscuimus, & ipsum ex ea vena ad totum reliquum animalis corpus venisse; & quidem omnium primum ad cordis dextras caveas. Nam in dextra auricula, & in dextro ventriculo, nonnullorum venenorum facile adgnoscentia potestas continuo se oculis offert.

Ad hanc ergo classẽ pertinent arma venenata, aut olim *Aristoteli* dictæ v\* sagittæ tho-

ræ x succo vel albi hellebori intinctæ, quæ, si in sanguinem venenum pervenerit, subito quidem animal necant, & præterea totius animalis carnes molles & teneriores reddunt z. Huc etiam flatiles sagittas Macassarum, & aliorum Indorum refero, quæ ex arboris non satis hactenus, etiam post *Rumpfii* a opus, cognita, lactescentis, succo adeo vehemens venenum concipiunt, ut, de tubo efflata b, minutissimo quoque vulnuscule necent, si vel minima particula sanguinem infecerit. Alia similia venena Americani indigenæ temperare norunt, effectum perinde pestilenti, si vel levissime vulnus cruentatum fuerit. In America intra sex horæ minuta c, & intra unicum d demum in India e, animal ejusmodi sagittis læsum interit.

Analogus effectus venenorum est, quæ cuti cruentatæ adplicata occidunt, quo venena

x *Lobel advers.* p. 263. De noxia herba, quam non nominat, & qua Dalmatii spiculatorum cuspidem venenent, similia habet *Galenus de theriaca ad Pison.* c. 10.

z *Crato Epist. med.* T. II. p. 226. *Matthiolus ad Dioscoridem* p. 1226. in *Epist.* p. 219.

a In *Thesaur. Amboinenf.*

b *Arcæus de curat. vuln.* L. I. p. 70. de Veratro locutus.

c *Voyage des Hollandois aux Indes Orientales* T. I. p. 33.

418. *Voyage de Rechteren* p.

164. *Tachard voyage de Siam*

T. III. p. 166. *Tavernier itin.*

T. III. p. 518. *Birch histor.*

of the Royal Societ. T. II.

p. 43. De Americanis sagittis

*Herbert de Cassava amara* 483.

d De la *Condamine relat.*

d'un voyage dans l'Amerique

meridionale p. 68. 208. 209.

e Nam in Europa languidiora tela venenata post integras 24. horas demum canem enecuerunt apud *Kundmannum* in *singular. natur. & artus* p. 602. Salivationem & vomitum hoc venenum move-

rat.



mineralia fere spectant. Cobaldum ab ignara muliere ad achores ficcandos capiti pueri inspersum, miserum Göttingæ occidit. Sic arsenicum, cum caput ejus decoctione ablueretur, *e\** ita mercurius sublimatus *e\*\**, ulceribus inspersus, & crocus metallorum *e\*\*\**: Huc etiam lues pertinet, quæ per venenatam lanceolam a scarificatore late per Moraviam *e\*\*\*\** sparsa est, cum ea lanceola virus venereum contraxisset. Olim etiam nicotiana in vulnus pulli & serpentis data, bestias enecavit, & vomitum civit *e\*\*\*\*\**. Ab aqua phagedænica, in qua sublimatus mercurius solutus erat, salivæ fluxus *e†* secutus est. Tactis genitalibus foeminae infectæ chirurgus periit *e††*, & ab hellebori radice in fonticulum data *e†††*.

### §. VIII. *Et infusa.*

Verum accuratius utique experimentum est, quod medici instituerunt. In venam quidem & in sanguinem venenum, aut medicamentum, impellitur: sed idem effectus suos certos & determinatos in ventriculo vomitu moto, in in-

*e\** Büttner. *Tödlichkeit* p. 15. Boyle *porosit.* p. 23.  
 200. Wepfer *cicut. aquat.* p. *e\*\*\*\*\** E. N. C. Dec. II.  
 289. & motus cruris ademptus ann. II. *obs.* 108.  
*Barthol. cauter* p. 16. *e†* Mem. de l'Acad. de  
*e\*\** Stahl *Meth. med.* p. *chir.* p. i. 157.  
 56. 57. Peyer *exerc.* p. 197. *e††* Kramer *Med. milit.*  
*e\*\*\** E. N. C. Dec. II. ann. II. p. 81.  
 I. *obs.* 43. *e†††* Ettmüller *chir. inf.*  
*e\*\*\*\** Ap. Jordanum Brunnagall. Borrich. de Venen. p. 722.  
 Mauchart *ophthalmoxyst.* p.

testinis alvo laxata, in cerebro ebrietate excitata, in corde & pulmone sanguine coacto demonstrat. Unde certe ostenditur, venenum ex vena brachii pedisve ad cor, ad pulmones, ad caput, ad alvum venisse, & id iter procul dubio sanguinis venosi fuisse, a quo venenum in eas partes corporis animalis vectum est.

Primus horum experimentorum auctor perhibetur J. Georgius v. *Wahrendorf f*, qui anno 1642. in Lusatiae pago vinum in canum venas inpulit, & ea animalia inebriata fuisse adnotavit. In Britannia ornatius primus idem periculum repetiit anno 1656. *Christophorus Wren*, præter architecturam etiam anatomes peritus g; deinde ab eo viro monitus, sequente anno, D. *Timotheus Clarke h*. Sed etiam *Richardus Lower i* circa ea fere tempora se iisdem experimentis exercuit. Demum ann. 1663. *Robertus Boyle k* necessarium apparatus invenit, & eodem anno idem, quem laudavi, D. *Clarke* experimenta sua coram societate Regia legit l. Anno sequente J. *Daniel Maior* theoriam m ad experimentum addidit; administravit autem J. *Sigismundus Elsholz n*, & repetierunt alii, quos

f J. Daniel Maior in *Memoriali anatomico* n. 5. *Ettmuller chirurg. infus.* n. 3. in L. of the usefulness of exper. philosophy T. II. p. 62. 63.  
 g *Philos. Transact.* n. 35. l Birch l. c. T. I. p. 303. die 16. Septembri.  
 h *Idem ibid.* m In *prodromo chirurg. infus.* Nam in theoria substitit *Elsholzio* teste p. 16.  
 i Ante plures annos se exercuisse scribit de corde c. 4. p. 127. ed. Angl. n In *clysmatica curiosa*.  
 k *Philos. Transact.* n. 7. &



continuo citabimus: & ego plusscula experimen-  
ta in theatro Gottingensi a Clar. viro, & tunc  
quidem meo & commensali, & contubernali  
J. Theodoro Sproegel o facta vidi, cui repeten-  
da commendaveram, quæ dudum intermissa  
fuissent.

§. IX. *Vis coagulantium venenorum.*

Ab acidis medicamentis in cordis & pul-  
monis vasis efficaciam demonstrantibus  
initium faciam. A spiritu vitrioli in venam  
impulso mors post quatuor horæ minuta, &  
sanguis coactus p. Idem eventus ab eodem  
spiritu, & sanguis niger & inæqualiter coac-  
tus q. Ab eodem spiritu injecto animal periit,  
& sanguis in pulmone concretus adparuit r.  
Ab oleo sulfuris per campanam impulsio mors  
& cruor ater s. Ab aqua chrysulca injecta  
sanguis coactus t. A spiritu salis in jugularem  
venam impulsio mors, coacto sanguine in vena  
cava, utraque aure cordis, & dextro ventri-  
culo v. Ab aqua regia animalia coacto san-  
guine perierunt x. A spiritu nitri mors &

o In disp. inaug. qua ex- p. 465.  
perimenta circa venena in va- s Ettmuller in Chirurg. in-  
riis animalibus instituta con- fus.  
tinentur Gotting. 1753. t Fracassatus l. c.  
p Du Hamel hist. Acad. Reg. v Sproegel l. c. exp. 57.  
Scient. p. 88. 58. Philos. Transact. n. 335.  
q Car. Fracassatus de cere- Dilutus non occidit Sproegel  
bro p. 44. seqq. Philos. Tran- exp. 56.  
sact. n. 29. x Petit lettres d'un Mede-  
r Georg. Bagliv.-oper. omn. cin II. 37.

sanguis coactus *y*. Ab acido spiritu in venam jugularem misso, sanguis in dextro ventriculo coactus *z*. Ab aceto destillato ad duas drachmas in venam infuso mors *a*. Sic ab aliis acidis succis sanguis totus coivit *b*. Ab anima martis in cruralem venam injecta mors & coactus sanguis *c*. A vitriolo ungarico soluto, & in venam jugularem injecto, mors subita, & sanguis in corde grumofus *d*. Ab alumine venis jugularibus inmisso extemplo mors *e*. A fumo sulfuris venis impulsio animal perit, corde a sanguine distento, sinistro vero ventriculo inani, cum sanguis in pulmone retineretur *f*. Saccharum Saturni, quod sanguinem cogit, occidit sanguine in corde, pulmonibus, venis, in unguenti speciem densato *g*. Uno verbo spiritus & salis: & sulfuris, & nitri, & vitrioli in venam vivi animalis impulsus ejusdem funesti eventus subitæque mortis causæ fuerunt. Minus magnam malum ab aceto expectares, & ipsum tamen animal perinde & subito occidit.

Quod acida mineralia, idem fere vini spiritus efficit. Debilis equidem *h* tantum palpita-

*y* Ettmuller l. c.

*z* Allen Moulins Phil. Transact. n. 191.

*a* Sproegel exp. 51. Philos. Transact. n. 29.

*b* R. de Graaf def. contra Swammerd. p. 319.

*c* Anton. de Heyde obs. 90.

*d* Ant. Deidier in collectione de la peste ann. 1744. p.

534.

*e* Clayton Phil. Trans. n.

210. Miscellan. cur. T. III. p. 347.

*f* Browne Langrish Phys. experim. on brutes p. 152. Exp. 8.

*g* Sproegel exper. 44. 45. 46. 47.

*h* Sproegel exp. 49. Bagliu. exp. 4. p. 674.



tiones excitat, alias rabiem fecit: sed ab aqua rite depuratus idem continuo occidit, & sanguis in vena cava, aure & ventriculo cordis dextro, & pulmone coactus reperitur *i*. Oleum etiam olivarum funestum soporem fecit.

§. X. *Vis venenorum narcoticorum.*

Sed etiam alii quicunque liquores, qui sanguinis iter per pulmones sufflaminant, id fere commune habent, si in venam dederis, ut sanguis in vena cava, aure dextra, ventriculo dextro & pulmone colligatur. Id cum sebo *k* liquefacto evenit, & cum lacte *l*, cumque oleo *m*. Ipse demum aer venis inflatus continuo in pulmonem venit, suisque bullis sanguinis iter moratus animal necat *n*, per numerosa clarorum virorum, & per nostra etiam experimenta. De opio proxime dicemus, paulum in his experimentis moraturi, quæ a nuperis medicis nimis deserta fuerunt. Id ergo, quocunque in liquore solutum,

*i* Sproegel exp. 48. 50. Petit 1. c. p. 23. J. Göttl. Kru-  
ger patholog. p. 157. Ant. de Heyde obs. 90. Bagliv. p. 674.  
exp. 3. Phil. Transf. n. 335.  
*k* Drelincourt canicid. 6.  
*l* Lomer de corde c. 2.  
Queye de syncope p. 90. (non tamen semper, nam in aliis experimentis innocuum fuit)  
Sachs libr. cit. Denys in Phil. Transf. n. 27.  
*m* Courten Philos. Transf. n. 335. Animal inde per soporem periit.  
*n* Ant. de Heyde 1. c. Rud. Jac. Camerar. de tensione cordis. J. Conr. Brunner de pancreate p. 178. Harder apiar. obs. 25. Browne Langrisch 1. c. p. 154. Sproegel exp. 52. 53.

venisque injectum , vim soporiferam o exercet, etiam biduo p , & convulsionum q nonnunquam, & mortis r denique causa est. Quæ cum opio vi inebriante consentiunt. ex vino stillantia medicamenta, ea paria phænomena in vivis animalibus produxerunt. A vino hispanico venis infuso ebrietas successit s , & a vini procul dubio debiliore spiritu t.

§. XI. *Alii effectus specifici pharmacorum in venam infusorum.*

Sed etiam argentum vivum, cujus vis in capitis imprimis glandulis mucosis & salivalibus conspicua est, eam vim exercet, quoties in venas inpellitur. In canis venas receptum fecit, ut omnes glandulæ capitis turgent, & serum in cerebro colligeretur v.

In aliis visceribus perinde venena venis infusa specificum effectum edunt. Ergo emetica quæcunque perinde vomitum movent, uti

o Boyle *Phil. Trans.* n. 7. *usefulness of exper. philos.* l. c. Garmann in *epist.* 30. & apud J. Dan. *Maiorem* l. c. pag. 66. Borrichius de *sanguine* pag. 85. T. Willis *pharmac. rational.* p. 157. J. Sig. Elsholz p. 15. 16. Sproegel *exp.* 42.

p Ex drachma opii J. C. *Maior memor. anat.* n. 1. & totius tridui stupor Sproegel *exp.* 43.

q In fele Courten *Philos. Trans.* n. 335.

r Post tridui soporem Sproegel *ibid.*

s *Phil. Jac. Sachs* l. c. p. 146. Schott *technic. curios.* p. 891. ex P. Ruperti relatione. Wahrendorf loc. jam cit.

t Petit l. c. p. 23. Conf. *Phil. Trans.* n. 335. Topp apud Pacchioni.

v Pitt *Philos. Transact.* n. 240.



solent, quando devorantur, manifesto argumento, vim infusi medicaminis ad ventriculum penetrasse. A tartari emetici sex granis in venam infusis vomitus motus est  $\alpha$ , etiam funesto eventu  $\gamma$ . A resina scammoniei soluta, & in venas impulsæ, vomitus vehementissimus & ipsa mors  $\zeta$ . A croco metallorum ad uncias duas injecto funestus vomitus  $a$ . A vitro antimonii vehemens purgatio  $a^*$ . Ab arsenico extus admoto vomitio sanguinis & mors. A mercurio sublimato in lotionē adhibito salivæ fluxus. Contra a fennæ solutione vomitus equidem in cane secutus est, ut tamen convalesceret  $b$ . Nam in universum canes multo majores venenorum doses ferunt, neque opio, cicutæ aquaticæ succo, aliisque venenis ex vegetantium classe occidi possunt  $c$ .

Perinde vero, uti vomitus, ita egestiones alvi ex infusis medicamentis purgantibus cidentur, ut necesse sit ad mesentericas arterias & intestina venisse eam vim, quæ fæcum alvarum iter præcipitat. Princeps quidem auctor est *Borrichius*, idemque addit, eandem dosin in venas infusam alvum movere, quæ deglutita movet  $d$ . Plurimi alii similes eventus vide-

$\alpha$  *Brunner de Pancreate* 1. num Centur IV. *Epist.* 92. p. c. *Elsholz* p. 17. 522.

$\gamma$  *Phil. Transf.* n. 7. *Elsholz* l. c. a dupla dosi tartari emetici.

$\zeta$  *Becket collection of tracts* p. 44.

$a$  *Borrichius* apud *Bartholi-*

$a^*$  *Maior* l. c.

$b$  Duæ tantum drachmæ fennæ fuerunt *Courten Phil. Transact.* n. 335.

$c$  *Sproegel* passim.

$d$  *De sanguine* p. 84.

runt *e*. Ex gummi guttæ drachmis sex, in liquore solutis, & in venam impulsis mors, & vena cava, atque dextrum cor, sanguine coacto plena *f*. Et in alio experimento a *Borrichio* citato liquida fæx de vena profluxit.

Iterum vis aut venenata, aut medicata in venas infusa ad renes venit, & urinæ vias perinde sollicitat, uti quidem fieret, si pharmaca deglutita fuissent. Tinctura cantharidum, ad duas drachmas, in canis venas missa urinam copiosissimam movit, vesicam erofit, bestiam occidit *g*, in duobus experimentis. Nitrum infusum mictionem copiosam excitavit, sed innocuam, uti totum medicamentum absque veneno est *h*.

## §. XII. *Vis eorum in totum corpus animalis.*

Denique non quidem peculiare viscus, sed totam humorum massam a vi veneni in venam quamcunque inmissi penetrari, & per universum corpus ejus effectus apparere, alia experimenta demonstrant. Ab arsenici decocto venis vivi animalis injecto borborygmi (hi ab inflammato ventriculo) convulsiones, lethum *i*. A bile hominum peste peremptorum in venam

*e* Schott l. c. *Fabricius* 1. 2. in altero cane dosis apud *Pechlinum* de purgantib. cantharidum alia fuit.

p. 410. *Elsholz* append. l. c. *h* *Malpighi* de polyp. p.

*f* *Ant.* de *Heyde* obs. 90. 131.

*g* *Bagliv.* de vesicantib. Exp. *i* *Elsholz* p. 18.



canis impulsa cita mors, quando in jugularem, lentior aliquanto, quando in cruralem venam venenum mittebatur *k*: & perinde a sanguine hominis peste infecti in animalis venam impulso. Oleum Nicotianæ infusum convulsionem, vehementem arteriarum pulsationem, promptamque mortem intulit *l*, inque alio exemplo non quidem occidit, cum octo tantum vel novem guttulæ spiritus nicotianæ infunderentur, vomitus tamen & ægrimonia secuta est *m*. Ipsum decoctum hujus herbæ infusum expedite animal enecat *n*. A decocto hellebori albi venæ infuso mors celerrima, cum subita carnum flacciditate conjuncta, quam diximus in feris observari, quæ telis hoc veneno armatis letho dantur *o*. A spiritus salis ammoniaci uncia in venam axillarem canis injecta continuo mors secuta *p*, & sanguis in nonnullis experimentis niger & coagulatus *q*. A nitri solutione injecta canis quidem periit, cæterum sanguis undique rubicundus fuit, ut a nitro adfuso solet *r*. Mortes omitto, quæ ab oleo tar-

*k* A. Deidier l. a. p. 506.  
Coagulationem sanguinis bili  
non tribuo, cum in aliis,  
ejusdem viri, experimentis  
bilis morbosa sanguinem  
potius dissolverit *observ.* sur  
*la bile des pestiferés* n. 13.  
*Journal des Savans* Decembre  
1722.

*l* Harder *apiar. obs.* 7.  
*m* Birch l. c. T. II. p. 50.

53.

*n* Courten *Phil. Transf.* n.  
335.

*o* Idem *ibid.*

*p* Drelincourt apud Bantz-  
mann de peste. Courten l. c.  
*Petit Epist.* II. p. 22. 33.

*q* Zollickhofer *disput. de do-*  
*lore* p. II.

*r* Clayton l. c. p. 347. Ett-  
muller l. c. p. 21. 37.

tari aut citæ *s*, aut tardæ *t*, secutæ sunt, etsi etiam hæc demonstrant, non in eo artu, quem vena veneno infecta adit, efficaciam eorum salium se exseruisse, sed in universo omnino sanguine.

Denique lac in arteriam impulsam post octo horas de vena perfluxit, cujus experimenti eadem vis est *t*\*.

### §. XIII. *Vis medicamentorum.*

Uti venenati, ita salubres effectus medicaminum in venas infusorum per totam humorum animalium universitatem conspicui enituerunt. In se ipso, illustri exemplo, scabiem aqua cochleariæ infusa cum spiritu theriacali sanavit *Matthæus Godofredus Purmann* *v*, minime incelebris chirurgus, idemque injecta in venas eadem aqua cochleariæ febrem sublatam vidit *x*. Arthritidem, plicam polonicam, cum ulcere conjunctam, hac administratione *Dantiscani* medici *Scheffer* & *Schmidt* *y*, superarunt, etsi frustra iidem invictam epilepsiam tentarunt *z*, quæ in nervis potius, quam in sanguine radices figat. Siphilidis medicamentis in venas infusis sanatæ exempla existant *a*. Ulce-

*s* Courten l. c. de Heyde l. III, p. 277.  
*c* Conf. *Fracassatum* l. c. p. 318. *Borrichium* l. c. p. 85.  
*Pechlinum* l. c. p. 180.  
*t* Colhatch append. concerning acid and alkali p. 215.  
*t*\* Birch. IV, p. 205.  
*w* Chirurg. Lorberkranz T. III, p. 277.  
*x* Ibid,  
*y* Apud *Elsholzium* in append. & in *Phil. Trans.* n. 39.  
*z* *Phil. Trans.* l. c.  
*a* *Ortus & occasus med. clysmat.* *Elsholz* l. c. p. 48.  
*Phil. Trans.* n. 30.



ris impulso in venas balsamo Meccano clausi testimonium habemus *b*, & spiritu cornu cervi infuso salutem reparatam legimus, cum homo a vipera demorsus periculosa omnino symptomata pateretur *c*.

§. XIV. *Non laudatur ad medendum.*

Nollem ob hæc experimenta novam medicinæ faciendæ viam ingredi, etsi suasor *d* non deest, & in præcipiti casu a morfu venenatæ bestię, forte celerius ægro, subveniri possit, quam per longas ventriculi, intestinorum, & lacteorum vasorum ambages. Nimis enim multa nobis experimenta facienda, & cum periculo conjuncta supersunt, donec dosium veros fines, & remediorum immediate in sanguinem missorum innocentiam ea cum certitudine teneamus, quæ in re seria vitamque mortalium tangente requiritur. Multa enim absque incommodo ventriculo traduntur, quæ non absque perniciæ sanguini miscentur. Verum suffecerit per hæc pericula ostendisse, vim pharmacorum, adeoque sanguinem venosum, quo illa

---

*b* Breslauer Samlungen 1718. M. April.

*c* Valisneri in *Galer di Minerva* T. VII. p. 153. & in *oper. omn.* T. III. p. 211.

*d* Ettmullerus suadet infundere sudorifera, opiata &c. & tentare hanc medendi viam

in morbis aut maximis, & acutissimis, ut in apoplexia, convulsionibus, aut totam humorum massam corrumpentibus, ut in scorbuto, lue venerea, ictero, febribus malignis.

illa vehitur, ab omni corporis animati vena ad cor, & inde ad totam humorum massam, viscera omnia, omniaque ejus corporis vasa, se diffudisse.

### §. XV. *Transfusi sanguinis Historia.*

Manifestius tamen a sanguinis *transfusione* pro sanguinis circuitu argumentum petitur. Nempe in his experimentis animal, aut fanum, aut in plerisque morbo aliquo adfectum, sanguine per incisam venam effluente pene totum inanitur, ut arteriæ venæque undique evacuentur: ita enim necesse est, ut spatium novo sanguini pareatur, neque plethora e per certa exempla funesta inducatur. Deinde alteri animali, etiam alterius generis, aperitur arteria, quæcunque, & per tubos consentientes sanguis ex ea arteria in venam prioris, & ex sanguis bestię traducitur. Ita hujus quidem animalis omnes arteriæ, venæque omnes, recepto sanguine celeriter replentur, & pristinus ipsi vigor redit, neque penitus nunquam morbi aliqui emendantur, ex quibus languebat.

e In vulpe, & in ovis varia incommoda ex nimia copia inmissi sanguinis secuta sunt. Et illam quidem venæ sectio sanavit apud *Birchium* l. c. T. II. p. 179. ista inflammatis intestinis periit ibid. p. 190. 191. Sic in Gallia micus sanguineus & viscerum inflammationes, in-

de successerunt *Phil. Transf.* n. 28. 32. *Rilazione della transfusione* p. 36. 37. & sanguis in abdomen effusus *Santinielli* p. 25. & mortes animalium inde secutæ sunt *G. de Guryes de Montpolli lettres touchant la transfusion* Paris 1668. 4. *Lamy seconde lettre à M. Moreau* p. 3.



Ita certe evincitur, ex ea vena, quæ sanguinem per traducem recipit, naturale sanguinis iter non ad partem corporis, quem ea vena adit, sed ad cor omnino, & inde demum ad totum animalis corpus ducere, ut perinde omnes ejus arteriæ & venæ repleantur, uti eæ per incisam venam omnes inanitæ fuerant.

Hujus nobilis experimenti aliqua vestigia, & certe desiderii testimonia, apud vetustiores medicos exstant. Ita *Marsilius Ficinus* f senes, qui rejuvenascere cupiunt, de juvenum brachiis sanguinem fugere jussit. Deinde *Andreas Libavius* g transfusionem sanguinis ita commendavit, ut etiam tubos describeret, quibus opus esset; recipientem tamen tubulum male suavit arteriæ inmitti, cum discrimen itineris sanguinei in arteriis, inque venis, nondum perspiceret. *Johannes Colle* h Bellunensis, paulo ultra *Marsilii* præcepta progressus, juvenis sanguinem in senem transmittere auctor fuit, ut secundâ juvenis novo Æsoni rediret.

#### §. XVI. *Anglorum experimenta.*

Deinde in Anglia magis serio de hoc medicinæ genere cogitatum est. Et quidem *Timothæus Clarke* anno 1657. transfusionem administrare molitus est, atque instrumenta pa-

---

f Apud *Santinellium* in confusione transfusionis sanguinis p. 99.

g In defensione syntagmatis arcanorum chemicorum.

h In methodo facili præpar. medicament. Venet. 1628.

ravit, non tamen absque multiplici difficultate, quam ipse expertus est, & *Henshavius*, ut omnino successu exciderent *i*. Porro cum *D. Clarke* anno 1663. 16. Sept. experimenta sua infusoria in confessu legeret, iterum cogitatum est de transfusione *k*, eaque opera anno 1665. 1. M. Februario Oxonii feliciter functus est *Richardus Lower*, deque eo experimento in duobus canibus facto relatum est *m* coram Societate Regia d. 20. Junii 1666. Sed etiam 16. Maii mensis *Thomas Coxe* de transfusione sanguinis ex columba in columbam facta ad societatem retulit *n*. Iterum, Martio mense anni 1666. *Boyleus* de ea administratione monuit *o*, quæ tamen, nimis memori sui minus fausti successus, *Timotheo Clarke* difficilis visa est *p*. Sed d. Nov. 14. anni ejusdem DD. *Coxe* & *King* transfusionem in duobus canibus coram societate feliciter exercuerunt *q*, ex vena in venam sanguine misso, quæ tunc methodus nova fuit, cum prius arteriam inciderent *q\**. Postea, erectus ab his felicioribus tentaminibus ipse *Clarkius* d. 21. Novemb. ejus anni 1666. transfusi ex arteria in venam jugularem

---

*i* *Philos. Transact.* n. 35. *p* l. c.  
*k* *Birch* T. I. p. 303. *q* *Idem* T. II. pag. 123.  
*l* *Philos. Transact.* n. 30. Conf. *Phil. Transf.* n. 19. 20.  
 de corde c. 4. p. 138. edit. 25. 27. Laudat tamen *Lowerum*, qui prævissit.  
*m* *Birch* ad eum diem. *q\** Eam etiam *Cl. Tardy* probavit in *tr. de l'écoulement du sang d'un homme dans les veines de l'autre* Paris 1667.  
*n* T. II. p. 50.  
*o* *Birch* ad eum diem.



sanguinis, ovisque, quæ suum pene totum amiserat, legitima cruoris copia restauratæ recteque valentis, historiam coram societate prælegit *r*. Inde porro 12. Decemb. 1666. & privatim, & coram ea illustri societate, experimentum factum est *s*; & sanguis ex ove in canem transfusus, neque porro res aut rara fuit, aut arcana, cum a pluribus diversarum gentium incisoribus id periculum repeteretur *t*.

### §. XVII. Gallorum.

In Gallia fere M. Septembri anni 1666. experimentum fecerunt D. *Denys* & Chirurgus *Emmerez v*, satis quidem in brutis animalibus felices *x*, ut inter aliquot canes nullus omnino periret, inque aliis culpa ad plethoram non improbabiliter referretur. Reliquæ bestię cum adventitio suo sanguine sanæ & alacres vixerunt, aliquæ etiam melius, quam dudum. Ita canis vetulus *y*, surdaster, meliorem auditus usum recuperavit, & juvenilem quamdam alacritatem. Alius canis, pariter vetulus *z* virium in-

*r* Birch ad eum diem.

*s* Idem ibid p. 133. Conf. *Phil. Transact.* n. 20.

*t* Conf. experimenta alia apud Birch T. II. p. 162. 179. 190. 191.

*v* *Philos. Transf.* n. 27. & in I. epistola, ex qua adparet, quatuor menses ante Januarium 1667. experimentum factum esse. In diario

*eruditorum* d. 14. Mart. ejus anni de eo exp. relatum est.

*x* *Denys* épître I. *Philos. Transact.* n. 25. 27. 42. *Journ. des Savans* 1667. n. 6. & 8.

*y* *Phil. Transact.* n. 42.

*z* Ibid. n. 26. 30. *Gadroys lettre à M. Blondel* p. 13. *Rilazione della transfusione* p. 40. & in *Diario Romano Tassinii* 1668, p. 92.

Restorationem sua lætitia demonstravit, alter *a* etiam subito ex morbo convaluit. Equus depositæ ætatis, 26. annorum, cum novo quatuor agnorum sanguine novas vires recepit *b*. Vindobonæ *c* cani per transfusionem vigor redditus est. Nuper Cl. *Colomb* canem recreatum esse expertus est, qui sanguinem transfusum receperat.

§. XVIII. *Transfusio in homine tentata.*

Cum præterea Romæ a *Paulo Manfredo d*, Belga quodam adjuvante, & *Simone Allio* chirurgus, transfusio sanguinis ex carotide per unicum tubum feliciter fieret, factum est, ut ad maximas spes hominum animi erigerentur. Ipse *Richardus Lower e*, & *Mauricius Hofmann f*, & imprimis in Gallia C. *Tardy g* & D. *Denys h* spem conceperunt, fore ut epilepsia aliique magni, & inveterati, morbi una cum hominum sanguine profligari possent: neque multum abfuit, quin immortalitatem non valde eminens se prospicere persuaderentur.

Ergo experimentum in homine fecit cum chirurgus *Emmerez D. Denys*, & in venas juvenis

*a* Phil. Transact. n. 25.

*b* Phil. Transact. n. 30.

*c* Birch T. II. p. 311.

*d* Rilaz. della transfusione

*e* 3.

*e* De corde c. 4. p. 142.

Phil. Transf. n. 20.

*f* Apud Ettmullerum. de chirurgia infusoria c. 3. Proposuit etiam J. Dan. Maior, in homine faciendam.

*g* l. c.

*h* Philos. Transact. n. 27. multis propositis rationibus & objectionibus refutatis.



stupidi animi, aliquanto plus sanguinis agnini infudit, quam perdiderat, eo effectū, ut rationis rectiorem usum recipere videretur *i*. Deinde in sani hominis venas ejusdem animalis sanguinem, certe absque incommodo inmisit *k*: neque infelicior, etiam in homine, *Pauli Manfredi l* industria fuit; & idem, quem citavimus, *Purmannus m*, lepræ sanguine agnino in venas recepto sanatæ meminit, quartanæ *Thomas Bartholinus n*. Inde in Britannia d. 23. Nov. 1667. in *Arthuro Coga*, litterato homine, calidioris nonnihil cerebri, qui sponte se periculo obtulerat *o*, sanguis ovillus *Loweri & Kingii* industria *p*, in venam infusus est, tunc quidem sine malo: deinde, cum pro octo emissis unciiis, quatuordecim sanguinis uncia ipsi redditæ fuissent, eventu aliquantum equidem deteriori *q*, eadem Regia societas in posteriori conventu experimentum in homine iterari iussit *r*.

### §. XIX. Sed infeliciter.

Sed interim breve gaudium tristes in Gallia successus corruperunt. Nam prior ille juvenis

*i* *Philos. Transact.* n. 27.

& 32. *Lettre I.* p. 13.

*k* *Philos. Trans.* l. c. & n. 30.

*Lettre I.* p. 14. 15.

*l* l. c. c. 4. p. 16.

*m* l. c. p. 284. 285.

*n* *Act. Hafniens.* Vol. III. obs. 53.

*o* *Birch T. II.* p. 215.

*p* *Ibid.* p. 216. *Phil. Trans.*

*q* *Birch. T. II.* p. 225. 227. Aiebant potando febrem sibi concivisse.

*r* *Ibid.* p. 312.

gallus, post experimentum, quod citavimus, in phrenitidem incidit, & post secundam transfusionem soporosus sanguinemque mingens denique periit, & medici acerbam calumniam passi, a vidua etiam in jus vocati fuerunt *s.* Deinde, cum eo infortunio non absteriti, parum considerate in regii sanguinis juvene, ex gente Bonde, coeliaco, & desperato, transfusionem vitulini sanguinis tentassent, is vero paulo post diem suum obiisset *t*, ipsis intestinis sideratis, ut in cadavere adparuit, factum est, ut Senatus Parisinus audacem administrationem edicto proscriberet *v.* Et paulo post, cum duo ægri, transfusionem *Guilielmi Rivæ* *x* manu passi, periissent, & denique medicus Italus *Venantius Ventroni* transfusionem in se ipso molitus mortes auduciam luisset *x\**, etiam pontifex Romanus *y* simili lege curiositatem medicorum coercuit. Sed etiam in scorbuticis, in quibus nociturum alii monuerant *z*, infelix experimentum factum est *a.* Ergo, & merito quidem, porro a transfundendo in hominum venas sanguine temperatum est. Justus enim metus erat, ne sanguis aut in emittente tubulo, aut in recipiente cogeretur, ut peritis anatomicis accidit

*s* *Phil. Transf.* n. 28. 32. certe prudenter, sanguinem  
36. 37. 54. inmiscerat *Eph. Nat. Cur. Dec.*

*t* *Phil. Transf.* n. 28. 30. *I. ann. I. obs.* 149.

*Lettre de C. G.* p. 15. 16. *x\** *Panelli II.* p. 296.

*v* *Du Hamel histor. Acad. Reg. Scient.* p. 21. 22. *Bartholin I. c.* *y* *Merclin de transfus. sanguin.* p. 25. 85. &c.

*z* *I. c.*

*x* In phthifici venas, non *a* *Purmann I. c.*



*b*, & coactus in venas veniret, non sine summo hominis periculo.

Verum etsi ad curationem morborum parum inde beneficii redundavit, ad demonstrandum tamen sanguinis circuitum pro firmissimo testimonio fuit, quod sanguis inmissus non in unum eum artum, in quem infundebatur, sed in cor, inque omnes arterias & venas recipientis animalis transierit.

§. XX. *Oculorum pro circuitu sanguinis testimonium.*

Supererat, ut ipsis oculis circuitus sanguinis subjiceretur. Neque hic ultimus colophon veritati defuit, etsi is demum post fata *Harveiz* adjectus est. Nullas enim objectiones, aut cavillos ullos, superfuturos sperari poterat, signari incisores sanguinem ex ultimis arteriis, in nascentes venas transire, adque cor reverti viderent. Id evenit paucis post excessum magni senis annis. *Marcellus* enim *Malpighius* anno 1661. c experimenta edidit, quæ in ranarum pulmone, mesenterio, & urinaria vesica, lente vitrea adjutus fecerat. Ubique vidit, sanguinem ex arteriis per veras anastomoses & vasa continuata moveri, & contrario motu ex arteriis per venas revehi, paulo tamen, ut

*b Phil. Transf. n. 20. Pertransfus. sanguinis in om-*  
*rault Essays de physique T. nibus experimentis.*  
*IV. p. 417. 418. Sturm de c In secunda epistola de pul-*  
*monibus.*

fæpe alias, ob minorem consuetudinem sermonis latini, obscurius scripsit. Luculentiora in *posthumis d* experimenta describuntur, instituta anno 1665. & inter *Baglivii* opera e recusa, non tamen penitus manifestæ anastomoses arteriarum cum venis expressæ sunt, uti quidem in ranæ mesenterio eæ anastomoses non liquide adparent.

§. XXI. *Leeuwenhæckii inventa.*

Successit labori, & rem in liquidum constituit, civis delphenfis, artis poliendorum vitrorum gnarus, cæterum disciplina medica minime innutritus, *Antonius van Leeuwenhæck*. Is anno quidem 1680. *f* nondum venas arteriis continuari noverat, illasque sanguinem resorbere scripserat, quem arteriæ effudissent. Deinde ab anno, ut videtur, 1688. *g* & quidem in gyrino primum, inde in variis animalibus, quibus cutis pellucet, vidit sanguinem a corde per arterias ad earum extremos fines, hinc per venas ad cor moveri: apparatus etiam idoneum ad repetenda experimenta descripsit. Repetam paucis solertis viri observationes, etsi eas jam tetigisse necesse fuit, quando de arteriarum cum venis continuitate dixi. Ergo, cum fines arteriarum inflecti videret, ut pars reflexa, quæ nunc vena est, arteriæ parallela ad cor re-

*d* p. 91. 92.

*e Oper. omn.* p. 678. seqq.  
*f Epist.* 59, p. 15.

*g Experiment.* & contem-  
*plat.* & arcanis naturæ de-  
*tectis epist.* 65, p. 158 seqq.



curreret, omnino etiam sanguinem vidit, ad extremam caudam per arteriam tendere, perque venam arteriæ continuatam ad cor redire *b*.

Sed etiam ramum arteriosum ipsum in vicinam venam vidit inmitti *i*, & arteriam in duos tresve ramos dividi, qui in unicam venulam confluerent *k*.

Deinde paulum alio modo, ab arteria in venam vicinam & parallelam sanguinem per ramos communicantes *l* transiisse observavit: quod quidem spectaculum difficilius est, & facile fallit, cum venulas in rete implexas facile pro arteriis habeas, quæ venis inferantur: & præterea area, quæ microscopio comprehenditur, exigua sit, atque venula e longinquo adrepisse possit. Eandem certe causam erroris esse autumo, in quem bonus senex, fracta proculdubio oculorum acie incidit, ut omnino venis pulsum adsignaret, quem arteriis negaret *m*: & denique pro novo phænomeno anasto-

*b* Oper. omn. latinor. T. II. *Experiment. & contemplat. Epist.* 65. p. 161. f. V. VI. A. f. X. p. 163. in ranis & p. 166. in pisciculis: porro *Epist.* 67. p. 177. f. I. in anguilla, & p. 185. in trocata. Deinde in *Epistolis ad Societ. Regiam Scient. Brit.* five T. III. *opérum* p. 52. & alibi: inque Tomo IV. five *Epistolis physiologicis* p. 336.

*i* *Epist.* 119. f. 4.

*k* *Ibid.* f. I. & *Epist.* 65. p. 161. f. VI. A.

*l* In T. II. qui *Experimenta & contemplationes* in summis paginis inscribitur, titulum vero præfert *Arcanorum naturæ detectorum Epist.* 66. p. 183. 185. f. 14. 15. 16. 17. vario modo. Tum in T. III. five *Epistolis ad Reg. Societ. Brit.* *Epist.* 112. & in figura adjecta, in cuius ingente area & prior modus circuitus sanguinei exprimitur, & iste, quem nunc dico, & in *Epist.* 128. f. 3. p. 220.

*m* *Epist. physiolog.* 18. p. 167.

moses arteriarum & venarum mutuas describe-  
ret, in quibus tantum arteria acciperet, quan-  
tum vena dedisset *n*. Difficultatem rei dudum  
*Antonius de Heyde* o perspexit, & mesenteria  
ranarum omnino reti venoso *p* occupantur,  
nusquam conspicuo aliquo principio cum arte-  
riis connexo *q*, in quo ejusmodi anastomoses  
arteriolarum in venas se immittentium adparere  
facile persuadearis *r*, errorem tamen omnino de-  
tegas, si denuo eandem aream sollicite reco-  
gnoveris.

### §. XXII. *Aliorum.*

Post hujus belgæ labores in Anglia expe-  
rimenta microscopica ad circuitum sanguinis  
pertinentia magno numero facta sunt. Et pri-  
mus *Guilielmus Cowper* in fele juniore, in me-  
senterio canino, & in omento felis *s*, rete *t*  
arteriolarum & venularum sibi inosculatarum  
delineavit, raro certe felicitatis exemplo: mihi  
enim in calidi sanguinis animalibus circui-  
tum sanguinis ex arteriis in venas conspi-  
cium videre nunquam datum est *v*: neque *Leeu-  
wenhoeckio*, nisi in vespertilione *x*, in-

*n* In Tomo III. operum si-  
ve Epistolis ad Soc. Reg. p.  
224.

*o* Obs. 85.

*p* Second Memoire sur le  
mouvement du sang Exp. 119.  
120. 122. 124. 125. 127. 132.  
138. 143. 144. 145. 147.

*q* Exp. 138. 143.

*r* Exp. 127.

*s* Phil. Transact. n. 280.  
( & 285.)

*t* Ibid. f. 4. 5.

*v* l. c. Exp. 10.

*x* Tom. secund. oper. five  
Experiment. & contemplat. p.  
204.



que in eo satis perfecte: aëris enim frigidi contactus sanguinem animalium ejus generis continuo cogit, ejusque motum supprimit. *Idem Cowperus* in pisciculis ramos communicantes arteriarum venarumque, & in ranæ pulmone etiam ampliores, quam in aliis animalibus, vasculorum utriusque generis anastomoses delineavit, & in ranino pede *y*. In *Philosophicis etiam Transactionibus* a Cl. *Molynæux* ex lacertæ aquaticæ cauda & branchiis circuitus sanguinis depingitur *z*. In rana & cochlea *Listerus* vidit *z*\*. *Guilielmus Cheselden* & reflexas in venam arterias habet, & laterales ramos insertos. Icone etiam aream expressit, in qua circuitus peragitur *a*.

Copiosior *b* inter Anglos fuit *Henricus Baker*, mesenterio ranino *c* usus, quod equidem mihi ad circuitum demonstrandum ineptius videtur. Nam in ea membrana pulcherrime quidem venulæ unius globuli capaces adparent, in rete intricatæ: sed ea ad unam omnes venulæ sunt, & circuitus videtur in membranis intestinorum absolvi, quo microscopii acies non pertingit. Cæterum *Idem* vir Clar. etiam rete vasculorum ex pede ranino icona expressit *d*, & recte monuit *e*, non convexissimis lentibus

*y* In *append. ad Bidloi opus* 59, seqq.

T. III. f. 4. 5.

*z* n. 288.

*z*\* Ap. *Birch*.

*a* *Anat. of human body* T. 13.

30. f. 3. ed. VI.

*b* *Microscope made easy* p.

*c* pag. 135. 136. Depictum etiam dedit *Georgius Adams* in *micrographia illustrata* Tab.

*d* l. c. T. X. f. I.

*e* l. c. p. 63. 126.

vitreis ad hæc spectacula opus esse. Ipsam arteriæ reflexionem in venam *f*, & verum ex arteria, in venam, sanguinis circuitum ex lacerata aquatica descripsit, girino etiam, mytulo, locustis, araneis, cimicibus ad hæc experimenta usus est.

*Stephanus Hales* circulum sanguineum in pulmone ranæ contemplatus est *g*, ut sanguis ex arteriarum extremis finibus in venas majores transfiret, quibus ad angulos rectos inferebantur: plusculas etiam arteriolas in unam venam convenire confirmavit *h*.

*Johannis Bernoullii i* experimenta in anguilla facta brevia sunt; tum *D. Poliniere* in rana *k*, & tinca pericula; tum anonymi *l* in aranea instituta; denique *Autonii de Heyde m*, qui sanguinem per plexum arteriæ venæque intermedium circumire vidit, & *Jacobi Parsons n*, atque *Jobloti o*, qui alteram speciem circuitus vidit, quæ fit inter ramos ad varios angulos ex arteriis natos, adque varios iterum angulos, in parallelas arteriæ venas insertos.

*f* p. 127. seqq.

*g* *Hæmostatiks* p. 66. 150. *l* *Histoire de l'Acad. Royale des Sciences* 1707. p. 9.

151. seqq.

*m* *Obs.* 85.

*h* p. 70.

*n* *De motu muscutor.* T. I.

*i* *Diff. de nutritione* n. 8.

f. 3. p. 54.

*k* *Cours de philosophie expérimentale* p. 544.

*o* In observationum microscopicarum nuper recularum præfatione.



§. XXIII. *Nostra.*

Ego quidem in motu sanguinis microscopiis contemplando multum laboris posui, ad alia tamen magis, quam ad transitum sanguinis ex arteriarum finibus in venas animum adverti. Vidi tamen, neque infrequenter *p*, in pisciculis officulorum caudæ paria sibi parallela, & totidem arteriarum pariter & venarum conjugationes *q*. Inter ea vasa, unius alterius officuli, rete vasculorum communicantium & unius globuli, aut duorum, capacium intercedit, quæ ex arteriis nata, in venas ad angulos omnigenos, & frequenter eo modo transeunt, ut tota parabolam efficiant, cujus prior medietas arterioso modo a sanguine perfluatur, in vertice vero reflexum vasculum altera medietate suæ curvæ lineæ venoso modo sanguinem in trunculum venosum revehat.

Sed etiam, perinde ut *Leeuwenhoeckius*, vidi in sede caudæ, quæ fini proxima est, majusculam arteriam officuli comitem, incurvatam, in venam reflecti, eamque multorum globulorum capacem esse. Hæc vidi & microscopio solari adjutus, quod enormiter objecta auget, & vulgatoris lentis ope. Alii vero pisciculi aliis constantius extra aquas vivunt, mihi cobitis aculeata ad hæc experimenta aptior, & diutius superstes viva est *s*\*. Ill. viri

*p* Second Memoire sur le 64. 65. 66.  
*mouv. du sang* Sect. VI. *r* Exp. 59. 62. 63. 68.  
*q* Ibid. Exp. 59. 62. 63. *s*\* Exp. 62. 63.

*Lazari Spalanzani* experimenta diximus, qui in salamandra transitum sanguinis ex arteria in venam, huic arteriæ continuam, pariterque per ramos transversos parallelæ venæ inmissos versus cor redeuntem sanguinem s\*\* dixit.

§. XXIV. *Harveio laus circuitus inventi vindicatur.*

Postquam adeo, & per varii generis experimenta, necessitas admittendi circuitus sanguinei ostensa est, & demum oculorum testimonium hoc iter vitalis humoris supra dubii periculum constituit, inter léges corporis animalis sanguinis *major circuitus* receptus est: qui fit a sanguine per aortam in arterias, & earum minimos ramulos expulso, per vénularum tenuissimas radices recepto, & ad mediocres venas, maximosque demum truncos, inque duas cavas venas revector. *Harveio* inventi gloria debetur, homini modestissimo, qui diu rem scholarum theoriæ adversam meditatus, in Germania demum, ab *Hofmanno* s detecto vero adfensum suum negante contentus, inventum suum a 1619. in prælectione chirurgica proposuit t, anno vero 1628. publicavit t\*. Prima, neque perinde plena, exercitatio ea editione continetur, duas alias in editione Bata-

s\*\* *De mot. sang.*

s *G. H. Welsch* in *somnio Vindiciani* p. 27.

t *Rob. Taylor* *Orat anniv. Harvei* anni 1756. p. 44.

t\* Titulus est *Exercitatio*

*anatomica de motu cordis & sanguinis in animalibus Guilielmi Harvei Angli* *Francof.* 1628. 4.



va serius adjecit, quibus *Johannis Riolani* objectionibus respondet.

§. XXV. *Non exstat apud Hippocratem.*

*Harveio* utique hæc majoris circuitus gloria debetur, minorem ipsa antiquitas non ignoravit. Neque me fugiunt clarorum virorum *Johannis Nardii* v, *Johannis Antonidæ van der Linden* x, *Johannis Riolani* y, *Caroli Drelincourtii* z, *Dacerii* a, *Camilli Falconet* b & aliorum c conatus, qui ad *Hippocratem* circumeuntis sanguinis cognitionem retulerunt. Legi ea loca, quæ citant, miraturus equidem, si in ea anatomes infantia senex optimus eum circuitum cognitum habuisset, quem certum est *Galenum*, ex tot experimentis anatomicis, ad motum sanguinis imprimis facientibus, doctiorem perpetuo latuisse. Ergo reperio d, *Hippocratem* nullum in corpore principium admittere, quod idem non una finis sit. Sed ex continuata lectione adparet, morborum, qui

v *Noct. genial.* X. Pro modestia tamen *Harveii* hic adverbarius testimonium dicit.

x In *Hippocrate de circulatione sanguinis*, viginti & novem disputationibus illustrato.

y *Oper. omn.* ed. 1649, fol. p. 556.

z In *epimetricis* post diff. *Filii de lienosis*.

a In versione nonnullorum librorum *Hippocraticorum* gallica, inque notis ad L. I. de *dieta*.

b *Traité des fievers* Paris. 1723. 12.

c *Conf. Method. stud. Med.* p. 314.

d In principio l.

qui in humoribus corporis humani sedem habent, ab aliqua parte corporis in omnes alias migrationem intelligi. In alio libello, spurio quidem *e*, *haimatos* equidem *periodos* nominatur, & id *periodou* & *periphoræs* vocabulum repetito occurrit, quo potissimum argumento adornandas res *Hippocratis Lindenius* usus est. In eo autem exemplo, flumina non solito more fluentia sanguinis circuitum *f* indicare legitur, & alibi dicitur significare, (quæ præcedunt) *pasas periodous*, & omnes accessiones (*prosfagogas*) & secretiones integras esse *g*: quo certe loco vox illa *periodou* a sanguinis circulatione, quæ unica est, vehementer recedit. Quando vero de iis, quæ ex *periodo* a vespere ad auroram excidunt, idem auctor scribit, ea recte habere, & ex circuitu excidere, quæ in ventrem fecernuntur, & in carnes eructantur *h*, & astrorum in corpore circuitum exteriorem, solis medium, lunæ vero eum esse, qui secundum cava est *i*, & astrorum verorum errores significare, & morbum in ea parte esse, quæ iis astris respondet, tunc quidem evictum videtur, hanc totam *periodon* repetitionem aliquid astrologici exprimere, aut nescio quos humorum ambitus, qui magnis illis stellarum ambagibus respondeant.

In alio obscuro libro *k*, profunda sectæ

*e* De insomniis.

*f* Ibid. n. 13. ed. Linden.

*g* Ibid. n. 12.

*h* Ibid. n. 8.

*i* Ibid. n. 4.

*k* L. I.



*Heraclitea* dogmata latere, pro ea, quæ summa in ipso est, eruditione ostendit *Johannes Mathias Gesnerus* *l*, noster olim in regia societate sodalis. In eo iterum libro vox *periodou* sæpius occurrit, & quidem alio loco *m* dicitur in corpore circuitus esse, & unde incipit, in idem terminari. Paulo post legitur, hominibus & animalibus in eadem *peripheria* omnia elaborari *n*. Alibi iterum tardiores, inquit *Auctor*, circuitus in iis esse, in quibus aqua abundat *o*. Iterum alibi scribit, ignem facere *periodous trissous*, intus & extus ad se invicem terminatos, alios ad cavitates humorum, facultate lunæ, alios ad circumferentiam exteriorum, astrorum vi, alios medios, & exterius terminatos & interiorius *p*. In his locis omnibus difficile est investigare auctoris sensum, non diffitente *Dacerio* *q*. Arteriosi tamen & venosi sanguinis circuitum describi, omnino absque rerum testimoniis adfirmatur.

Quare ad has lites finiendas utilius consilium est, ex genuinis *Hippocratis* operibus colligere, quænam boni senis de motu sanguinis arteriosi & venosi opinio sit. Ergo hæc primum legitima *Ejus* sententia videtur: pul-

*l* In diss. de divino Hippocratis, & in *Commentariis Soc. Reg. Gotting.* T. I. ad ann. 1751.

*m* n. XV. §. 27. 28. p. 193.

*n* n. XV. 51. 52. 53.

*o* n. XXXII.

*p* n. XI. Has tres periodos huc trahit *Dacerius* l. c. p. 107.

*q* l. c. Conjecit in amissis libris de *venis & arteriis Hippocratem* mentem suam clarius explicasse. Verum ea mera conjectura est.

sum oriri a sanguine *r*, in arteriis contrario ductu sibi occurrente, ut alius desuper adfluat, alius ab arteriis avertatur; quo quidem loco significari videtur, adscendentem sanguinem resistere illi, qui a superioribus refluit.

Alibi *Hippocrates*, aut certe auctor libri inter *Coi* scripta recepti *s*, manifestius docet, sanguinem, qui ad uterum descendit, eo viscere obstructo aversum, ad cor & septum transversum resilire, tum a pedum frigore pulsus. Aper- te hoc loco itus sanguinis & reditus sibi con- trarius in iisdem vasis statuitur, quæ mihi ve- ra, sed a circuitus lege insigniter diversa, *Hip- pocratis* theoria videtur, & summis ante me viris *t* visa est.

§. XXVI. *Neque apud Salomonem, Platonem, Veteres alios.*

Sunt qui *Salomoni* circuitum sanguinis non ignotum fuisse scripserint *v*. Usi sunt, ad hanc laudem vetustissimo regi vindicandam, *rotæ* vocabulo, quo aliquid circumeuns intelli- gi credunt. Verum nihil aliud certe hic vo- luit *Divus* ille, præter aquæ defectum, quæ

---

*r* Ex lib. *peri topon* &c. *histor. Medic. Period. I. Sect.*  
*n. 6.* *III. Adde P. Senac. Tr.*  
*s* De virginum morbis *n.* *du cœur T. II. ab init. &*  
*2. p. 356. ed. Linden.* *Wottonum of ancient and*  
*t* Inprimis *Danieli Clerico*, *modern. learning p. 210.*  
*integerrimi iudicii scriptori &* *o J. Smith in Phil. Trans.*  
*eruditissimo, in histoire de la* *n. 14. J. Muraltus. Warlie*  
*Medecine p. 127. Schulzio in* *in valetudinario senum.*



ex fonte hauriri nequeat, quod ea rota contracta sit, qua in Ægypto, & Palæstina ad aquam putealem hauriendam utuntur, a nuperis & itinerum scriptoribus descripta.

*Platoni Thomas Janson* ab *Almeloveen*, & *Heisterus*, multa laude dignus senex, *Harveianum* inventum tribuunt. Nempe sanguinem velociter a corde per totum corpus circumpelli scripsit, eo loco *y* quem *Heisterus* citat *z*. Verum ille quidem suavissimus philosophorum nihil ultra voluit, nisi cor venarum originem esse, & sanguinem per venas ad ambitum corporis ferri, plane uti *Galenus*. Alter vero a *Jansono* *a* laudatus locus *b* continet nescio quam alternam spiritus eruptionem & irruptionem, quæ respirationem facit: ad circuitum vero sanguinis omnino non spectat.

Scholiastes *Euripidis*, quem *Idem Heisterus* laudavit, venulam aliquid spiritus, arteriam aliquid sanguinis continere scripsit, iterum ad eandem sententiam, quam *Galenus* docuerat *c*.

A *Nemesio* Oxoniensis editor circuitum sanguinis describi putat, quod venam aiat alimentum arteriæ dare, tenuemque sanguinem ductum a proximis venis trahere. Verum is certe locus, ut totum *Nemesii* opus, ex *Galen*o sumtus est, qui reciprocum quemdam fan-

*α* F. L. Norden *voyage d'Égypte & de Nuhie*. 146 seqq.

*y* In *Timæo*.

*z* In progr. anno 1720. edito: conf. *Annal. Julia* T. I. pag.

*a* *Novantiq.* p. 241.

*b* Pariter ex *Timæo*.

*c* Confer hujus operis pag.

415.

guinis ex arteriis minimis in venulas, exque venulis in arterias commeatum minime ignoravit. Ideo enim factas esse arteriarum & venarum anastomoses scripsit *d*. Neque magis *Pol-lucis* locum de sanguinis circulatione expono, quem vir alioquin doctissimus *J. Nicolaus Weifs* e eo revocavit.

Inter instaurores anatomes hactenus majorem illum circuitum *Vesalius* adtigit, ut sanguinem ex venarum ramis in truncos nonnunquam refluere persuasus fuerit: raras vero eas occasiones esse ipse addidit *f*.

§. XXVII. Neque apud *Servetum*, *Jacobum Ruoff*.

Sed etiam *Michael Servetus* aliquid arterias inter & venas commercii esse non ignoravit, exque illis per anastomosin in istas spiritum vitalem dari scripsit *g*, non quidem multum ultra *Galen*i effata progressus. Minorem circuitum *Idem*, & pariter *Columbus*, accurate descripsit *h*.

*Jacobi Ruff*, chirurgi Tigurini, voces aliquas *i* nuperi chirurgi Galli huc traxerunt *k*.

*d* De utilit. partium L. VI.  
c. 17.

*e* De Veteris Græciæ re medica. p. 31.

*f* De fabric. corp. hum. pag. 443.

*g* De restitutione Christia-

nismi apud *Wotton* on ancient and modern learning.

*h* Vid. L. IV.

*i* De generatione. p. 5. 6.

*k* *Garengéot* *splanchnologie*. Ed. II. T. II. p. 157. & *D. de la Faye* ib.



Verum etiam iste homo ne quidem votis suis super vulgum sapuit, neque quidquam voluit, nisi scholarum doctrinam, spiritum nempe vitalem alternis contractionibus & dilatationibus arteriarum & cordis agitari.

*Peuceri* locus *l* nihil a vulgari scholarum sententia differt.

*Francisci* de la *Reyna*, medici veterinarii, & *Olivae Sabugo* feminae hispanae, alii circuitum sanguinis inventum adscribunt, quos libros non vidi: nihil vero percipio, ex ipsis laudatorum locis, aut experimenti aut rationis, quod virum nullius partis studiosum movere possit.

#### §. XXVIII. *Quid Casalpini viderit.*

*Andreas Casalpinus* in priori quidem opere *m* idem per pulmones sanguinis iter descripsit; in altero *n*, ex venarum inter finem suum & injectum vinculum observato tumore, omnino motum sanguinis a vena cava per pulmones & cor in aortam euntis exposuit, ut in somno calor ad cor per venam cavam reverteretur, cum ea vena ad cor ducat, non contra. Non penitus tamen verum vidit, *Harveio* reservatum. Nam sanguinis exundationem ad superiora, & retrocessum ad inferiora, ad Euri-

*l* Venam cavam sanguinem cordi sinistro adferre de *divinitatione* p. 245.  
 cordi dextro dare (quæ vulgaris scholarum doctrina fuit) *m* *Quæst. Peripatet.* L. V.  
 & venam pulmonalem aerem c. 4.  
*n* *Quæst. Medic.* 17. L. II.

pi modum statuit, qui in vigilia & somno adpareat o, ut omnino videatur, acutissimum virum directionem veram sanguinis venosi perspexisse, non tamen ideo pari felicitate intellexisse, quomodo sanguis ex minimis arteriis in venas transeat.

§. XXIX. *Non est inventum Pauli Sarpi.*

In *Paulum Sarpi*, celebrem ex suis pro tuenda patriæ libertate editis scriptis, & susceptis periculis, monachum, varii scriptores laudem inventi circuitus contulerunt, cum certatim fere hominem quærerent, in quem honores *Harveio* ereptos transferrent. *Johannes* equidem *Veslingius* p codicem manu ejus viri scriptum citat, quem apud *P. Fulgentium*, discipulum, vitæque *Sarpianæ* scriptorem viderit. Deinde *Johannes Walæus*, strenuus cæterum novi inventi stator, non quidem in prima epistolæ suæ editione, sed in nuperioribus q editionibus, ab aliis ut videtur edoctus, ante *Harveium* circuitum sanguinis *Sarpio* notum fuisse scripsit; tum *Johannes Nicolaus Pechlin*, aut ipse forte larvati operis r verior auctor *Carolus Drelincourtius*, qui historiolum addidit, quomodo Veneti monachi inventum ad *Harveium* pervenerit.

o Ibid. p. 234.

p Apud *Bartholinum Centur.*  
I. Epist. 26.

q Apud *Barthol. in anat.*  
tert. renovat. Ep. I. p. 774.  
r *Metamorphosis Apollinis &*  
*Æsculapii.* p. 76.



Exstat autem *Georgii Ent* s apologia, qui rei gestæ historiam invertit, & *Sarpium* per legatum Venetum *Harveii* librum ab ejus auctore habuisse adfirmat. Et temporum equidem ratio hanc apologiam fert, si quidem omnino anno 1619. in chirurgica prælectione *Harveius* verum sanguinis iter proposuit s\*; eodemque anno legatus Venetus patriam repetiit, & quatuor demum annis elapsis Frater *Paulus* anno 1623. obiit.

Verum dudum meruit *Harveius*, ut ipse summus ejus adversarius *Riolanus* t veri causam ageret, atque ostenderet, certe *Sarpii* non esse, quod *Harveius* invenisse gloriaretur. Deinde nihil quidquam proferunt v monachi illius, aliis meritis illustris, laudatores, cur aliena adeo a suis gravissimis officiis studia excoluerit, neque experimenta citant, per quæ vir politicus ad reconditam illam, perque solam anatomen eruendam, sanguinis viam detegendam pervenisse potuerit. Denique vitæ *Sarpiæ* auctor, idemque boni senis discipulus P. *Fulgentius*, de valvulis quidem scripsit, quas *Sarpus* invenerit, de circulatione filet, ipsisque valvulis, alienæ cæterum industriæ fructibus, omnino non veram utilitatem a *Sarpio* adsignatam addit x.

s In dedicatione apologiæ suæ p. 613.  
pro circulat. sang.

s\* Rob. Taylor. Orat. anniv. in Conf. *Hyacinthus Ginnæ*  
*Harveii*. p. 44. in Italia licerata. p. 696.

t Animadvers. in *Walæum*. x G. Charleton three lectu-  
res. p. 24.

*Helfricus Dietericus* ipse quidem sibi testis est, se anno 1622. *Casparo Hofmanno* suam de circulatione sanguinis sententiam aperuisse, frigidum autem docti viri joco abstergitum rem deseruisse *y*. Nihil autem iste quidem vir præstitit, cur tantum inventum ab eo expectemus.

§. XXX. *Neque aliorum nuperorum.*

Ita neque *Thomas Harriot*, ex algebrae cognitione, & sua regula celebris, quidquam aut scripsit *z*, aut molitus est, cur *Lindenio a* credamus, qui novi inventi laudem ipsi tribuere mavult, testemque citat, qui ex *Harveio* audiverit, occasionem inquirendi se ab *Harrioto* accepisse.

*Honoratus Fabri*, alterius ordinis monachus, ferrea fronte sibi ipsi *Harveii* inventum vindicavit *b*, quod in dissertatione nescio qua anno 1638. exposuerit, quo tempore liber *Harveii* non prodiiisset. Verum iste liber non anno 1639. sed anno 1628. prodierat. Neque *Petrum Laurembergium* proprio Marte circuitum sanguinis detexisse quisquam crediderit, etsi is quidem vir absque ullius auctoris citato nomine illustre inventum descripsit *c*.

*y* In vindiciis adversus *Tachenium*.

*z* *Wotton* l. c. p. 251.

*a* *Hippocrates* de circulatione sanguinis. n. 196.

*b* De homine L. I. Propos.

2. p. 204.

*c* In collegio anatomico edito

anno 1636.



§. XXXI. *Neque Sinensium aut Persarum.*

Alii scriptores, alieno certe loco arguti, in remotam gentem rem eruditæ Græciæ ignoratam transtulerunt. Sinenses *d* quidem nescio quem monstruosum sanguinis motum adeo fabulose describunt, ut ex mera imaginatione desumptum esse continuo manifestum sit. Ab anatome alioquin alieni sunt, ut ab omni alio mortalium genere potius ejusmodi, non in aprico certe positam corporis animati functionem, expectes.

Mirum est, quod nuper in litteris suis doctissimis medicus *Franciscus Thierry* mihi aperuit, & ego quidem evolutis scriptis *Chardini* e omnino ita se habere reperi. Persæ medici sibi dudum notum sanguinis circuitum coram eo, cauto satis viro, gloriati sunt: ab omnibus enim suis graviorum *casuum* indicibus impura vocari animalia, quæ circulantem sanguinem nacta non sint, & discrimen fieri inter ea, quibus circulum obit, & alia, infecta imprimis, quibus cruor absque eo circuitu est *f*. Verum cum Persæ Arabes omnino medicos legant & sequantur, hi vero sua fere omnia ex Græcis

*d* Cleyer *Spec. Med. Sinic.* p. 84. &c.

*e* In *itinerum*. T. V. p. 292. ed. *Paris*. 1723.

*f* Ibid. T. VII. p. 226. Ea verba cum tota theologia Persica sumta sunt ex compendio, tempore Regis *Abbas* edito,

*Harveio* quidem coævi, sed adeo exigua temporis distantia ab eo remoti, qua ne in Europa quidem nova veritas satis aut nota fuit aut recepta, in remotissimis vero gentibus *Harveii* libros lectos fuisse, non probabile videtur.

habuerint, Græcis denique is circuitus non notus fuerit, multo minus credibile est, in superiori Asia, inque tanto omnium bonarum artium languore, & cadaverum horrore, tantum inventum nasci potuisse. Et crediderim, insectorum argumento, longe simplicius ea animalia pro impuris haberi, quibus ruber sanguis non sit, qui per vasa moveatur, & voce *circumire* unice sanguinis fluentum significari.

§. XXXII. *Sed Harveii.*

Præterea æquo animo oportet expendisse, non eum verum inventorem esse, cui vaga aliqua cogitatio elapsa est, in nullo fundata experimento, sed eum omnino eam laudem mereri, qui verum ex suis fontibus per sua pericula, suasque meditationes eruerit, & adeo firmis rationibus stabiliverit, ut veri cupidos convincant. Ex ea certe definitione, recte a *Pitcarnio* g & ornate proposita, adparet, non *Cesalpino* ob paucas aliquas & obscuri sensus voces, sed *Harveio*, numerosissimorum experimentorum laborioso auctori, gravique scriptori argumentorum omnium, quæ eo ævo proferri poterant, immortalem gloriam inventi circuitus sanguinis deberi. Valdeque laudo *Richardii Meadii* liberalitatem, qui bustum magni viri in schola medica Londinensi dedicavit.

---

g In progr. de inventoribus.



§. XXXIII. *Objectiones aliquæ.*

Supereſt, ut aliquas, nondum everſas objectiones nominemus, quæ magno viro obpoſitæ fuerunt, & ex prioribus facile refutantur. Cum enim totam ſcholarum doctrinam funditus nova circuitus theoria ſubrueret, omniaque illa ubique recepta venarum in morbis ſecundarum discrimina ſupervacua redderet, infinita vis fuit hominum, quos aut præjudicata opinio, aut demum invidia in *Harveium* armavit, aut malus pudor vetuit deferere, quæ & juniores didicerant, & ſenes tunc maxime docebant.

Et *Johannes* quidem *Riolanus* eo ſeculo anatomicorum, & aliorum judicio, & inprimis ſuo princeps, aſpernatus *Harveii* modeltiam, multis libellis naſcenti lumini reſtitit. Cum vero vim veri omnino, qua erat perſpicacia, non poſſet non ſentire, ne tamen alienæ induſtriæ laudator fieret, neque opiniones aliquas veterum defereret, partem aliquam circulationis *Harveianæ* recepit, aliam vero de ſuo reformavit, ut *Riolanea* *b* audire poſſet. Ergo ſanguinem in vena portarum abſque circuitu manere ſcripſit, neque ad cor redire, & omiſſis per pulmonem ambagibus, ſanguinem venæ cavæ ex dextro ventriculo per ſepti cordis poros in ſiniſtrum duxit, denique cele-

---

*b* *Nova doctrina de motu circulatorio in corde.* Pariſ. 1649. fol. Lond. 1659. 4.

ritatem illam, quæ Galenicos medicos in vertiginem rapiebat, magna portione diminuit. Tota res cum docto senex sepulta est.

*Caspar Hofmannus* verum contempsit, idemque jam senex exiguo, neque profunda vulnera inferente, scripto refutavit *i*. *Frigida* etiam *Olai Wormii i\** & priora *Conringii i\*\** de circuitu sanguinis invento judicia fuerunt. *Montpelienfes* adeo a vero admittendo alienos se præbuerunt, ut ob suam *Harveio* præstitam fidem *T. Bartholinus i\*\*\** in ea schola magna odia passus sit.

*Fortunius Licetus*, non quidem ille per cædes anatomicus, ut in partem gloriæ *Harveianæ* serio veniret, & ipse proprium circuitum descripsit, ut sanguis quidem nutritius, more veterum, per venas ad extremos fines ferretur, ibi portio necessaria in alimentum vertetur, reliquum ad cor rediret: idemque omnino in spiritu vitali per arterias iter, fluxusque locum haberet & refluxus *k*.

Ultimus hostium novi circuitus Patavii superfuit *l*, *Homobonus Pisoni*, non incelebris clinicus, neque veri absque ingenio adversarius, audax cum *Morgagnio m* ad certamen experimentorum descendere. Ergo argumenta

*i Digressio de circulatione Bartholinum. sanguinis. Paris. 1652. 12.*

*i\** 444. 445. & anno 1645. p. 694.

*i\*\** Ap. *Worm.* p. 444. 445.

*i\*\*\** Ap. *Worm.* p. 672.

*k* In Epist. 37, *Centur. I.* ad

*l* In *Ultione antiquitatis*, quæ *Cremae* ann. 1690. 8. prodit, & in *disquisitione de circuitu sanguinis. Patavii 1726.*

4. excusa.

*m* *Disquit.* p. 417. seqq.



sua repetiit, a paucitate sanguinis, qui in nonnullis corporibus humanis omnino non responderit summæ celeritati, quam *Harveii* sententia *n* poscit. Deinde nullam nutritionis explanationem superesse objecit, si absque medio sanguinem ex arteriis in venas traduci ponatur *o*. Sanguinem ex eadem vena in diversa vasa receptum, diverso colore fuisse, neque adeo ab una vena in omnes sanguinem circumire, neque sanguinem ex unica vena venisse *p*, idem addidit. Diversa venena modo celerius occidere suamque efficaciam exferere monuit, modo tardius, cum æque velocem effectum expectare fas sit, si æque velociter omnes in eodem vase humores circumferrentur *q*. Magnum in deliquio animi pulsus superesse *r*. Varicum phænomena ex *Harveii* sententia non posse exponi, nullam enim rationem dari, quare valvularum sinus, qui versus cor apertus sit, a sanguine collecto, & ab artubus redeunte, repleatur: facillime vero intelligi, si sanguis, cum totius antiquitatis consensu, a corde per venas versus extremos fines fluxerit, qui manifesto, dum in valvularum sinus nititur, sibi viam claudat *s*.

Addebat, nimis pauca experimenta in re gravissima facta esse, & a *Pecqueto* quidem in

*n* Ibid. c. 1.

*o* Ibid. c. 2.

*p* c. 4.

*q* Ib.

*r* Eod. capite & in *Ult. Antig.*

*s* Eod. capite.

unico cane *t*: lac denique, uti diximus, venæ hominis injectum facile quidem ad digitos descendisse, fursum versus cor redire recusasse *v*.

*Schillingius* per venas non obstantibus valvulis ad extremos fines sanguinem fluere non dudum docuit *x*: sed quæ is quidem vir, aut *Eccardus Leichner* *y* objecit, aut *Raymundus Restaurand* *z*, aut *Leiserus* minatus est *a*, ea quidem vix repeti merentur.

#### §. XXXIV. *Nuperi adversarii.*

Quæ nuper in Gallia se extulit secta semistahlianorum, qui rebus humanis *Principium Vitale* sive archæum præfixit ut in universum anatomen & experimenta parvi facit, ita in circuitum *Harveianum* cum acerbitate invecata est, cujus causam non datur divinare. Utuntur contra nobile inventum meis & *Spalanzani* experimentis, non factis ut *Harveio* noceremus, & per quæ id solum evincitur, sub mortis atriola, certisque in vitæ humanæ conditionibus, sanguinem retroire, & per arterias versus cor relabi, perque venas nonnunquam ad sedem pertusi vasis contra ductum circuitus

*t* *Disquisit.* pag. 428. Non bene certe, cum tot experimenta existent, *Harveii*, *Walleri*, *Drelincourtii*.

*v* *Supra.* p. 398.

*x* In disput. Basileæ anno 1679. defensa.

*y* *De motu sanguinis exercitatio antiharveiana.* Arnstad. 1647.

*z* *Zod. Med. Gall.* P. V.

*a* In primis lineis systematis novi medici Argentor 1722. Conf. nonnullos alios in *Meth. Stud. Med.* citatos.



confluere. Oportebat veri amantes agnoscere, & *Spalanzanum* & me directe, nostris oculis, diversos modos vidisse, quibus sanguis ex arteriis in venas transeat, & contrario ductu ad cor revehatur. Deinde isti contemptores testimoniorum, quibus sensus vero subveniunt, nullum proprium periculum adferunt, quod quidquam de *Harveii* affirmationibus detrahat. *Henricus Fouquet* demum potissimum contra demonstratum verum insurrexit *a\** & qui nuper obiit *Theophilus Borden a\*\**.

#### §. XXXV. *Veri Defensores.*

Non defuerunt ideo candidi verique amantes viri, qui novo lumini oculos grati aperuerunt, suamque operam propagando vero mutuarunt. Belgæ primi fere in *Harveii* partes transierunt, & princeps *Johannes Walæus b*, qui post aliqua sua dubia egregiis & numerosis experimentis id inventum stabilivit, alter ab *Harveio* stator; tum collega viri *Franciscus Sylvius de le Boe c*. Deinde *Vopiscus Fortunatus Plempius* adversarius veri *d*, inde dubius *e*, tandem advocatus *f* fuit.

In

---

*a\** In decem prælectionib. me, & sæpe recusis.  
*Monspeli* 1777. 8. & duodecim quæstionibus ib. 1776. *c* *Disput. med.* V. n. 15.  
*a\*\** Passim per sua opera. *d* In I editione *Fundamentorum Medicinæ*. anni 1638. p. 203. 204.  
*b* In *Epistolis de motu chyli & sanguinis* anno 1641. *Leidæ* *e* Apud *Beverwyck de calculo*. p. 209.  
*editis*, cum *Bartholini anatomo-*

In Gallia *Cartesius g* (qui in Belgio fere vixit) inter primos auctoritate sua circuitum sanguinis confirmavit, quæ eo seculo summa fuit, experimentis vero defendit *Johannes Pecquet h*.

Germania continuo *Harveio* favit, alioquin, in multo minus probabili occasione, exterorum imitatrix. *Rolfinkius i*, eruditus omnino homo, & doctissimus *Conringius*, deinde *Thomas Bartholinus*, Danus, post levia dubia *k*, cum tota cohorte in castra *Harveii* transierunt. In Italia minabatur nescio quid *Harveio* contrarium *Marcus Aurelius Severinus l*, si vita superfuisset. Inde *Johannes Trullus m* in primis, verum recepit, & *Malpighius*.

Nunc, nisi barbari aliqui adversarii ignorati latent, ab omnibus medicis & physicis circuitus iste major pro dogmate demonstrato habetur, quod pro postulato haberi possit.

*f* In altera editione *Fundamentorum* anni 1644. p. 113. 115.

*g* Lib. de homine: de formatione fetus: de passionibus animi.

*h* In experimentis anatomici. Paris. 1654. 4.

*i* Apud *Schenk* de schola

part. p. 57. jam anno 1642.

*k* Centur. I. Epist. 66.

*l* In Epist. VII. de quidditate lymphæ *Bartholinianæ* ad *Segetum*. Tuetur tamen *Harveium* in epist. 31. Cent. I. *Bartholini*.

*m* Apud *Jacobum Sinibaldum* in *geneanthropia* p. 527.



## S E C T I O IV.

## L Y M P H Æ I T E R.

§. I. *Tendit a minimis ad thoracicum ductum.*

**S**UPEREST, ut etiam eorum humorum, qui sanguine tenuiores sunt, circuitum exponamus: nisi enim inutiles humores fuerint, qui omnino de corpore animato ejiciuntur, necesse est, id omne ad communem humorum massam redire, quod de officio proprio cujusque liquoris superest, neque quidquam video, cur in solo sanguine circuitum admittamus *n.* Cum vero præter venas illas valvulosas pellucidas paucissimæ aliæ notæ sint, omnino de istis lymphaticis vasculis dicendum est.

A primis eorum vasorum temporibus fere omnes anatomici in vero lymphæ itinere consenserunt: ut nempe ab universo corporis ambitu, aque minimis ramulis pellucidis, lymphæ undique in majora vasa lymphatica, & in eorum truncos, & denique in ductum thoracicum confluat, præter ea vasa aquosa, quæ nondum satis certo in venas rubras aliis locis se inmittunt *o.* Atque adeo lymphæ cum sanguine per ar-

*n* Ita *M. Lister de humoribus*  
c. 25. Rectius dudum *Pech-*  
*linus*, tot esse circulos in cor-

pore humano, quot succorum  
discrimina sunt *de corde*, n. 24.

*o* L. II. p. 334.

*Lanswert II. p. 7.*

terias in omnes corporis partes delata, in venulas valvulosas transit *p*, ejusque maxima portio in venas denique rubras, inque cor ipsum redditur. Aliquid enim exhalasse, aliquid in gluten nutritium abiisse, alibi probabile reddetur.

## §. II. *Ostendum vincula.*

Ita dudum ex fabrica valvularum lymphaticarum edoctus *Rudbekius q* sensit, ita ex vinculis, quæ vasis pellucidis injiciebat, *Thomas Bartholinus*. Constantissime enim videbat, hæc vascula in quacunque demum corporis animalis fede, vinculo intercepta, inter minutissimas radículas, & vinculum intumescere, contra inaniri inter id vinculum & ductum thoracicum, aut certe inter linum, & venas rubras, in quas dicuntur se inmittere. Perinde adeo, uti de sanguine dictum est, ex his experimentis sequebatur, pellucidum humorem ab omni corporis ambitu in thoracicum truncum confluere, atque a vinculo impeditum, minores radículas, unde advenit, distendere. Hæc experimenta a *Bartholino r*, a *Rudbekio s*, & a *Johanne van Horne t* facta sunt, & iste quidem

*p* L. II. p. 310. seqq.

*q* *Insid. struct. vas. aquosis* &c.

*Rudbeck. p. 128.*

*r* *Lymphatic. brutor. p. 46.*

*Lact. thoracic. c. 6. p. 31. &c.*

*Was lymph in homine c. 5.*

*s* *De vasis serosis c. I. 10.*

*t* *Apud Sorgeloos Oecon.*

*anim. Thes. 54. & apud Syl-*

*vium diss. 8. n. 20, 21.*



primus, paucis a morte horis, vinctis artubus & scroto, in juvenis cadavere nova vascula ostendit. Sed etiam *Nicolaus Stenonis filius v*, *Franciscus Sylvius x*, *Carolus Drelincourtius y* aliique clari viri *z*, & nuper *G. Hewson* hæc experimenta repetierunt, & ipse imitatus ea vera comperi. Non alio artificio primi inventores utebantur, ut in bestiis vasa pellucida ostenderent *a*. Hinc ductu thoracico ligato ex *Rudbekii* consilio *b*, optime demonstrantur *b\**, cum novus humor ad communem sibi venam confluens, a vinculo sistatur, suaque vasa distendat: & venis demum rubris ligatis *c*, ut jugularibus, & portarum imprimis trunco, vicina vasa aquosa intumescunt, sive circa eam sedem inserta sint, sive, quod mihi magis probabile fit, eodem cum venis rubris vinculo etiam pellucidæ venæ comprehendantur. Demum in diuturno mœrore,

*v* In *Epist.* 26. *Centur.* IV. ad *Bartholinum*.

*x* I. c.

*y* *Canicid.* XI.

*z* *Thomas Warthon* I. c. p. 98. *Samuel Collins* (in *hepate*) *System. of anat.* p. 440. 441. *Gualtherus Needham* de formato fetu c. 1. *Isbrand v.*

*Diemerbroeck anat.* L. I. c. 13. *Theodorus Kerkring spicileg.* obs. 91. *Philip. Verheyen.* L. I. *Tract.* 2. c. 13. *J. Henr. Pauli anat. Bilspan.* anat. c. 7. *C. Bartholin.* de diaphragm. p. 90.

*a* *Rudbek, Drelincourt, J. H. Pauli, C. Bartholinus* I. c.

*b* Apud *Hemsterbuys* c. 5.

*b\** Experimenta numerosissima facta sunt a *Nicolao Stenonis* f. I. c. *Epist.* 24. *Cent.* III. a *Casparo Bartholino* nepote de diaphr. p. 90. a *J. Henrico Pauli* I. c. c. 7. p. 79. tum a *Godofredo Bibloo* in exercit. de hydatid. p. 10.

*c* Experimenta sunt *T. Bartholini* lymphatic. brut. p. 46. *Friderici Ruysch* de valvul. vasor lymph. c. 3. p. 12. *Johannis Zelleri* de administrat. vasor. lymph. c. 1. *Raymundi Vienssens* traité des liqueurs p. 252. *Reinholdi Wagner* in *Nov. litter. Mar. Balth.* 1700. p. 271. *J. Christophori Bohli* I. c. p. 45.

qui humorum motum retardat, vasa lymphatica turgida & coacta lymphæ plena visa sunt c\*.

§. III. *Valvule.*

Major tamen certitudo veriori sententiæ accessit, postquam valvulas vasorum lymphaticorum Swammerdamius d, deinde Fridericus Ruysch e evidentius constituit. Tunc enim adparuit, ut omnino eadem earum fabrica est, quæ valvularum in venis rubris positarum, ita eandem etiam functionem esse. Nempe earum sinus versus ductum thoracicum & cor aperti sunt, dorso convexa ad minimas radículas vasorum lymphaticorum obvertuntur f. Ergo lymphæ ab iis radiculis adveniens, inter convexa ea vela viam sibi facit, atque ea contra parietes venarum pellucidarum adprimit, ut sinus evanescant, totumque lumen lymphæ redeunti pateat. Contra, quando lymphæ a sede cordis aut thoracici ductus relabitur, tunc ea utique in apertos valvularum sinus subit, eos, qui cæci sunt, replet, distendit, cogit in caveam vasis eminere, claudit eam caveam, viamque sibi ipsi relapsuræ obturat.

c\* *Mem. présentés.* IV. pag. 192. 193.

d Vide L. II. p. 307. seqq. Anno nempe 1664. Salmurii experimenta fecit, quæ cum Blasio communicavit de respir. p. 90.

e In toto libello, cui titulus est *dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis* p. I. 2. 9. Primum hoc, & ni fallor optimum, est inter scripta Ruyschii.

f L. II. p. 307.



Quare eam viam facile aër inmissus legit, & per lymphatica ad cor usque venit g. Et mesenterio compresso, deinde post aliquod tempus iterum liberato, lymphæ confestim in ductum thoracicum confluit h.

§. IV. *Non semper fide custodes.*

Iterum autem nequit dissimulari, non adeo constantem harum valvularum custodiam esse, quin cedant nonnunquam, & lympham, aut certe impulsam aërem, sebum, & argentum vivum ad minores radículas sinunt relabi, uti quidem sæpe vasa lymphatica pulmonis, glandularum oesophagearum, lumbalium, & abdominis per ductum thoracicum me replevisse memini, & ante me idem experimentum a Cowpero factum fuisse lego a. Cæterum ejusmodi lymphæ aërisve relapsus dudum Nicolaus Stenonius b alique Clari viri c viderunt. Et inprimis Antonius de Marchettis d inflato chyli receptaculo omnia in toto corpore animalis pellucida vascula aëre distendit. In cubiti vasis, quo loco quodque suo trunco inferitur, valvulam esse iter retrogradum morantem, sub ea longe viam versus digitos liberum patere lego.

g T. Bartholinus *lymphat. brutor.* p. 46.

h Bohlius l. c.

a Ad Bidloi tabulam 21.

b Epist. 24. Centur. III. Barthol. & in tr. de glandulis oris ad fin.

c Jacobus Keil in *compend. anat.* p. 120. Bloemesteyn de *admin. anatom.*

d Apud Henricum v. Moischen in *Epistolis Bartholinianis* Centur. II. p. 590.

In lymphaticis pectoris vasis passim hydrargyrum contrarium legitimæ viam sequi *Mekelius*. De lymphaticis vasis similia *Monrous* junior habet, & passim *G. Hewson*.

Hæc quidem valvularum laxitas potissima *Bilfsio* errandi causa fuit, cæterum non tanta est, ut in errorem ducat. Nam impulsus sebum, aut argentum vivum, etsi unam alteramve valvularum conjugationem fallit quasi, & latenter viam naturæ contrariam describit, vix unquam tamen longe subit, aut ad minima vascula penetrat; multiplicata enim valvularum juga e numero suo paulatim errantem directionem impulsus humoris frangunt, donec nihil ultra relabatur. Ita vidi, & magni ante me viri viderunt *f*. Deinde omnino hic valent, quæ monui de valvulis venarum rabrarum in vivo, pleno, undique compresso corpore rectius officio fungentibus, quam in laxo, molli, diductoque cadavere possint *g*.

#### §. V. Contraria *Bilfsii* opinio.

In hoc ergo lymphæ venoso motu omnes anatomici consentiunt, semperque consenserunt, ut solus *Ludovicus de Bils* contrariam sententiam proposuerit. Vir nobilis fuit, & oppidi Ardenburgi prætor, miro cæterum amore ana-

*e Clifton Wintringham* pag. 227. *J. Henricus Pauli* l. c. ad fin. cap.

*f Lower in vindicatione pyretologiæ Willisianæ* pag. 53. *g p. 206.*



tomes captus, neque rudis profector, qui viva animalia absque sanguinis effusione inciderit *b*, & humana cadavera, supra ejus seculi certe solertiam *i*, conservare noverit; cui, minus alioquin æquus, *Johannes van Horne* tantum tribuerit, ut balsami *Bilsiani* arcanam scriptionem concupiret *k*, & argentea suppellectile peculiare viri encheireses redemptas vellet *l*. Cum iis dotibus idem literas non conjunxit *m*, qui proculdubio ipsi potissimus fons errorum fuit & pertinaciæ.

Ergo *Bilsius* docuit *n*, ex receptaculo chyli, tanquam ex corde, vasorum rorem vehementium, quem alii chylum dicunt, furculos ad totum corpus prodire; eorum aliquos ad pulmones spargi, alios ad pericardium tendere, succumque ei sacco proprium parare. Præcipuum ramum, sive thoracicum ductum, in labyrinthum contorqueri, quem descripsit & depinxit *o*, circa jugularem & axillarem venam positum, ex quo ramus in venam cavam se aperiat, fermentum

*b* *Bils* gebruyk van de Gylbuys p. II. ubi testimonium adjectum est.

*i* Vendidit ea 22000 florenis Academiæ Lovaniensi in epist. ad *T. Andr.*

*k* *J. v. Horne* waarschoowing p. 31.

*l* Ibid. p. 14.

*m* Vix norat partium nomina *Craanen de homine* p. 119.

*n* In epistolica dissertatione qua verus hepatis circa chylum (quem a rore distinguebat)

& pariter ductus chyli ferri hactenus dicti usus demonstratur, & in belgico tractatu (neque enim latinas literas docius erat) *van de gebruyk der Gylbuys*.

*o* In cane, cujus unica icon millies recusa exstat, ut in libello *vant gebruyk vande Gylbuys*: & in Kort bericht over der waarschoowinge van *J. v. Horne*, tum in opusculis latine redditis.

tum præbeat. Alios ramos ad caput adscendere volebat, inque salivæ sputique glandulas.

Lites inde plurimæ inter belgicos incisores natæ sunt. Fuerunt, qui hepatis caucam acturi, *Bilsum*que secuti, motum lymphæ inverterent, ut a communi illo corde per vasa pellucida ad omnes corporis animalis partes dideretur. Ita *Deusingius* *p* sensit, & *Nicolaus Zasius* *q*, & *Everardus* *r*, qui omnino vasa lactea ad omnes partes corporis animalis inque ipsum uterum, & ad mammas, succum suum deferre scripsit, etiam experimento citato.

Contra pro recepta opinione stabant solertissimi ejus seculi anatomici *Bartholinus* *s*, *J. van Horne* *t*, *Nicolaus Stenonis* *f*. *v*, *Job. Swammerdam*, & nascentis famæ professor *Fredericus Ruysch* *x*, cui devicti erroris præcipua gloria debetur: tum alii minus nunc celebres viri *y*.

Cum urgeretur experimentis, vinculis, valvulisque *z*, neque in certamen descendere su-

*p* In vindiciis hepatis redi-vivi: in epistola de admiranda anatome *Bilsi*: in examine anatomæ *Bilsi* anatomæ &c.

*q* *Bilsum* defendit in libello *Den daau der dieren en de wellen des waters*.

*r* In vero animalium exortu *p*. 15.

*s* In epistola de experimentis *Bilsi*: in *Nicolai Stephani* castigatione epistolæ maledicæ *Bilsi*, & in responsione ad novas observationes *Bilsi*anas.

*t* In waarschouwing aan alle liefhebbers der anatomie.

*v* In epist. *Bartholin.* 76. Cent. IV. inque libello de glandulis oris ad fin.

*x* l. c. p. 4.

*y* *Paulus Barbette* in aanmerkingen over de schriften van *L. de Bils* *J. Henriens Pauli* in egregia certe anatomæ *Bilsi* anatomæ.

*z* Quas ipsi *Bilsi* *Ruyschius* demonstravit.



stineret *Bilsius a*, sententiam mutavit, veramque lympham nunc voluit per cellulosam telam (*mosch*) inter duas membranas vasorum lymphaticorum moveri, & itinere sibi soli noto defungi. Per medium vero valvulosumque eorundem vasorum tubulum fermentum fluere finxit, quod per recepta experimenta sursum ad venas jugulares tenderet. Addebat chylum dividi, ut partim per *muscum* illum ad alendas partes feratur, partim per vasa fermentifera in sanguinem veniat *b*.

Inclinatam causam mors auctoris penitus perdidit: & labyrinthum illum ex vasis lymphaticis in ductum thoracicum vicinasque venas axillares insertis effici, industria *Stenonii c\** *Paulique c* ostendit.

#### §. VI. Et adfines errores.

In alio errore, affini quidem, non immorabor, quo olim & nuper communicatio non satis vero inter ductus excretorios & vasa lymphatica admissa est: ita, sed anno 1657. nondum his rebus in plenum lumen constitutis, *Bartholinus* ductum salivalem maxillarem pro vase lymphatico habuit *d*: neque ab eo errore aut *Deusignius e* immunis fuit, aut nuper *Georgius Daniel*

*a* A variis oblatum, ut a *Ruy-dreæ p. 6. 7. 8.*

*schio, Moinichenio apud Bar-*

*tholinum in respons ad Ep.*

*Bils. Houfrenio apud J. v.*

*Horæ l. c. p. 2224.*

*b* In *Epist. ad Tobiam An-*

*c\** l. c.

*c* De gland. oris. p. 39.

*d* Centur. II. hist. 48.

*e* *Vindiciæ hepatis rediivi*

*p. 24.*

*Coschwitz f*, qui vel ex lymphâ falivam nasci, vel in falivales ductus lymphatica vasa inmitti scripserunt. Hujusmodi circuitum anatome non confirmat, neque lymphatica vasa in ductus excretorios aperiuntur, lymphamque eo deponunt, de circuitu sanguineo exituram, neque vicissim a ductibus excretoriis, certe per adeo manifestos ramos, aquam revehendâ recipiunt. Etsi aliqua, per arterias, ut puto, vasis serosis cum excretoriis ductibus conjunctio est *f*\*.

#### §. VII. *Venæ minores.*

In venis minimis, neque sanguinem vehentibus *g*, experimenta nulla facta sunt, cæterum ipsa analogia docet, & rationes supra recensæ confirmant *h*, eandem ipsis, quæ reliquis venis est, naturam esse. Nam, si quidem arteriosa & venosa vasa humorem vitreum lentemque crystallinam adeunt, & si arteriarum officium est, humorem advehere, venarum functionem esse necesse est, revehere ejus partem, quæ a dissipatione & nutritione superest. Id ni fieret, in inmensum eas arteriolas intumescere oporteret. Vaporis ex caveis corporis humani reditus in venas rubras suo loco per experimenta ostensus est *i*.

*f* In descriptione ductus salivæ p. 19. 20.

*f*\* p. 310.

*g* L. II. Sect. 2 p. 290.

*h* Ibid.

*i* p. 281. seqq.





# INDEX

T O M I P R I M I

DE PRÆCIPUARUM

CORPOR. HUMANI PARTIUM

FUNCTIONIBUS.

LIB. I. CORPORIS HUMANI ELEMENTA.

SECTION I.

FIBRÆ.

FIBRA minima	Pag. 3
Ejus partes. Terra	5
Ferrum	7
Gluten	8
Aër	12
Fibra conspicua	15
Lamina	18

SECTION II.

CELLULOSA TELA.

Inventores	19
Loci quos occupat	21
Omnes cellulæ in se patent mutuo	25

Easque permeat aër	<i>ib. seqq.</i>
Unde emphysema	28
Permeant etiam aqua	29, 30
Et pus	<i>ibid.</i>
Et illapsa sub cutem corpora varia	31
Ejus textus propagines	33
Utilitas. Firmare omnia	36
Figuras definire	38
Non sentit	39

## S E C T I O I I I.

## M E M B R A N Æ.

Cellulosa tela membranas efficit	40
Experimenta, quibus id <i>Auctor</i> ostendit	41 <i>seqq.</i>
Qui cum eo sentiant	47 <i>seqq.</i>
Opinio de membranis Boerhaaviana	49
Expenditur	50 <i>seqq.</i>

## S E C T I O I V.

## A D E P S.

Cellulosa tela, quæ adipe destituitur	51
Vapor eas cellulas replet	52
Et aqua	53
Adipis initia	55
Ubi nullus reperiatur	56
Ubi plurimus	57
Adeps fluidus est	58
In cornigeris durior	60
Volatilis idem	62
Adipis analysi chemica	63 <i>seqq.</i>
Acida ejus natura	<i>ibid.</i>
Loculi adipis	68
Glandulæ & ductus proprii rejiciuntur	69
Exsudatio adipis	72
Sanguinis sudor in cellulas	75 <i>seqq.</i>



Adeps in sanguine	Pag. 78
Congeritur per quietem	78 <i>seqq.</i>
Et debilitatem	81
Resorbetur a venis	82
Experimenta, quibus ostenditur resorberi	82 <i>seqq.</i>
Causa resorbtionis. Motus major.	83, 84
Morbi	85
Alimentorum indoles.	88
Inedia	<i>ib.</i> <i>seqq.</i>
Adipi lymphæ succedit	89
Utilitas adipis. Mobilitatem præstare	90
Impedire coalitum	91 <i>seqq.</i>
A frigore defendere	95
Num resorbtus alat	96 <i>seqq.</i>
Medullæ ossium utilitas	97 <i>seqq.</i>
Adipis nimii exempla	101
Et noxæ	102

## L I B. I I. V A S A.

## S E C T I O I.

## A R T E R I Æ.

1. <del>A</del> R T E R I Æ in universum.	105
Animalia in quibus reperiuntur	106
Dubia num animalculis simplicibus sua vasa sint	107
Nominis origo	108
2. Sectio circularis est	111
3. Quomodo conicæ dicantur	112 <i>seqq.</i>
decrefcunt ob majores ramos inde natos	<i>ibid.</i>
alioquin cylindricæ manent	113
aut omnino eundo latefcunt	115
arteriæ capillares cylindricæ funt	117
4. Color arteriarum	<i>ibid.</i>
5. Membrana externa non perpetua	118
Cellulosa accessoria	<i>seqq.</i>
Eadem laxior five vagina arteriofa	120

Vasculosa & glandulosa membrana sunt cellulosa cognomina	Pag. 121, 122
6. Cellulosa propria, princeps arteriæ tunica	122
7. Musculosa.	124
Ejus fibræ	125
Earum habitus ad ramos	126
Fibræ longitudinem sequentes nullæ	<i>ibid.</i>
8. Cellulosa interior	127
9. Tunica intima	128
10. Arteriarum cavitas	129
Arcus	129
Ad ramorum originem	129, 140
11. Arteriolæ arteriarum	131
Non omnes ex aorta natæ	132
Venulæ	134
12. Nervi, nondum certo visi	<i>ibid. seqq.</i>
Arteriæ insensiles sunt	135
13. Vir contractilis	136
Elastica	<i>ibid. seqq.</i>
Nimii ne fiat, monetur	138
Venena nihil demonstrant	140
Vis musculosa arteriæ	141
14. Robur arteriarum	141 <i>seqq.</i>
Experimenta Cl. <i>Wintringham</i>	142
Rami truncis robustiores sunt	143
15. Ratio solidi ad fluidum	146
in ramis minor est	147
16. Arteriarum locus	148
17. Numerus divisionum	150
Vix sunt supra viginti	150, 151
18. Lumen trunci minus est luminibus conjunctis ra- morum	151
Inventor theorematis <i>Guil. Cole</i>	<i>ibid.</i>
Mensuræ <i>Keilii</i> , <i>Helvetii</i>	152, 152
<i>Martinii</i> , <i>Nichollsi</i>	155
<i>Senaci</i>	157
<i>Auctoris</i>	157
19. Anguli ramorum cum truncis	159
plerique acuti sunt	160



Lege & ordine certo carent	Pag. 162
20. Flexiones. Aliæ arteriis plenis fere communes	163
aliæ ob mutabilem partis, quam adeunt, longitudi-	
nem, natæ	165
Anfractus majorum arteriarum	167
21. Anastomoses	<i>ibid. seqq.</i>
Confluentes in unum truncum arteriæ	168
Arcus ex truncis e diverso sibi occurrentibus	168
Anastomoses per ramos minores	170 <i>seqq.</i>
22. Fines. I. in venam	176
An parenchyma arteriam inter venamque sit	177
Arteriæ cum venis continuantur	178 <i>seqq.</i>
& liquor ex arteriis in venas transit	182 <i>seqq.</i>
cur non æque ex venis in arterias redeat	185
nullum parenchyma ad microscopium adparet	186
	187
minimæ arteriolæ	187
quæ sit earum diameter	188
23. II. In ductum excretorium	189 <i>seqq.</i>
Eam viam injecti liquores describunt	190
& sanguis vitiose aberrans	191 <i>seqq.</i>
24. III. Exhalatio 1. sanguinea	195
2. cellulosa	196
3. pulmonalis	197
25. 4. in majores caveas corporis animalis	<i>ibid.</i>
Eam imitantur injecti liquores	198
& sanguis	199 . 201
5. in caveas cibarias, urinarias, aëreas, genitales	202
Sanguis eo sequitur	<i>ibid.</i>
26. 6. per cutem	203
Eam imitatur sanguis	204
27. 7. Exhalatio glandulosa	205
28. IV. Transitus in vâs lymphaticum	208
29. V. In arteriam non rubram	209
Boerhaavii vasa minorum generum	210 <i>seqq.</i>
30. Error loci Boerhaavianus	215
Vasa tertii & minorum generum, & inflammatio	
non sanguinea	216
31. Animadversiones. Vasa rubris minora dantur	217
De	

De errore loci dubitatur	219
Inflammatio non est error loci	220
neque ab obstructione nascitur	221 <i>seqq.</i>
neque dantur vasorum series decrescientes	223
Experimenta varia, quibus confirmatur non dari	224 <i>seqq.</i>
Et argumentum a nimia retardatione	296, 227

## S E C T I O II.

## V E N Æ.

1. In universum, quid de iis veteres senserint	228
2. Trunci venosi duo. Venæ Cavæ antiquitates	230
3. Figura conica, quæ arteriarum	233
4. Color cæruleus	234
fibræ circulares nullæ	235
5. Membrana intima, absque poris	<i>ibid.</i>
6. Media membrana.	236
ejus fibræ longæ	<i>ibid.</i>
callosæ fibræ & tubercula	237
7. Cellulosa tela	<i>ibid.</i>
arteriolæ venulæque	238
8. Crassities cum parte cavâ comparata	<i>ibid.</i>
crescit, uti venæ a corde remotiores sunt	239
Venarum membranæ densiores sunt, quam arterio-	
fæ tunicæ	240
& robustiores	241
Experimenta <i>Cliftoni Wintringham</i>	<i>ibid. seqq.</i>
9. sæpe tamen venæ rumpuntur	244
10. Ratio diametrorum ad arterias socias	246
Ubique fere lumina sunt uti 9. ad 4.	250
11. Numero superant.	251
12. Cuti propiores incedunt	253
13. Anastomoses	254
14. Alia discrimina	255
15. Valvulæ. Earum inventarum historia	256 <i>seqq.</i>
Cananus inventor	257
A coævis refutatus	<i>ibid.</i>



Renovator <i>Fabricius</i>	259
16. Fabrica	261
agger	262
finus	<i>ibid.</i>
17. Numerus. Valvulae conjugatae	263
ternatae	264
solitariae	<i>ibid.</i>
17. Amplitudo	265
19. Unde absint. A vena cava inferiori	266
vena portarum	269
venis uterinis, venis viscerum, venis minoribus	270
20. Valvulae venae cavae inferioris	271
venarum hypogastricarum	<i>ibid.</i>
femoralium	272
cruralium	<i>ibid. seqq.</i>
21. Valvulae venae cavae superioris	273
venae sine pari	<i>ibid. seqq.</i>
venae jugularis	276
subclaviae	278
brachialium	279
22. Quas ergo sedes teneant. Externas & perpendi- culares venas majores sequuntur	279
23. Venarum fines. Origo ex arteriis	280
Ex cellulosa tela varia	281 <i>seqq.</i>
24. Ex magnis caveis	284
Experimentis demonstratur	285 <i>seqq.</i>
25. Ex minoribus caveis	289
26. Ex venis tenuioribus	290 <i>seqq.</i>

## S E C T I O III.

## V A S A L Y M P H A T I C A.

1. Historia inventi. Quibus in animalibus reperiantur	292
Vestigia apud <i>Hippocratem</i> , <i>Aristoteles</i> , <i>Nic.</i> <i>Massam</i>	<i>ibid. seqq.</i>
<i>Faloppium</i> , <i>Asellium</i> , <i>Veslingium</i> ,	294 <i>seqq.</i>
<i>Walaum</i> , <i>J. v. Horne</i> , <i>Jolivium</i> ; <i>Sylvium</i> ,	296
<i>Schneiderum</i>	298

<i>Rudbekii</i> tituli	<i>ibid.</i> 299
<i>Thomæ Bartholini</i>	299
<i>Rudbekiani</i> potiores videntur	301
Quid post eos viros huic historiae accesserit	303 <i>seqq.</i>
<i>G. Hewson</i> inventor	306
2. Membrana, qua construuntur	306
Valvulae	306 <i>seqq.</i>
3. Vis irritabilis insignis	309
4. Oriuntur ex arteriis rubris	310
ex ductibus excretoriis	<i>ibid.</i> 311
5. ex cellulosa telae cavernulis	312 <i>seqq.</i>
6. ex magnis caveis ventriculi, & intestinorum	314
Ut per morbos ea origo ostendatur	315 <i>seqq.</i>
7. An etiam ex minoribus venis	316
An ex nervis	<i>ibid.</i>
8. Num ex glandulis conglobatis	316 <i>seqq.</i>
Negatur inde nasci	318 <i>seqq.</i>
9. Fines. Vasa lymphatica artus inferioris	319 <i>seqq.</i>
cruris	320, 321
inguinis	321
10. Pelvis	<i>ibid.</i> 322 <i>seqq.</i>
Abdominis	324 <i>seqq.</i>
renum	325
ventriculi	325
hepatis, lienis	326
Cisterna chyli	<i>ibid.</i>
11. Ductus chyliifer	327
Vasa lymphatica pectoris	328
12. brachii	329
13. capitis	330 <i>seqq.</i>
atque colli	<i>ibid.</i>
14. Ubi nondum visa sint	332
In cerebro	<i>ibid.</i>
In medulla spinali	<i>ibid.</i>
Tamen in avibus piscibus quadrupedibus frigidis	333, 334
15. Num in venas rubras se inmittant	334
sunt qui adfirmant	<i>ibid.</i> <i>seqq.</i>
Non videtur probabile	337 <i>seqq.</i>
16. Glandulae conglobatae antiquitates	340




17. fabrica	341 <i>seqq.</i>
18. ex cellulosa inprimis tela componitur	343, 344
19. Num in ea tela acini sive glandulae sint	344
Non admittuntur	<i>ibid.</i>
20. Succus proprius in cellulosis spatiosis	345
21. Earum glandularum vasa & nervi	347
22. Uti vasa lymphatica eas subeant	147
23. succumque in cellulosam telam effundant	349
24. Series & systema glandularum conglobatarum	456 <i>seqq.</i>
Glandula dorsalis quid	356
25. Utilitas earum glandularum	359
Major est in animale juniore	<i>ibid.</i>
Non videntur lymphae motum adjuvare	360
Frequentes in iis scirrhi	361
Unde ea frequentia sit	362
27. Aliae de lymphaticis glandulis hypotheses	364

*LIB. III. Circuitus sanguinis ex Corde in Arterias,  
ex Arteriis in Venas, ex Venis in Cor.*

S E C T I O I.

*QUO SANGUIS PER ARTERIAS FLUAT.*

1.  AN arteriis perpetuo sanguis est	366
Non aer ut <i>Erasistratus</i>	366, 367
nisi vitiosus	368
2. Neque a morte arteriae inanes sunt	169
3. Sanguis fluit a corde in arteriarum truncos, hinc in ramos, inde in minimos furculos	371 <i>seqq.</i>
4. Nam revincta arteria intumescit inter cor & linum	372
5. Cur aliquando ultra vinculum tamen sanguis in ar- teria fit	375
Ob anastomoses	376
6. Alia objectio. Arteriae ligatae non semper intu- mescunt	377 <i>seqq.</i>

7. Oculi testimonio directio vera sanguinis arteriosi  
confirmatur 378  
Objectio ab oscillatione sumpta 379  
& a retrogressu sanguinis 380

## S E C T I O II.

## I T E R S A N G U I N I S V E N O S I.

1. Venosi sanguinis fluentum arterioso contrarium est 382  
2. Id ostenditur ex natura valvularum 382  
Quam *Harveius* detexit 383, 384  
3. Earum utilitas. Pressionem omnem sanguinis venosi versus cor determinant 374, 385  
4. Experimento confirmatur 386  
5. Contrarium experimentum 388  
Solvitur objectio inde repetita *ibid.*  
6. Valvulae sanguinis pondus sustinent, ne columna superior in inferiorem gravitet 389, 390  
7. Varices ut nascantur 391, 392  
8. Vincula iter sanguinis venosi demonstrant 392, 393  
Nam venae intumescunt inter artum & vinculum 393  
9. cur aliquando is tumor a venis ligatis absit 394  
10. Compressio eadem facit, quae vinculum 394, 395  
11. Ut vincula sanguinem reservent, 395, 396  
12. Nuda vena ligata eodem modo intumescit 397  
Experimenta in variis venis facta 398, 399  
13. Morbosi tumores, qui venas comprimunt, pariter cogunt venam tumere 400  
14. Aliquando vena ligata non tumet 401, 402  
15. Et inter duo vincula sanguis est 402  
16. Chirurgia infusoria sanguinis venosi iter confirmat 403  
17. Oculi pro itinere venoso sanguinis testimonium 403, 404  
18. Tamen aliquando versus artus relabitur 404  
Oscillatio venosa 405



## S E C T I O III.

*SANGUINIS ITER EX ARTERIIS**IN VENAS.*

1. Necesse est sanguinem ex arteriis in venas, ex venis in cor venire 406, 407
2. Hinc, quando arteria vineta est, vena inanitur, neque sanguinem accipit 408  
Objectio petita a contrario eventu 408, 409  
Is explicatur 409
3. Cordi sanguis deficeret, nisi a venis haberet 409, 410  
Calculis positis quaeritur, quantum sanguis in dato tempore de corde effluat 410, 411  
Objectio a corde non penitus evacuato solvitur 411, 412  
Tantum ex corde exit uno die, quantum sexcentis diebus ex cibis parari nequit 413
4. Sed neque ex vulneribus sanguinis tanta copia fluere posset, nisi venosus sanguis in cor, & in laesas arterias rediret 413, 414  
Celeritas summa lethalium haemorrhagiarum 414, 415
5. Ejusmodi mortes ex minorum vasorum vulneribus 415, 416  
ut ex laesa arteria dentis &c. 416, 417
6. Etiam ex venarum vulnere animal perit 418, 419
7. Argumentum a venenis in venas missis, quorum vis, per quaecumque venam, in totum animalis habitum penetrat 420  
Experimenta sagittarum venenatarum 420, 421
8. Venena infusa. Historia infusionis medicamentariae 422, 423
9. Vis infusorum venenorum sanguinem cogentium 424, 425
10. Vis narcoticorum 426
11. Vis specifica varii generis : emetica 427

- cathartica 428  
 diuretica 429
12. Vis convulsiva & aliter funesta 429, 430  
 13. Vis medicatrix infusorum pharmacorum 431  
 14. Dissuadetur hactenus 432, 433  
 15. Argumentum a sanguine transfuso repetitum 433  
     Historia transfusionis sanguinis *ibid.* 434  
 16. Angli sanguinem de animali in animal primi trans-  
     fundunt 434, 435  
 17. Inde Galli 436  
 18. Hi primi in homine experimentum tentant, ma-  
     gna cum spe 437, 438  
 19. quae per funestos eventus evertitur 439, 440  
 20. Circuitus sanguinis microscopii auxilio conspicuus  
     redditur 440  
     a *Malpighio* *ibid.*  
 21. *Leeuwenhoeckio* 441, 442  
 22. aliis recentioribus 443, 444  
 23. Nostra experimenta 445, 446  
 24. Verus circuitus sanguinis inventor *Harveius* est  
     447  
 25. Neque adeo *Hippocrates* 448, 449, 450, 451  
     Ejus loci, huc relati, sub examen revocantur *ib.*  
 26. Sed neque *Salomon*, *Plato*, *Nemesius*, aut alii  
     veterum circuitum sanguinis descripserunt 451,  
     452, 453  
 27. Neque *Servetus* 453  
     & longe minus *Jacobus Ruff* *ibid.*  
 28. *Casalpinus* cominus ad verum accessit 454  
 29. Neque Fr. *Paulus Sarpi* circuitum invenit 455,  
     456, 457  
 30. Neque *Helfricus Dieterich*, *Thomas Harriot*, aut  
     *Honoratus Fabri* 458  
 31. Neque *Sinensibus* innotuit, aut *Persis* 458  
 32. Et *Harveio* inventus debetur 439  
 33. Objectiones aliquae. Circulatio *Riolani* 460  
     *Fortuni Liceti* 461  
     Nupera contra sanguinis circuitum argumenta *Ho-*  
     *moboni Pisoni* 461, 462



- & aliorum 462, 463  
 34. Nuperrimae 463  
 35. Verum tuiti sunt J. *Waleus* & Belgae *ibid.*  
 J. *Pecquetus* & alii 464, 465

## S E C T I O IV.

I T E R L Y M P H Æ E T H U M O R U M  
T E N U I O R U M.

1. Lympha tendit a vasis minimis ad thoracicum chy-  
 li ductum 466
  2. Eo tendere ostendunt vincula vasis lymphaticis in-  
 jecta 467
  3. & valvularum fabrica 469
  4. Etsi eæ nonnunquam lympham sinunt relabi 470
  5. Falsa *Bilsi* opinio. Lympham arterioso more ex  
 receptaculis chyli ad omnes partes corporis ani-  
 malis didi 471
- Refutatur
6. Alius error, vasa lymphatica a ductibus pelluci-  
 dis oriri 474
  7. Quo feratur minorum venarum humor 475







